

## 山东油蟠7-7桃苗油桃苗

产品名称	山东油蟠7-7桃苗油桃苗
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	8.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

### 产品详情

我是一个农村长大的农民，也是一个苗木人，没有谁比我们更能体会到其中甘苦，没有行业新秀，我们只能为自己代言。请给我一份信任，还你一片蓝天。

以下图片近景实拍.泰安开发区季风园艺场地处泰山脚下，位于泰安市苗木中心镇，泰安市南15公里，京福高速、京沪高速、泰莱高速贯穿其中，交通十分便利，苗圃繁育各种规格绿化及果树小苗，有自己的专业嫁接队伍，有专门的采穗圃，品种和质量百分百，经过数年的发展已形成一个良好的苗木销售体系。赢得省内外客户的一致好评。适宜角度单干开张角度25-360度，双干夹角50-180度。改进意见行距还可适当加强到。密度267-296棵/亩，供参考。注意要点年或需要前促后控，长好树，成好花，确保第二年有较高产量，以果压冠。单县终兴镇，单干开张20度，双干夹角40度，感受角度有点小，修剪的也不太好。

本苗圃是经过工商注册的正规单位，查询营业执照二维码辨真伪，购苗签订合同，双方受法律保护。苗圃承诺来我苗圃基地购苗保证先看到现货，相中后再洽谈，诚信经营，互利共赢。

秋彤桃是9月中旬成熟晚熟品种，属于桃树中的新品种。此桃的特点是不用套袋

、不用人工授粉、自花授粉、省时省力、省工、省钱、投入小

、效益高。熟时间：秋彤桃成熟时间为阴历8月15前

阳历9月中旬颜色：为粉红色，果面整洁，果肉为淡绿白色，离核。个头：最大个头750克  
平均个头400克以上。硬度：属于硬质桃常温下储藏20多天。糖度：经过专业测试糖度为18%

果实圆形，缝合线深浅和宽窄均为中等。秋彤桃两侧果肉对称，成熟度一致;果实大，平均单果质量336g，最大438g;果面茸毛稀少，果皮底色黄白，成熟时85%果面着鲜红到紫色晕，光照条件好时全果着鲜红色，外观艳丽。外观漂亮，肉金黄，果形整齐匀称，最大果重700克左右，糖份高于南汇水蜜桃，无锡蟠桃，平均糖份在13-15度，核小。成熟后肉质较软，食时软中带硬，甜多酸少，有香气，水分中等，风味诱人。成熟时间一般在8月中旬至9月上旬，是秋季水果市场上的佳品。锦绣黄桃是上海著名的水果，它的注册商标也是锦绣黄桃。锦绣黄桃在1986年荣获上海市科技成果进步一等奖。1989年命名为上海市名特优水果生产基地。1991年列为上海市丰收项目生产基地。1992年定为郊区农业发展产品基地之一。青村镇是上海市锦绣黄桃生产基地。三，双斜干(介绍树形) 2004年春，我建一桃园，距今已经12年了，双行带状栽植，栽植带宽50cm,株距0.5米，大行距4米，亩栽33

3株，芽苗建园。当年夏季当株高1.5-2米时于50cm处拉干，角度25-90度，两株夹角50-30度，主干上以留两边的所谓“鱼刺状枝”为主，长枝修剪。

黄桃的营养十分丰富，经常食用对人体有非常的帮助，根据检测它的主要营养成分有：丰富的维生素C和大量的人体所需要的纤维素、胡萝卜素、番茄黄素、红素及多种微量元素。如硒、锌等含量均明显高于其它普通桃子，还含有苹果酸、柠檬酸等成分。锦绣黄桃的皮与果均显金黄色，甜多酸少，味道独特，每天吃二只可以起到通便、降、血脂，抗自由基，祛除黑斑、延缓衰老、提高免疫功能等作用，也能促进食欲，3至6月，每半月左右施一次肥，用清粪水加有机肥灌溉，一共施8次，可以促使进一步发展桃树幼苗抽枝发叶，迅速成形。而栽后第二年及不久之后的一月应至少施三次有机肥，来保证果树的成长。桃树幼苗的修剪为了加速桃树幼苗的成长,让它可以快速结果。中油4号，由中国农业科学院郑州果树研究所选育而成。果实近圆形，对称性较好，缝合线较浅，果顶平，梗洼浅窄。平均单果重152克，最大单果重263克。果实整齐度好，果皮底色为黄色，果面全面着玫瑰红色。果肉黄色，硬溶质。质地细，含可溶性固形物11.8%，味甜。半粘核，核中等大。不裂果，品质上等，特丰产，耐贮运。树势中庸，能自花结实，以中长果枝结果为主。在重庆地区，于2月下旬萌芽，3月上旬盛花，果实5月底成熟，12月上旬落叶。抗病力强。该品种与中油5号一样，抗裂果，需冷量少，极丰产，是一个值得大力推广的甜油桃新品种。

桃树适应性广，全国各地均可栽植，栽培管理容易，对土壤气候适应性强，无论南方、北方、山地平原均可栽植，头年栽树次年结果，三四年进入丰产期，亩产2000-4000斤。现在

桃苗变种种类繁多，绿化桃苗有：红叶碧桃、紫叶李等。红桃、黄肉桃等，下面为大家介绍一下品种的特性。桃较重要的变种有：油桃、水蜜桃、蟠桃、寿星桃、碧桃。其中油桃和蟠桃都作果树栽培，寿星桃和碧桃主要供观赏，寿星桃还可作桃的矮化砧。树高4~5米。一年生枝条红褐色。叶多呈披针形，叶缘有锯齿，叶柄基部常生蜜腺。花型有蔷薇型和铃型两种。核果除蟠桃外，多为圆形或长圆形，果面除油桃外，均布有茸毛。果肉白、黄色或夹红晕，少数呈红色；肉质柔软、脆硬或密韧；核表不同沟点纹路，均为种和品种群的重要分类依据。

- 1、春雪桃：6月初成熟，果实圆形。大果型，平均单果重200克，最大果重366克，是早熟桃品种中个头。缝合线浅，茸毛短而稀，两半较对称。果皮全面浓红色，内堂遮阴果也着全红色。果皮不易剥离。果肉白色，肉质硬脆，纤维少，风味甜、香气浓，粘核。可溶性固形物含量16%，品质上、不落果。果实耐贮运，常温下货架期10天。
- 2、红冠桃：6月中旬成熟，果实圆形，果顶平。大果型，平均单果重300克，最大果重570克。缝合线浅，茸毛短而稀，两半对称。果皮全面浓红色，内堂遮阴果也着全红色。果肉红色，肉质脆，纤维少，风味甜、香气浓，粘核。不裂果。果实耐贮运，常温下货架期15天，0 条件下可贮存90天以上。
- 3、仓红桃：华北地区7月上旬成熟，平均果重220克。适应性广、果个大、口感好、硬溶质、耐贮运。
- 4、蒙山雪桃：晚熟品种，成熟期10月中、下旬，树上可留果至11月上旬，平均单果重260克，果面着玫瑰红色，果肉脆甜，丰产性较强。