

桃树5年丰产 5年桃树苗如何提高高产

产品名称	桃树5年丰产 5年桃树苗如何提高高产
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	12.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

5年桃树苗5年桃树苗如何高产

我是一个农村长大孩子，也是一个苗木人，整天面朝黄土，背朝天。没有谁比我们更能体会到其中甘苦，没有明星、没有行业新秀，我们只能为自己言。请给我一份信任，还你一片蓝天。以下图片近景实拍

如在密思李、大石中生、大石早生上通过摘心后，有40%的副梢能形花芽，而夏季不在心的李树，当年一般不形成花芽。年冬剪时，对当年生枝一般缓放不剪，对于密挤枝，徒长枝、遮光枝采用疏出的办法处理。这样，在当年缓枝上则能形成大量从状花芽。此时叶面应少施或不施尿素。李子苗如何避免冻害霜害和冻害是指果树在生长期夜晚土壤和植株表面温度短时间降至0oC或0oC以下或者遇到霜降，致使果树幼嫩部分遭受伤害的现象。我国平均每年霜冻危害面积达34万km²，重的年份达77万km²，每年造成农作物，果树和蔬菜损失达30亿元。为此，可在春季芽萌动前灌水，以降低地温，延缓萌芽，推迟花期。夏季修剪多摘心、短截、促发副梢，利用副梢比主梢花期7至10天的特性来延迟开花。秋季9月中、下旬每株可喷布100毫克乙烯利，也可延迟翌年花期3至5天。利用以上措施，避免早春低温对花的为害，从而提高座果率。

怎么培育桃树苗？1、苗圃地选择

快速培育桃树苗嫁接成品苗，一定要选择土质为轻壤或中壤、排灌方便并且肥沃地块为苗圃地。因在一年内培育成嫁接成品苗，必须选择良好立地条件，这是快速育苗成功基础。圃址选择后要平整土地，每亩施优质腐熟有机肥5—6立方米，深翻后作畦。

2、砧木种子处理

砧木种子选择当年山桃或毛桃新种子，在播种前要进行浸种，一般冷水浸泡3—5天，每天换水1次，有条件加入马尿或人尿少量。

3、播种时间

常规桃树育苗培育砧木通常将砧木种子于12底层积处理，第2年春季3月底—4月初将种子取进行播种，这种苗较晚且苗势较弱。而快速育苗在每年秋季土壤冻前进行播种。播种采双行带状，即大行距50cm，小行距30cm，每亩播种量山桃为40kg，毛桃60kg，覆土厚度为种子直3—4倍。

4、快速砧木苗，尽快达到嫁接粗度

春季苗木土后，要及时、除草、虫害。4—6月每月2次，5—6月每月追施尿素1次，每次每亩15kg左右。要利剂控制金龟子为害幼苗。加强各项，使砧木苗在6月底以前达到嫁接粗度。

5、嫁接时间

常规育苗通常在每年7月下旬—8月下旬进行嫁接，当年接芽不萌发。而快速育苗接芽当年萌发成苗，就要提前嫁接，一般要求在6月底—7月初进行芽接。接穗选择生长良好长梢，接芽发育良好。

6、解绑、折砧和抹芽

嫁接后2—3周解绑并在接芽以上1cm处将砧木折伤后压平，向上生长副梢剪除，主梢摘心。这种措施是使接芽处于优势部位，迫使接芽萌发。折砧后接芽及砧木上有芽均可萌发，要将砧木上萌发芽及时抹除，接芽迅速萌发生长。当接芽长到15—20cm时剪砧。

7、加强土肥水，接芽快速生长

接芽萌发后，要及时中耕除草、追肥，使苗圃地无杂草为害，接芽成活后每隔10—15天追施1次尿素，每次每亩施10kg左右，并且结合施肥。为使苗木成熟度，每隔15天左右结合虫害喷施0.3%。当年秋季一般嫁接苗木高度在70—80cm，达到桃树定干高度。10月底将苗木挖，除净叶片后砂藏假植。

桃树苗栽培技术桃子素有“寿桃”和“仙桃”美称，因其肉质鲜美，又被称为“天下果”。要想吃到好桃，就需要上心桃树苗，

李子苗6-8月的管理技术要求李子苗对气候的适应性强，对土壤只要土层较深，有一定的肥力，不论何种土质都可以栽种。对空气和土壤湿度要求较高，极不耐积水，果园排水不良，常致使烂根，生长不良或易发生各种病害。宜选择土质疏松、土壤透气和排水良好，土层深和地下水位较低的地方建园。定植前一定要深翻改土，施足基肥。定植后逐年扩

穴，以利根系的扩展和新根生长。对成年果园或定植前改土不彻底和衰老树更新者，都应该注意扩穴深翻，并结合重施有机肥，这样才能达到改造低产，更新复壮的目的。（二）施肥：脆红李对氮、磷、钾三要素的需要量比例为1.0：0.4：1.6，可作为施肥的参考。同时对树体要拉枝开角，控制营养生长，让其自然恢复。5月中旬对霜冻造成危害且不能恢复的枝条应及时剪除或回缩到健壮部位，促使其重新萌发抽枝；应将受冻害枝芽抹除，促发隐芽结果，弥补产量的不足。老劣品种绝产的园片，可采取春季硬枝嫁接或绿枝嫁接的方法进行名优品种改接。

下面为大家介绍一下桃树苗需要栽培技术：

- 1.及时浇水与覆盖；桃树苗栽植当年主要任务一是保成活，是促生长。只有栽植当年到位，翌年才能有产量和效益。桃树苗栽植以后立即浇水，水渗下后进行地面覆盖，可以盖草，也可以覆膜。盖草，即作物秸秆、树叶、杂草覆盖输盘，这样即能保墒，还能防寒，成活率也。覆盖地膜，在定植行内沿行向覆盖地膜，一是可地温，有利于快速生根；是可以保温，防止水分蒸发，成活率；三是可以杂草生长。
- 2.定干与扶干；根据树形要求，需要干要及时定干，定干高度一般为30~50cm，剪下15~30cm为带，要有5~10个饱满芽，以便主枝。主干形不要定干，疏去分枝即可。芽苗栽后桩过高，影响愈合，形成死茬；过低会使接芽风干枯死。亦可在接芽上方10cm处剪砧，主干形时当作临时支柱使。
- 3.检查成活率情况，及时补植；如果定植芽苗，砧木上萌蘖与接芽争夺养分，要及时剪除，关键时期是4~5月。除萌蘖是一项细致作业，切勿将接芽误当砧木除去。如接芽，可选留一萌蘖作为新砧木，待秋季补接。
- 4.摘心芽苗定植；当新稍长至60cm左右时，若选两主枝开心形或者三主枝开心形树形，可摘心定干，即选取两主枝或者三主枝，其余摘心控制。

桃树苗是否能粪不少果农朋友在种植桃树苗时候，都会碰到一个问题，就是在挖好树坑之后是否可以撒粪直接喂桃树？直接喂粪会不会将桃苗烧死？事实上给桃树苗喂粪是没有问题，不过需要好操作。

一、可以利烘将鸡粪烘干，因为通过鸡粪烘烘干后鸡粪不含水分，而且在烘干中能够起到、效果，可以把含水量在80%左右鲜鸡粪直接烘干至成品。

、鸡粪必须要经过腐化，注意施量不能过多，以免造成肥害，施时候要浇水不能过干，否则便无法发挥其肥效。粪也属于一种自然肥料，鸡粪通过晾晒使其成为粪块，或把粪块打碎形成颗粒鸡粪肥。由于鸡不能完全吸收饲料中营养，因而所鸡粪里面会存在一些饲料中养分，有机质可以达到65%，粗蛋素有30%，氮磷含量在8%左右。粗蛋素与氮磷是作为农作物绿化肥料是非常可观，生物肥本身对一些蔬菜、水果生长就有一定辅助作，加之有些元素在其中会促进作进一步。

在使粪喂养桃树苗时候只要好每颗桃树量，不要施肥不然会现烧死桃树苗情况。

