

# 1公分山楂苗各种规格实时报价

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 1公分山楂苗各种规格实时报价   |
| 公司名称 | 泰安市岳美苗木有限公司      |
| 价格   | 2.00/棵           |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄 |
| 联系电话 | 13335292778      |

## 产品详情

上海1公分山楂苗各种规格实时报价 一般2~4年即可开花结果。以后便随着树龄的增长。产量逐年增加。到10年生前后。便进入盛果期。到60~70年仍不衰老。继续结果。单株或单行栽植的山楂树。结果年限更长。有的可达150年以上。但如修剪不当。忽轻忽重。则树势很易转弱。产量大幅度下降。

喜光也能耐荫。一般分布于荒山秃岭。阳坡。半阳坡。山谷。坡度以15~25度为好。耐旱。水分过多时。枝叶容易徒长。对土壤要求不严格。但在土层深厚。质地肥沃。疏松。排水良好的微酸性砂壤土生长良好。

泰安市岳美苗木有限公司用山楂种子培育的苗木，称为实生砧木苗。实生砧木苗一般均需嫁接才能成为供栽培的山楂。山楂种子壳厚而坚硬，种子不易吸水膨胀或开裂。另外，种仁休眠期长，出苗困难。因此，山楂在播种前，种子一定要预先进行处理，才能保证其发芽率。深翻熟化，改良土壤：翻耕园地或深刨树盘内的土壤，是保蓄水分。消灭杂草。疏松土壤。提高土壤通透性能，改善土壤肥力状况，促使根系生长的有效措施。

上海1公分山楂苗各种规格实时报价

或用50%可湿性托布津或托布津800-1000倍液及石硫合剂。3) 桃小食心虫

在山楂树上一年发生两代。主要危害果实。防治方法：在越冬幼虫出土前。于树下用75%辛硫磷乳剂每公顷3.75~7.5千克拌成毒土撒入土中。诱杀。(4) 山楂粉蝶 一年发生一代。

条施，即在行间横开沟施肥。全园撒施，即当山楂根系已密布全国时，可将肥料撒在地表，然后翻入土中20厘米深。穴施，即施液体肥料(人粪尿)时，在树冠下按不同方位，均匀挖6~12个，30~40厘米深的穴倒入肥料，然后理土。山楂果树的修剪同一般果树修剪方法。防止内膛光秃，由于山楂树易分枝，常使都闭，内小枝生长弱，枯死枝逐年增多，各级大枝的中下部逐渐裸秃。防止内光秃的措施应采用疏。截相结合的原则，进行改造和更新复壮，疏去轮生骨干枝和密生大枝及竞争枝。徒长枝。

#### 上海1公分山楂苗各种规格实时报价

欣赏重点及有关花文化：山楂春花秋实。春花香气扑鼻。秋实艳果累累。山楂历来被看做水果。但因其太酸。往往不堪鲜食。多用于加工和入。早在唐代。人们已经懂得它的消食化积。活血散瘀的。《嵩岳文献》记载：5000年前的黄帝时期。嵩山老君洞就有了用山楂酿酒的描述。

病虫枝，缩剪衰弱的主侧枝，选留适当部位的芽进行小更新，培养健壮枝组，对弱枝重截复壮和在光秃部位芽上刻伤增枝的方法进行改造。少短截山楂树进入结果期后，凡生长充实的新梢，其顶芽及其以下的1~4芽，均可分化为花芽，所以在山楂修剪中应少用短截的方法，以保护花芽。

第一次是发芽前。第二次7月中旬前后。为全年生长的高峰。第三次在10月中旬。山楂树的花芽为混合芽。由顶芽和侧芽发育而成。次年抽生结果新梢。花序着生在新梢顶端。营养条件好时。新梢顶端花序下的1~2个腋芽或结果新梢下面的1~2个新梢顶芽仍能形成混合芽。

被害后。新梢和叶片开始出现粉红色病斑。上面覆盖一层。叶片狭长卷缩。严重时扭曲纵卷。后苗木枯死。防治方法：苗长出4~5片真叶后。立即喷布0.5波美度石硫合剂。以后每隔半月喷一次。7月以后可根据情况停喷。对成年树。发芽前喷布5波美度石硫合剂。

进行深翻熟化。可以改良土壤。增加土壤的通透性。促进树体生长。2. 施肥。灌水：以补充树体生长所需的营养。一般1年浇4次水。春季有灌水条件的在追肥后浇1次水。以促进肥料的吸收利用。花后结合追肥浇水。

边填边踩实。填至近一半时。再把拌有肥料的表土填入。然后。将山楂苗放在。使其根系舒展。继续填入残留的表土。同时将苗木轻轻上提。使根系与土密切接触。并用脚踩实。表土用尽后。再填生土。苗木栽植深度以根颈部分比地面稍高为度。