

0.8公分嫁接冬枣树苗枣树苗价格

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 0.8公分嫁接冬枣树苗枣树苗价格 |
| 公司名称 | 泰安市岳美苗木有限公司 |
| 价格 | 2.00/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄 |
| 联系电话 | 13335292778 |

产品详情

正确的做法：一是看天气，环剥前3天不能遇雨，且3-5天日平均气温达到25-26 时就可环剥，二是环剥时要看树势，过旺的树宜在初花期环剥，中庸树在盛花期环剥，弱树盛花期后环剥。弱树和小树提倡环割，不能环剥。且一次只能环割两道，两道之间须留一活枝，坚决不能环割三道，间距不小于7厘米。

2.1.3 叶面肥在枝叶、花蕾生长期，可喷0.4%~0.5%的尿素液肥和0.5%~1%磷酸铵，促进枣树生长、花蕾发育；在花期和幼果期，可喷0.2%~0.5%的硼砂和0.5%的磷酸铵液肥，促进坐果；在果实生长期，可喷0.5%的磷酸铵和0.3%的磷酸二氢钾，促进果实生长。

冬枣一般种植在山东、河北、陕西、、河南等北方地区，但是近年来随着农村产业结构的，冬枣生产有了很大的发展，南方的浙江沿海、云贵高原、四川盆地、湖南、湖北、江西等广大区域都在引种栽培并成功，其显著的经济效益展示出广阔的前景。

春季修剪衰老的枣树要根据其衰老程度的不同的更新修剪。2.2.2 夏季修剪其一，3年以下的幼树要摘心。需要加强对幼树的肥水管理，以加快枣树的生长，催生新生枣头，促进枝叶生长。若主枝顶端有很多枣头，就将大的枣头留下，摘掉其他的枣头，直到6月中上旬再对留下的枣头进行摘心；其二，对初结果的树进行摘心。

冬枣，又名：鲁北冬枣、苹果枣、水枣、枣等，属于鼠李科，枣属，是无刺枣树的一种晚

熟鲜食的枣品种，其果实生育期在120天以上，果实成熟时期为9月底(白熟期)到10月中旬(完熟期)。冬枣主要分布于陕西、河南、山西、山东、河北等地。

5、花果管理：冬枣在初盛花期依生长势强弱分别留3至5个二次枝摘心，同时在盛花初期喷布1至2次10至15毫克/升赤霉素，结果期大树可在主干上环剥，初结果幼树在主枝上环剥。6、整形修剪：冬枣的树形依据栽植密度而定，在冬剪和夏剪时应及时疏除徒长枝，短截延长枝，疏截过密枝和细弱枝，以维持树势平衡，保持树冠通风透光，及时回缩冗长的结果枝。