

2年杏树苗 3年凯特杏树苗种植主产区

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 2年杏树苗 3年凯特杏树苗种植主产区 |
| 公司名称 | 泰安市岳美苗木有限公司 |
| 价格 | 2.00/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄 |
| 联系电话 | 13335292778 |

产品详情

专业培育生产各类果树苗品种有：桃树苗 苹果苗 梨树苗 樱桃苗 蓝莓苗 山楂苗 柿子苗 石榴苗 核桃苗 板栗苗 油桃苗 葡萄苗 猕猴桃苗 无花果苗 树莓苗 花椒苗 香椿苗 枸橘苗 皂角苗等。我基地在市场预测、品种选择、生产技术等方面您有任何问题，都能及时得到满意答复。欢迎有需要的朋友实地考察、合作，热切期待您的来电、来访！

新凯园艺场 落于全国的"苗木之乡"泰**部开发区，北依泰山；京福、京沪高速公路、104国道在此经过；交通运输便利，环境优美，地理位置优越。

二斑叶螨的发生与山楂叶螨相近。苹果落花后主要防治若螨和成螨，常用的药剂有15%哒螨灵2000倍液、1.8%阿维菌素3000倍液及复配制剂等。4.霉心病。主要发生在红星系列品种上。病原腐生性强，在果园树体或杂草等多种场所越冬，花期侵入，果实成熟及采收后表现症状。苹果为喜光性树种。光照充足，有利于正常生长和结果，有利于提高果实的品质。不同品种对光照的要求有所差异。淮北地区年日照时数在2000小时以上，基本上能

满足苹果生长发育的需要。

土壤方面，苹果适于土层深厚、排水良好和富含有机质的沙质壤土。1.jpg苹果树的整形修剪1、苹果树的整形：苹果树的整形主要提倡纺锤形，纺锤形结果比较早，是目前提倡的一种树形，树高2.5-3.0米，冠幅1.8米，干高70厘米，在中心干上均匀着生10-15个主枝，不分层次，主枝间距15-20厘米，均匀?。

修剪时，要以“缓”为主，加大主枝分枝角度，疏除背上枝组，多留侧、下枝组，延长枝长放，对骨干枝采用环割等措施，控制养分的运送，促进成花；（2）对弱树的促旺修剪：当树体生长过弱时，可在肥水管理基础上，实行重剪，刺激旺长。

五是在成虫发生期清晨震落捕杀成虫，树下铺塑料薄膜便于集中，隔3~5 d震1次，效果较好，此法经济、简便易行。六是成虫出树后产卵前树上喷洒30%辛硫磷微胶囊悬浮剂700~800倍液，或40%辛硫磷乳油1000倍液、50%马拉硫磷乳油或80%敌敌畏乳油1500倍液、20%氰戊菊酯乳油2000倍液，毒杀成虫效果良好，隔15 d喷1次，喷2~3次即可。

崇左3年凯特杏树苗种植主产区

夏剪：采用开张角度、摘心、扭梢、环剥、疏截、环割等技术，缓和树势，改善光照，扩大树冠。秋剪：通过拉枝、疏剪直立枝、徒长枝、密生枝和过密的外围新梢等措施，改善光照条件，促进花芽分化，提高树体的抗寒性。

盆栽苹果的品种选择一般来说，我们种植盆栽苹果都是直接从果场或花卉市场上买回来种植。因此，在选购盆栽苹果的时候，要注意盆栽苹果的品种选择，一般来说现在的盆栽苹

果品种主要有寒富、寒香两种。寒富品种的盆栽苹果树具有耐寒、果大、果形好看的特点；寒香品种的盆栽苹果树具有果味香、果皮颜色鲜艳漂亮的特点。

同时，可在花朵凋谢后的1个月以内，对果树进行梳理，这样有助于增强光照强度。此外，可在果实上套塑料袋，增加光热，由此能够实现增产、增收和提升果实品质的目的。2.

9冻害防护入冬后，要做好果树的冻害防护工作，具体可采取下防护措施：一是涂白树干。