5公分红李子树 李子树苗株行距基地

产品名称	5公分红李子树 李子树苗株行距基地
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

三、花开3%至5%时，全树喷施保果药：爱多收（复硝复钠）、芸苔素+硼肥或高磷型叶肥（据说美国多乐公司生产的花多乐效果也不错，我没接触过，有兴趣的可以用一下）。注 : 难坐果的品种严禁盛花期喷任何，花前严禁喷施任何杀虫剂，自花结实高的品种花前可喷施杀虫杀菌药。

咱是地道的农民风里来雨里去，一年四季都是在地里和果树，果苗打交道除草打药修剪365天每天都如此没有没有采访只有地里的果树果苗为伴新的一年里希望每位朋友丰收喜悦发财我是从小在地里长大的农民,深知农民种地的辛苦,深知炎炎夏日太阳当空的时候我们在干吗!深知买农.药,化肥的不容易，更深知选种,买苗的担心。担心担心种苗,担心辛辛苦苦一年甚至几年的劳动成果全部破碎。农民就要互相帮助,所以我踏踏实实育苗,实实在在选苗发货,凭良心做生意,凭真心交朋友。我是农民我为自己代言。
选择三大主枝向外斜生，内膛不留大枝及大型枝组。
7）三级枝（副侧枝）从主枝基部开始30—40厘米左中留一个，从下向上依次减小
8）四级枝（结果枝）每5—8厘米左右留一个，以短枝为主，也可留少量的中长枝。
2、整形过程：定植后距地面50—60厘米剪截（直立性品种矮些、开张型高些）。

花后三周及时疏果，一般长果枝留3-5个果，中果枝留1-2个果，花期温度保持在14-20°C，夜间遇低温利用火炉加温，空气相对湿度保持在50%左右。 2.果实膨大期管理
新梢长至40厘米左右摘心，对于强旺枝要重摘心，可进行2-3次。

五月红李子树李子树苗株行距基地实地挖掘，品质保证

在5月-7月的李树期间，李树枝条旺长是普遍存在的问题，李树枝条旺长不仅会消耗植株大量养分，影响果实的生长和花芽分化，同时还会造成树体荫蔽，通风透光差，加重病虫

害发生。如何科学合理的调控夏梢生长是李子丰产高质的关键，而这正是众多种植户在李树中较为欠缺的一部分。

李子树的生长对气侯的适应性强，对土壤只要土层较深，有一定的肥力，不论何种土质都可以栽种。对空气和土壤湿度要求较高，极不耐积水，果园排水不良，常致使烂根，生长不良或易发生各种病害。宜选择土质疏松、土壤透气和排水良好，土层深和地下水位较低的地方建园。

地下水位较高的地区，如湖北的江汉平原，树宕的深度要浅一些，甚至只在地表挖一20-30厘米深的小坑栽苗。苗木栽下后从四周取土将根系包起来成馒头状。无论树宕深浅，栽植前均需施足基肥。基肥种类和标准、办法，均可参照安农水蜜桃栽培要求进行。

二、土肥水管理 正常的土肥水管理可参照桃树进行，但李子树，尤其是国外布朗李，如黑宝石品种，更应重视施基肥和疏松土壤，使土壤有机质含量不断提高，否则园子管理就困难，就难以收到优质的李果。生产上每年秋冬季亩施土杂肥(或圈肥、厩肥)的量一定不能少于每亩10000公斤，每株约占100-150公斤，甚至更多。

3 结语 在日常的种植过程中，加强对果园的综合管理，对果园内的清洁加以重视，并经常对病枝、病叶、病果进行修剪和集中处理，对个别出现病虫害的李子树加以隔离，阻断树与树之间的传染，在选择方面也要注意不可。