

# 1年石榴树苗 石榴苗适合云南省种的石榴苗品种

产品名称	1年石榴树苗 石榴苗适合云南省种的石榴苗品种
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

## 产品详情

泰山红石榴苗泰山红石榴苗适合云南省种的石榴苗品种

我是一个农村长大的孩子，也是一个苗木人，整天面朝黄土，背朝天。没有谁比我们更能体会到其中甘苦，没有明星、没有行业新秀，我们只能为自己代言。请给我一份信任，还你一片蓝天。以下图片近景实拍

施肥时，一般应掌握“使用薄肥、每次少量、多次施用”的原则，主要浇稀薄肥料液，在根部施尿素、磷酸二氢钾、果树复合肥等。5年生以下的幼年桃树，每次施用量为0.05-0.25 kg；5年生以上的结果盛期桃树，每次施肥0.5~1 kg。2.定干与扶干；根据树形要求，需要干的要及时定干，定干高度一般为30~50cm，剪口下15~30cm为整形带，要有5~10个饱满芽，以便培养主枝。主干形不要定干，疏去分枝即可。芽苗栽后桩过高，影响愈合，形成死茬；过低会使接芽风干枯死。目前，桑白蚧效果较好的药剂为48%乐斯苯乳油1000—1200倍液和20%丁硫克百威乳油1000倍液。桃树主要病害有：细菌性穿孔病，褐斑穿孔病，霉斑穿孔病，黑星病，褐腐病等主要病害。措施：1、加强桃园管理，增强树势，注意排水，增施有机肥，避免偏施氮肥，增施磷、钾肥，改善桃园的通风透光条件，合理修剪，剪除病枝、清除落叶、枯枝、僵果和地面落果，集中烧毁或深埋。

怎么培育桃树苗？1、苗圃地的选择

快速培育桃树苗嫁接成品苗，一定要选择土质为轻壤或中壤、排灌方便并且肥沃的地块为苗圃地。因在一年内培育成嫁接成品苗，必须选择良好的立地条件，这是快速育苗成功的基础。圃址选择后要平整土地，每亩施优质腐熟有机肥5—6立方米，深翻后作畦。

2、砧木种子的处理

砧木种子选择当年山桃或毛桃的新种子，在播种前要进行浸种，一般用冷水浸泡3—5天，每天换水1次，有条件的加入马尿或人尿少量。

3、播种时间

常规桃树育苗培育砧木通常将砧木种子于12月底层积处理，第2年春季3月底—4月初将种子取出进行播种，这种出苗较晚且苗势较弱。而快速育苗应在每年秋季土壤冻前进行播种。播种采用双行带状，即大行距50cm，小行距30cm，每亩播种量山桃为40kg，毛桃60kg，覆土厚度为种子直径的3—4倍。

#### 4、快速砧木苗，尽快达到嫁接粗度

春季苗木出土后，要及时、除草、虫害。4—6月每月2次，5—6月每月追施尿素1次，每次每亩15kg左右。要利剂控制金龟子为害幼苗。加强各项，使砧木苗在6月底以前达到嫁接粗度。

#### 5、嫁接时间

常规育苗通常在每年7月下旬—8月下旬进行嫁接，当年接芽不萌发。而快速育苗接芽当年萌发成苗，就要提前嫁接，一般要求在6月底—7月初进行芽接。接穗选择生长良好的长梢，接芽发育良好。

#### 6、解绑、折砧和抹芽

嫁接后2—3周解绑并在接芽以上1cm处将砧木折伤后压平，向上生长的副梢剪除，主梢摘心。这种措施是使接芽处于优势部位，迫使接芽萌发。折砧后接芽及砧木上原有芽均可萌发，要将砧木上萌发芽及时抹除，接芽迅速萌发生长。当接芽长到15—20cm时剪砧。

#### 7、加强土肥水，接芽快速生长

接芽萌发后，要及时中耕除草、追肥，使苗圃地无杂草为害，接芽成活后每隔10—15天追施1次尿素，每次每亩施10kg左右，并且结合施肥。为使苗木成熟度，每隔15天左右结合虫害喷施0.3%的。当年秋季一般嫁接苗木高度在70—80cm，达到桃树定干高度。10月底将苗木挖出，除净叶片后砂藏假植。

桃树苗栽培桃子素有“寿桃”和“仙桃”的美称，因其肉质鲜美，又被称为“天下果”。要想吃到好桃，就需要上心桃树苗，

用复混肥也应在花前和生理落果后各施一次，每次施肥量为总用量的1/3。根外追肥是土壤施肥的必要补充，由于桃树对微量元素比较敏感，容易出现暂时的相对缺乏，因此，就更显出根外追肥的重要。据资料报道，在初花期喷施0.2%硼酸水溶液，可使座果率达到88.73%，8月下旬至9月初喷施0.4%磷酸二氢钾一次，枝冻害指数比喷清水的对照减少12.9%。桃树是浅根系果树，根系扩展度可大于树冠枝展度0.6—1倍，根系深度只有树高的1/5—1/3，吸收根一般在40厘米土层以内，10—30厘米为生长旺盛区，桃树根系对土壤中空气的含量要求较高，一般在土壤中空气含量大于5%时，根系开。缺锌引起的小叶病和缺硼引起果实近核处发生木栓化褐色区及沿果实缝合线开裂等，也是桃树容易发生的营养病害。二、桃树的施肥：1、定植前施肥：根据桃树早期丰产总结，在建园前，每亩施用农家肥5吨与50kg过磷酸钙和30kg硫酸钾混合，分施于定植穴中，然后填入表土，并与肥料混匀，准备定植。

下面为大家介绍一下桃树苗需要的栽培：

1.及时浇水与覆盖；桃树苗栽植当年的主要任务一是保成活，二是促生长。只有栽植当年到位，翌年才能有产量和效益。桃树苗栽植以后应立即浇水，水渗下后进行地面覆盖，可以盖草，也可以覆膜。盖草，即用作物秸秆、树叶、杂草覆盖输盘，这样即能保墒，还能防寒，成活率也。覆盖地膜，在定植行内沿行向覆盖地膜，一是可地温，有利于快速生根；二是可以保温，防止水分蒸发，成活率；三是可以杂草生长。

2.定干与扶干；根据树形要求，需要干的要及时定干，定干高度一般为30~50cm，剪口下15~30cm为带，要有5~10个饱满芽，以便主枝。主干形不要定干，疏去分枝即可。芽苗栽后桩过高，影响愈合，形成死

茬；过低会使接芽风干枯死。亦可在接芽上方10cm处剪砧，主干形时当作临时支柱使用。

3.检查成活率情况，及时补植；如果定植芽苗，砧木上的萌蘖与接芽争夺养分，要及时剪除，关键时期是4~5月。除萌蘖是一项细致的作业，切勿将接芽误当砧木除去。如接芽，可选留一的萌蘖作为新砧木，待秋季补接。

4.摘心芽苗定植；当新梢长至60cm左右时，若选用两主枝开心形或者三主枝开心形树形，可摘心定干，即选取两主枝或者三主枝，其余的摘心控制。

桃树苗是否能用粪不少果农朋友在种植桃树苗的时候，都会碰到一个问题，就是在挖好树坑之后是否可以撒粪直接喂桃树？直接喂粪会不会将桃苗烧死？事实上给桃树苗喂粪是没有问题的，不过需要好操作。

一、可以利用烘将鸡粪烘干，因为通过鸡粪烘干后的鸡粪不含水分，而且在烘干的中能够起到、的效果，可以一次性把含水量在80%左右的鲜鸡粪直接烘干至成品。

二、鸡粪必须要经过腐化，注意施用的量不能过多，以免造成肥害，施用的时候要浇水不能过干，否则便无法发挥出其肥效。粪也属于一种自然肥料，鸡粪通过晾晒使其成为粪块，或把粪块打碎形成颗粒鸡粪肥。由于鸡不能吸收饲料中的营养，因而所的鸡粪里面会存在一些饲料中的养分，有机质可以达到65%，粗蛋白素有30%，氮磷的含量在8%左右。粗蛋白素与氮磷是作为农作物绿化肥料是非常可观的，生物肥本身对一些蔬菜、水果生长就有一定辅助作用，加之有些元素在其中会促进作用进一步。

在使用粪喂养桃树苗的时候只要好每颗桃树的用量，不要施肥不然会出现烧死桃树苗的情况。

林带的树种常以高大乔木和亚乔木以及灌木组成，行距2-2.5米，株距1-1.5米。在北方乔木多为杨树，毛白杨，新疆杨，沙杨树，银白杨树，和泡桐，水杉等等。一般要求林带南面距离桃树10-15米，北面距离桃树20-30米。为了节省用地通常将桃园的路，渠，和林带想结合配置。也可根据病害发生情况在发病初期及时喷药，控制病情，减少危害。桃树流胶病：是树势衰弱，营养不良，虫伤，创伤，病菌感染的共同结果。方法是：增施有机肥，促使土壤疏松肥沃，减少积水，创伤，虫伤，用杀菌剂加营养剂涂抹保护伤口，减少病菌侵染，平衡营养，合理负载，减少病虫危害。随树龄增大及产量增加，需氮量也增加。氮素不足时，新梢生长量小，枝条细而短，影响花芽分化，同时果实小，色泽差，品质低，枝与芽抗寒力下降。（2）磷：桃需磷量比氮、钾少，主要作用是使传粉受精良好，增加果实含糖果量和促花芽形成。