

## 绿心翠香猕猴桃树苗，采购欢迎来电详询！

产品名称	绿心翠香猕猴桃树苗，采购欢迎来电详询！
公司名称	杨凌秦翌农业科技有限公司
价格	7.00/株
规格参数	地径:0.8cm 高度:45cm 苗龄:两年生
公司地址	陕西省杨凌示范区凤凰中路杨陵区商务局5层505室
联系电话	17765089908

## 产品详情

翠香猕猴桃苗木

产地：陕西周至

纯度：98%

成活率：95%

发芽率：96%

含水量：10%

级别：原种

[www.mht77.com](http://www.mht77.com)

周至猕猴桃77苗木网

周至猕猴桃77苗木网陕西眉县猕猴桃苗木基地长期批发、零售各种规格猕猴桃苗木

我们始终以来超低价批发，薄利多销，货真价实!

猕猴桃77苗木网眉县繁育基地专业供应猕猴桃苗(猕猴桃苗已大量出口到荷兰、日本、意大利、韩国等)

猕猴桃一年生、二年生实生苗(可供应数量：400万株)规格如下：

0.3cm 苗木嫁接口干径 0.4cm;(0.3元/株)

0.4cm 苗木嫁接口干径 0.5cm;(0.5元/株)

0.5cm 苗木嫁接口干径 0.6cm;(0.7元/株)

0.6cm 苗木嫁接口干径 0.8cm;(1.0元/株)

苗木嫁接口干径>0.8cm.(1.5元/株)

“翠香”原名“西猕9号”，是西安市猕猴桃研究所和周至县农技试验站于1998年开展野生猕猴桃资源调查时，在原就峪乡后就峪村山沟南向坡发现的优株，采集母株枝条繁殖观察评价，后经过连续10余年的选育和区域试验，于2008年3月通过陕西省果树品种审定委员会审定。

物候期：在陕西秦岭北麓气候环境下栽培，树液流动始于元月下旬，2月上旬萌芽，3月上旬展叶，4月上旬开花结果，盛花期3天，花落时间是5月上旬，同时形成幼果，树势强，8月底成熟，成熟标志总糖为6.5%，落叶期为11月下旬。

丰产性：该品种早熟优质，易早产，丰产，嫁接苗定植后3年始果，666.7平方米产量300公斤，中等肥水园第4年平均单株产量31公斤，666.7平方米产量1260公斤，5年时666.7平方米产量可超1900公斤。

抗逆性和适应性：该品种综合抗性比红阳、徐香等早熟猕猴桃。在肥水管理中等条件下易丰产，管理方便，幼枝棕色，密生红棕色柔毛，叶片大，多为椭圆形，多年生枝深褐色无毛。每个结果枝着雌花1-5朵，无耳花。其抗风、抗叶蝉类及虫害危害能力强，抗病、抗冻抗春寒性状好。

该品种适宜于在秦岭北麓及长江流域平原，对土壤要求不严。壤土、沙壤土地，酸性和中性土壤都可栽培，但以栽培在土质疏松，深厚，肥沃，排灌良好的微酸性和中性土壤上表现好，并及时在果园生草，种绿肥。

供应2年生翠香猕猴桃苗，数量：40万株，地径0.7以上，根好苗壮蔓长。培育出的翠香猕猴桃苗木品种纯正、规格高、质量可靠、有良好的信誉，深受广大客户的信赖。苗木每株价格区间为6-7元/株。

注意：猕猴桃为雌雄异株体植物，分雌树和雄树。雌树在花期需通过雄树授粉后才能正常结果;因不同品种的雌树苗花期不同，故需配上不同品种的雄树。本处出售各类雄树苗价格区间为4-6元/棵(同种类猕猴桃雄树比雌树贵一元)

适宜在气候温和，雨量充沛，土壤肥沃，植被茂盛，土壤以深厚、排水良好、湿润中等的黑色腐殖质土、砂质壤土，pH值5.5-7的微酸性土壤的地方栽植。

## 翠香猕猴桃的育苗

### 1. 砧木苗培育

1.1 采种：在9月上旬-10月上中旬采集充分成熟的果实。经后熟变软后，将果子连同种子一起挤出，装入纱布袋内搓揉，使种子与果肉分离，然后用清水反复淘洗，把洗净的种子放在室内摊开阴干。

1.2 种子沙藏处理：将种子用40-50℃温水浸泡2小时，再用冷水浸一昼夜，然后沙藏50-60天播种。猕猴桃种子在沙藏过程中怕干怕湿，要勤检查、勤翻动，防止霉变。

1.3 播种 播种时间：一般在海拔800以上地区育苗较为理想，3月中旬至4月上旬播种。 播种方法：一是苗圃地选择在土层深厚肥沃和排灌及交通条件好的地方；二是整地作厢，施足底肥，清除杂物，厢宽1米左右，将苗床稍加镇压，浇透水，把沙藏的种子带沙播下。播种后，撒一层厚约2-3毫米的细河沙，并复盖稻草，草上喷水或搭塑料小棚。三是加强苗床管理，确保培育健壮砧木苗。

## 2. 嫁接苗培育

2.1 嫁接时期：萌动前20天左右为宜即2月中旬至3月下旬。

2.2 嫁接方法 主要采取单芽切接等方法，其具体是：选生长充实、髓部较小的接穗，剪取带一个芽的枝段，长3-4厘米。选平直的一面削去皮层，削面长2-3厘米为宜，深度以露出木质部或稍带木质部为宜，将削面的反面削一个50度左右的短斜削面。在砧木距地面10-15厘米处剪砧，选平滑面向下削一刀，削面长度略长于接穗削面，深度同接穗一样，将砧木削皮2/3；然后插入接穗，要求接穗大小与砧木基本相同；注意砧穗形成层对准，然后用塑料嫁接薄膜包扎，露出接穗芽眼即可。

2.3 嫁接苗的管理：一是嫁接后3-4个星期，接芽开始抽发，待新梢长出基本老化后即可除去捆绑薄膜。二是对春、秋季腹接苗成活后，要立即剪砧，剪口约离接口4厘米即可。夏季接芽成活后，可先折砧后剪砧。三是及时抹除砧木上的萌芽是成活抽稍的关键。四是苗圃地要经常中耕除草，注意在除草时不碰到刚发出的接芽。五是在接芽萌发抽稍后，需在接芽旁边设立支柱，并将新梢绑护在支柱上。六是幼苗高60厘米时应适当摘心。七是结合灌水，可施入人粪尿、猪粪等，或在水中加入1%尿素施入，7月份施肥时可适量加施过磷酸钙，促幼苗枝条老化，芽眼饱满。八是7-8月的猕猴桃苗采取遮阴措施，忌强光直接照射。

周至猕猴桃77苗木网在此特别提醒客户，诚信是人生的美德，价格是买家的重要保障。猕猴桃价格是买家最敏感的问题，经过多年的经验总结。本行业各类产品几乎没有固定价格，是随着各因素变化而变化的。

热诚欢迎各位新老客户来人来电咨询洽谈，果园实地查看，由于我们业务繁忙，提前电话预约，敬请谅解。

手机：18729988804

QQ：200885752

邮箱：200885752@qq.com

翠香作为美味系猕猴桃里少有的早熟品种，近年以其极佳的口感备受消费者欢迎，是中秋节前唯一可以树上熟的绿心猕猴桃。

价格也是居高不下，种植效益较好，所以种植面积也在逐年扩大。但是这个“香饽饽”有那么容易吃到吗？估计不少人在种植路上是跌过跟头的。

### 小科普

“翠香”原名“西猕9号”，是西安市猕猴桃研究所和周至县农技试验站经过10余年的选育和区域试验，于2008年3月通过陕西省果树品种审定委员会审定。

### 翠香的栽培表现

翠香作为接穗与秦美作为砧木的嫁接亲合性较好，陕西产区很多果园也是这样换品种的。嫁接后伤口愈

合良好，成活率高，且抗病抗逆性较好，管理技术相对简单。

翠香枝条萌芽率与秦美基本一致，成枝率略低于秦美，以中、短枝结果为主。

其结果枝 80% 以上从基部第 2 节开始着花坐果，单枝花序数以 4~5 个为主，采用秦雄“401”配套雄株授粉，在自然条件下坐果率可达 90% 以上。

栽培中比较突出的问题

黑头病

初期表现果尖部出现黑点，逐步增多，之后连片。黑斑下果肉表现虽然正常。但严重影响果实外观质量。客商拒收、冷库拒存，失去商品价值。

改善措施：

黑头病的病原菌暂不确定，各个研究单位从其病斑中分离到了不同的菌株。同时有研究表明，翠香吸钙能力弱，对比其他品种，其植株内钙含量明显偏低。所以除了病菌感染，缺钙也是翠香易发黑头病的原因之一。

实践发现在防病同时，补充钙肥的果园，黑头病发生率极低。

不同形式的钙肥允许使用的浓度不同，补钙效果因而不同。有的钙安全稀释浓度只有万分之几，达不到有效补钙效果。同时，建议随喷雾防治病虫及时加入钙肥。土壤施钙可能有固定的问题，具体效果还需进一步试验。

不耐贮运，货架期短

翠香猕猴桃不耐贮藏。贮存 3 个月以上时，硬度很快就会下降，导致无法再继续贮存下去。出库的翠香猕猴桃，一周左右变软，之后 3~5 天，果实就会发胀酒化。因此，买回来后分批拿出，分批食用。

改善措施：

这也与翠香吸钙能力差有关，钙增加耐贮藏性是已有的明确结论。因此，补钙可能减缓或改变翠香不耐贮运的弊病。

树势弱，生长节律性明显

翠香猕猴桃树势弱，表现在萌芽后，剪口下发出几个长枝，以下枝芽坐果后很快封顶。因此，架面形成难、稀疏，易日灼。此后，继续生长枝蔓比例很低。全年只在春季形成一次明显生长高峰。即生长节律性（一次生长）强。生长过分弱，常造成秋季后期突然全树冒芽现象，消耗贮藏营养（冲芽），影响次年花量。

改善措施：

这点与翠香品种特性有关，适当的修剪栽培措施可以克服这一弊病。

现蕾期摘去结果母枝基部1~2个结果枝全部花蕾，即能促进其旺盛生长，增加架面生长势，提高覆盖度，并助其成为更新枝，并为前部枝及果实遮荫；

对需要发枝的封顶枝，尽早摘去其顶端1~2片叶子，也能促进其适时转旺补空；

针对其枝条生长健旺、二次枝结果性能良好的特点，幼树期可采取早期摘心措施促发二次枝，形成较多分枝，及早成形上架。

抗溃疡病能力低

翠香猕猴桃为绿肉猕猴桃中比较感溃疡病品种。要格外注意溃疡病的防治。

改善措施：

1、药剂防治：秋季（9月起）每隔20~30天，给架面喷雾一次药剂，落叶后4天内、发病期，每10~20天喷雾一次药剂。

生长期：50%氯溴异氰尿酸1500至1000倍液、枯草芽孢杆菌制剂、细黄链霉菌制剂、解淀粉芽孢杆菌等。

休眠期：选用0.1%过氧乙酸、铜制剂、45%代森铵、叶枯唑、3~5波美度石硫合剂、1:2:160~200波尔多液等。

幼树嫁接后，解接膜时，给嫁接接口涂抹屠溃。以后，随接穗生长，逐渐木质化时，也接续给木质化部分涂抹屠溃，极大减少涂抹部分的发病率。

2、创可贴疗法：对病斑纵划道，用蘸em菌剂、或枯草芽孢杆菌、或50倍液50%氯溴异氰尿酸的药棉或卫生纸敷于病斑及划口，然后用薄膜包裹。

萌芽率低，出现内膛光秃现象

翠香猕猴桃萌芽率低，经常出现内膛光秃现象。

改善措施：

实践中，采用2月（阳历）上旬立春后，用启芽喷雾架面，可以有效克服光秃现象。