

## 2公分樱桃树苗 4公分福星樱桃树新品种含糖量高

产品名称	2公分樱桃树苗 4公分福星樱桃树新品种含糖量高
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

### 产品详情

泰安苗木有限公司目前栽培的大樱桃品种，除了拉宾斯、斯坦勒、艳阳、桑提娜等少数品种为自花结实品种可以单一栽培外，95%以上的大樱桃品种自花不结实、无常授粉结果，必须配置授粉树。即使是自花结实品种，也建议大家配置一定比例授粉树，以达到的产量。

化肥分~次施用晚熟品种次，次在月中旬到月中旬晚熟品种采果后尽早施用，在有机肥和硅钙镁肥基础上氮磷钾配合施用，适当氮磷肥比例；第二次在来年月中旬萌芽后进行，以氮磷肥为主；第三次在来年月初果实套袋前后进行，根据留果情况氮磷钾配合施用，钾肥用量；第四次在来年月下旬到月中旬，根据降雨树势和产量情况采取少量多次的进行，以钾肥为主，配合少量氮肥。在月底到月中旬，连续喷遍%~%的尿素，浓度前低后高，间隔时间~天。

配置授粉树需要两个条件

一是花粉量大、与主栽品种花期相遇；

二是与主栽品种授粉亲和，从学术角度说就是他们的S基因型要不同。

在这两个条件的基础上，授粉品种尽量选择经济性状优良、售价高的品种。

以美早为主栽品种的果园，建议大家选择桑提娜、黑珍珠、福星、布鲁克斯等品种为授粉树。

以福晨为主栽品种，建议大家选择黑珍珠、水晶、桑提娜、拉宾斯为授粉品种。不要选择早大果、布鲁克斯为授粉品种。

周围的枝干可适当剪去部分，减缓生长，也它和大的枝干抢夺养分。整体总之要做到透风有光，形状杰出。花果这是增产保质的重要措施。花期实时人工授粉，采纳多种保花保果。着花坐果过多时，要实时疏花疏果。疏花以为好，每个花序留一两个便可。疏果期在疏花后-天，大的水果如苹果梨提倡留一个单果，对于小的如葡萄枣子要进行果穗梳理。给果实套袋可以防虫，通常在收成前天拿掉，利于光照增色。接近成熟期时，每天傍晚对果树喷少量水，增强光合作用，也可达到果实糖分，加大着色面积的作用。

以福星为主栽品种，可以选择萨米脱、艳阳、黑珍珠、拉宾斯等为授粉品种。

以萨米脱为主栽品种，可选择艳阳、黑珍珠、佳红、斯帕克里为授粉品种。大家注意生产中常见的美早、红灯2个品种的S基因型相同，不能相互授粉。在生产上，建议樱桃建园时一般至少要栽培3个品种，以保证品种间相互授粉。面积10亩以上的果园品种要5个以上，而且成熟期要错开，以防采收期过于集中。

柑橘施肥问题及施肥原则针对柑橘生产中忽视有机肥施用和土壤改良培肥，土壤酸化严重，瘠薄果园面积大，农户用肥量差异较大，肥料用量和配比施肥时期和等的不合理，钙镁硼锌铁等中微量元素现象普遍，水土流失严重，肥料利用率低等问题，提出以下施肥原则有机肥料的施用，大力发展果园绿肥，实施果园秸秆覆盖；酸化严重的果园，适量施用硅钙肥或石灰等酸性土壤调理剂；根据柑橘品种果园土壤肥力状况，氮磷钾肥用量配施比例和施肥时期，针对性补充钙镁硼锌铁等中微量元素；施肥改全园撒施为集中穴施或。

配置比例上，主栽品种可选择1-2个，所占比例在60-70%，授粉品种占30-40%。

对于采摘园，品种种类比例可以多一些、丰富一些，不同成熟期、不同特色的优良品种，拉长果实采摘期，不同人群的需要。

而对于授粉树配置不当的成龄树果园，我们可通过高接授粉品种、有条件地可以直接移栽结果的授粉树，来解决授粉树配置不当的问题。

桃病为害果实和枝梢，-月间均能发生，花后连阴雨天气易造成该病暴发。可结合对挑缩叶病和桃痂病的喷药进行。桃痂病主要为害果实，幼果期喷波美-度石硫合剂，或%多菌灵倍液，或%托布津倍液，均能有效地该病。桃流胶病是侵染和性原因共同造成的一种病害，主要为害主干和主枝，引起流胶，削弱树势。土壤粘重，氮肥过多，连作重茬，排水不良，夏季重修剪，以及虫害伤口等都能加剧流胶。主要从加强，增强树势入手，做好树体保护工作。

也可在喷药后进行套袋防护。桃蚜一年中发生代数多，随桃树发芽，卵孵化，为害花及幼叶，月以后转移到其他寄主上越夏，落叶前再迁回桃树上产卵越冬。；主要抓春季卵盛孵期喷布%乳油倍液，或%氯菊酯乳油倍液，均可收到的效果。对有机磷和菊酯类产生抗性的桃蚜，喷布%吡虫啉倍液效果尤好。为害严重时，可在秋季桃蚜回迁桃树时再喷药一次。桑白蚧在长江流域一年发生-代。月上中旬为孵化盛期，若虫在枝干上吸食汁液为害，削弱树势，严重时造成枝条枯死，一般在-年生枝上为害较多。