

12公分樱桃树 黑珍珠樱桃苗果个大适应性强

产品名称	12公分樱桃树 黑珍珠樱桃苗果个大适应性强
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

泰安苗木有限公司目前栽培的大樱桃品种，除了拉宾斯、斯坦勒、艳阳、桑提娜等少数品种为自花结实品种可以单一栽培外，95%以上的大樱桃品种自花不结实、无常授粉结果，必须配置授粉树。即使是自花结实品种，也建议大家配置一定比例授粉树，以达到的产量

亩产~公斤的蕉园传统有机肥~公斤/亩，腐熟禽畜粪用量不超过公斤/亩。氮肥N~公斤/亩，磷肥PO~公斤/亩，钾肥KO~公斤/亩。亩产公斤以下的蕉园传统有机肥~公斤/亩，腐熟禽畜粪用量不超过公斤/亩。氮肥N~公斤/亩，磷肥PO~公斤/亩，钾肥KO~公斤/亩。根据土壤酸度，定植前每亩施用石灰~公斤~公斤，与有机肥混匀后施用；缺硼锌的果园，每亩施用硼砂~公斤七水硫酸锌~公斤。香蕉苗定植成活后至花芽分化前，施入约占总肥料量%的氮肥%的磷肥和%的钾肥；在花芽分化期前至抽蕾前施入约占总施肥量%的氮肥%的磷肥和%的钾肥；在抽蕾后施入%的氮肥%的磷肥和%钾肥。

配置授粉树需要两个条件

一是花粉量大、与主栽品种花期相遇；

二是与主栽品种授粉亲和，从学术角度说就是他们的S基因型要不同。

在这两个条件的基础上，授粉品种尽量选择经济性状优良、售价高的品种。

以美早为主栽品种的果园，建议大家选择桑提娜、黑珍珠、福星、布鲁克斯等品种为授粉树。

以福晨为主栽品种，建议大家选择黑珍珠、水晶、桑提娜、拉宾斯为授粉品种。不要选择早大果、布鲁克斯为授粉品种。

修剪以轻剪疏枝长放为主。盛果期的修剪。盛果期的桃树短的~年，长的达年以上，此期的特点是主枝逐渐开张，树势逐渐缓和，树冠相对稳定，不再扩大。随着树龄的增长，内膛与下部小枝枯损渐多，修剪量要逐渐加重，及时疏除上部或强枝和直立枝即朝天枝，改进内膛光照。对下部及内膛枝组可采用疏缩结合，去弱留强，对长中果枝则适当重截，以利抽生新芽。衰老期的修剪。根据桃树自身的生长规律，一般到年后将逐渐衰老，主侧枝转弱，时有枯死现象发生，长果枝抽生,中短果枝与花束枝大量，许多果枝在结果后不能抽生良好的新梢，结果部位上升和外移现象严重，果形小，落果多，产量低。

以福星为主栽品种，可以选择萨米脱、艳阳、黑珍珠、拉宾斯等为授粉品种。

以萨米脱为主栽品种，可选择艳阳、黑珍珠、佳红、斯帕克里为授粉品种。大家注意生产中常见的美早、红灯2个品种的S基因型相同，不能相互授粉。在生产上，建议樱桃建园时一般至少要栽培3个品种，以保证品种间相互授粉。面积10亩以上的果园品种要5个以上，而且成熟期要错开，以防采收期过于集中。

化肥分~次施用晚熟品种次，次在月中旬到月中旬晚熟品种采果后尽早施用，在有机肥和硅钙镁肥基础上氮磷钾配合施用，适当氮磷肥比例；第二次在来年月中旬萌芽后进行，以氮磷肥为主；第三次在来年月初果实套袋前后进行，根据留果情况氮磷钾配合施用，钾肥用量；第四次在来年月下旬到月中旬，根据降雨树势和产量情况采取少量多次的进行，以钾肥为主，配合少量氮肥。在月底到月中旬，连续喷遍%~%的尿素，浓度前低后高，间隔时间~天。

配置比例上，主栽品种可选择1-2个，所占比例在60-70%，授粉品种占30-40%。

对于采摘园，品种种类比例可以多一些、丰富一些，不同成熟期、不同特色的优良品种，拉长果实采摘期，不同人群的需要。

而对于授粉树配置不当的成龄树果园，我们可通过高接授粉品种、有条件地可以直接移栽结果的授粉树，来解决授粉树配置不当的问题。

红颈天牛以幼虫在树干蛀道内越冬，为害主干及根颈部，削弱树势或引起死树。可在月下旬成虫产卵前对主干及主枝分杈部位涂白涂白剂用生石灰和水按1-比例调制而成，加入少量食盐可粘着作用，加入少量石硫合剂渣滓可防虫效果)，产卵。同时人工捕杀成虫。在

生经常检查树干，发现幼虫为害时可行钩杀或药杀。桃蛀螟和梨小食心虫均为害果实，后者还为害桃梢。可在产卵盛期喷布%杀螺松乳油倍液药杀幼虫，隔-天再喷一次。

桃树的修剪时期，可分为冬季修剪休眠期修剪与夏季修剪生修剪。冬季修剪在秋季落叶后至翌春萌芽前都可进行，期间以晚秋为更佳。修剪早，伤口易愈合，剪口芽生长好，并能促进花芽充实饱满。夏季修剪在芽萌动后到停梢都可以进行，其间以~月尤为重要。早摘心，发枝部位低，新梢形成早，芽充实饱满，易控制徒长，内膛光照状况好。桃树修剪技术不同树龄的桃树，生长结果习性不同，修剪的也不同。初结果期的修剪。桃树定植~年后开始结果，此时生长，树冠继续扩大，徒长枝多，容易出现从属不明。