

秋姬李子苗一亩栽植多少根 2公分李子树苗

产品名称	秋姬李子苗一亩栽植多少根 2公分李子树苗
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

秋姬李子苗秋姬李子苗一亩栽植多少根泰安园艺场位于泰安高新区，始建于2000年，是经山东省部门备案，三证齐全单位，苗圃2000余亩。本中心历经20多年风雨洗礼，以保证为育苗宗旨，以值得信赖广交天下好友。多年来，经山东农业大学、山东省果树等多家科研院校，近百余名科研专家研究，先后发展和培育了多种名特优质果树、绿化苗木新品种，产品销往众多省市地区，受到广大客户的广泛赞誉和一致好评。本中心为山东果树定点优质果树苗繁育推广中心。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

在树冠下面，靠近根系分布区，挖2~3个施肥坑，将有机肥与氮、磷、钾化肥充分混匀后施入，施后及时盖土。萌芽前遇干旱和多雨，应灌施清淡粪水抗旱和排水防渍。预防生理落果。生理落果是李子树生长上存在的重要问题，在多雨条件下表现尤为突出李子苗的三早栽培措施一、合理修建促进早期花芽形成：李定植当年，新梢长到30厘米左右时进行摘心控制，促发副梢并形成花芽。李子苗生理落果有3个时期：期于谢花后发生，主要由雌蕊和花粉发育不、授粉不良所致；第二期在幼果期，主要是树体营养供应不良而致；第三期是硬核期发生，主要由新梢与果实争夺养分、水分所致。也要注意病虫害危害等因素。定植后的第二年春天，主枝和副主枝的延长枝可达1米多，并发出侧枝，构成枝组。再过一年，对一些过密进行疏剪，宜轻剪长放，促使形成开花结果的长中、短果枝。李子苗枝梢生长迅速，果实发育期短，因此施肥要及时、合理。我基地经营各种苗木：桃苗：映霜红桃苗，秋彤桃苗，永莲系列桃苗，春雪桃苗，金秋红苗，中油16号桃苗等。苹果苗：烟富8号苹果苗，中秋王苹果苗，M26苹果苗，M9T337苹果苗，红色之爱苹果苗等。樱桃苗：吉塞拉樱桃苗，车厘子樱桃苗，红灯樱桃苗，美早樱桃苗，布鲁克斯樱桃苗等。核桃苗：香玲核桃苗，8518核桃苗，元丰核桃苗，辽核核桃苗等。

4、加强管理，强壮树势霜冻使果树的幼果、新梢和叶片等都遭到不同程度的损伤，为尽快恢复树势，应加强肥水管理，补充树体营养，提高果实的细胞液浓度，增强树势的抗旱性和抗病力，花前花后多施肥料，追施果树。（3）果实膨大和花芽分化期追肥：在生理落果后至果实进入迅速膨大期前（6月下旬至8月中旬），追施氮、磷、钾复合肥，株施0.5—1公斤。（4）果实生长后期追肥：在果实开始着色至采收期间追肥。此次以磷、钾肥为主，氮肥以叶面喷施为好，浓度为0.2—0.3%，结合喷药进行。叶面喷布可多次进行（10~15天左右一次），还可结合病虫等共同喷布，花期用0.2~0.3%的硼酸液喷布树冠，可提高座果率。（三）灌溉与排水1、灌水：脆红李虽然抗旱，但要达到高产，必须有充足的水分供应：花期不宜灌水，否则会引起落花落果。

李子树苗想丰产怎么做一、适地适树。李子苗为蔷薇科李属植物。李产区与南方气候似，可选用优良品种，如脆红，单果重100克，外观漂亮，8月下旬成熟，品质，离核，味甜。

栽培特点李对光的要求不十分严格，一般在水分条件比较好的土层较深厚、光照不强烈的山坡背阴面均能良好生长。但是在光照充足的地方，果实着色好，品质好。李对土壤要求不严格，因种类不同对土质的要求也有差异。中国李在砾质、砂质、黑钙土、红壤及黄土高原褐土上均能正常生长。要搞好果园生长季节的修剪，调控营养分配，保证果实生长发育和花芽形成的需要。7、生烟熏烟是果农对付冻害常用的办法。预防效果取决于生烟质量，质量高的果园温度2左右。生烟堆数至少每亩5~6堆，均匀分布在各个方位。在栖霞、蓬莱、龙口、招远调查的结果是，花果受冻严重的主要集中在离地面1.6m以下，2m以上基本没受冻，桃树自然开心形受冻害严重，纺锤形受害较轻，幼龄桃树内膛和下部幼果受冻害严重，树上部幼果受冻害较轻，成龄桃树内膛和下部幼果受冻害较轻，树上部幼果受冻害较重。

李子苗常见的栽培清树摘净并残留在树上的病果、虫果、僵果，然后收集在一起挖坑深埋。剪去树上的干枯枝、病虫枝、萌发的根蘖并带出园外深埋或烧掉。

防虫害为了病源、害虫越冬基数，果实采收后可在李树上喷施50%多菌灵可湿性粉剂800~1000倍液，或50%托布津1000~1200倍液，或80%的代森锌可湿性粉剂800~1000倍液，或50%的退菌特800李小食心虫、李枯叶蛾可用40%的2500~3000倍液，或40%的乳油1500~2000倍液，或50%的辛硫磷800倍液混合40%的乐果800倍液，或50%的1000倍液进行。

叶面施肥果实采收后应尽早喷施1次0.2%~0.3%的溶液，以增强树势，有利于树体营养的积累和越冬。此时叶面应少施或不施尿素。

（一）园地选择。应选择光照充足，土壤深厚，土质疏松，水源充足，排水通畅的中性至微酸性沙壤土建园。地形选用梯台或缓坡，馒头山好。（二）、栽植时间。从落叶至发芽前均可栽植，南方的果农有“秋季先发根据，春栽先发芽的经验。1、施肥种类：李树栽后每年都要从土壤中吸取大量的营养物质。而这些营养物质除氮、磷、钾三要素外，还需要钙、镁、铁等多种微量元素。李树在幼树期，要多施磷、钾肥，盛果期以氮肥为主，同时也要保证磷、钾肥的用量。开春幼苗萌芽时，要检查苗木成活情况，发现死苗要及时拔除，补栽新苗。李子树苗整形的原理及作用是指从李幼树定植后开始，把每一株树都剪成既符合其生长结果特性，又适应于不同栽植方式、便于田间管理的树形，直到树体的

经济寿命结束。

李子苗如何避免冻害霜害和冻害是指果树在生长期夜晚土壤和植株表面温度短时间降至0°C或0°C以下或者遇到霜降，致使果树部分遭受伤害的现象。平均每年霜冻危害面积达34万km²，重的年份达77万km²，每年造成农作物，果树和蔬菜损失达30亿元。是近年来，北方晚霜冻害尤为严重，一些春季开花早的果树，经常遇到晚霜危害，轻者减产，重者绝收。有些地区晚霜危害已成为发展果树的因子。