

1年油桃苗 中油8号油桃苗 丰产的桃树苗

产品名称	1年油桃苗 中油8号油桃苗 丰产的桃树苗
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

我是一个农村长大的孩子，也是一个苗木人，整天面朝黄土，背朝天。没有谁比我们更能体会到其中甘苦，没有明星、没有行业新秀，我们只能为自己代言。请给我一份信任，还你一片蓝天。以下图片近景实拍

种植桃树苗的土壤管理下面为大家介绍一下种植桃苗的土壤管理：深翻：土壤粘重的桃园，为了改良土壤，在行间进行深翻，深60cm左右，结合施有机肥料。砂石地桃园也进行深翻，掏砂石换土，结合施有机肥料。深翻对连年丰产起着良好作用。二、促花用药要狠(7月上旬~落叶)1、多效唑要看情况灵活使用。大棚桃如果侧枝和高度达到要求，就可喷多效唑调控，而且要加大浓度，加大到1喷雾器水兑3~5包(50克装)多效唑才有效果。露地桃树如果长得很旺盛，达到了理想的树形和枝量时，也可以加大多效唑用量，如果没达到理想的树形和枝量，可以适当减少多效唑的用量。在主副林带之间，可加设1-2条林带，也称为折风线，进一步降低风速，加强防护效果，这样就形成了纵横交错的网络，林带内的晚熟桃树苗可以得到较好的防护。主林带之间可按300-400米之间的距离配置，副林带之间的距离可以加大到500米-800米。

怎么培育桃树苗？1、苗圃地的选择

快速培育桃树苗嫁接成品苗，一定要选择土质为轻壤或中壤、排灌方便并且肥沃的地块为苗圃地。因在一年内培育成嫁接成品苗，必须选择良好的立地条件，这是快速育苗成功的基础。圃址选择后要进行平整土地，每亩施优质腐熟有机肥5—6立方米，深翻后作畦。

2、砧木种子的处理

砧木种子选择当年山桃或毛桃的新种子，在播种前要进行浸种，一般用冷水浸泡3—5天，

每天换水1次，有条件的加入马尿或人尿少量。

3、播种时间

常规桃树育苗培育砧木通常将砧木种子于12月底层积处理，第2年春季3月底—4月初将种子取出进行播种，这种出苗较晚且苗势较弱。而快速育苗应在每年秋季土壤冻前进行播种。播种采用双行带状，即大行距50cm，小行距30cm，每亩播种量山桃为40kg，毛桃60kg，覆土厚度为种子直径的3—4倍。

4、快速砧木苗，尽快达到嫁接粗度

春季苗木出土后，要及时、除草、虫害。4—6月每月2次，5—6月每月追施尿素1次，每次每亩15kg左右。要利剂控制金龟子为害幼苗。加强各项，使砧木苗在6月底以前达到嫁接粗度。

5、嫁接时间

常规育苗通常在每年7月下旬—8月下旬进行嫁接，当年接芽不萌发。而快速育苗接芽当年萌发成苗，就要提前嫁接，一般要求在6月底—7月初进行芽接。接穗选择生长良好的长梢，接芽发育良好。

6、解绑、折砧和抹芽

嫁接后2—3周解绑并在接芽以上1cm处将砧木折伤后压平，向上生长的副梢剪除，主梢摘心。这种措施是使接芽处于优势部位，迫使接芽萌发。折砧后接芽及砧木上原有芽均可萌发，要将砧木上萌发芽及时抹除，接芽迅速萌发生长。当接芽长到15—20cm时剪砧。

7、加强土肥水，接芽快速生长

接芽萌发后，要及时中耕除草、追肥，使苗圃地无杂草为害，接芽成活后每隔10—15天追施1次尿素，每次每亩施10kg左右，并且结合施肥。为使苗木成熟度，每隔15天左右结合虫害喷施0.3%的。当年秋季一般嫁接苗木高度在70—80cm，达到桃树定干高度。10月底将苗木挖出，除净叶片后砂藏假植。

桃树苗栽培桃子素有“寿桃”和“仙桃”的美称，因其肉质鲜美，又被称为“天下果”。要想吃到好桃，就需要上心桃树苗，

2、桃树萌芽前喷施一次5波美度石硫合剂或45%石硫合剂晶体30倍液或1:1:100倍的波尔多液。落花后10天开始喷施“乙蒜素”1500—2000倍液或72%农用链霉素可溶性粉剂3000倍加大生M—45可湿粉600—800倍液，隔10天一次与12.5%晴菌唑1500倍液或70%甲基托布津600倍液交替使用，喷施2—3次。无论种何种作物，都要留足树盘，及时施肥灌水及中耕除草等工作。（二）肥水管理1.桃树对主要营养元素的要求：桃树对三要素的需要以氮

、钾为主，对磷需要量较少。（1）氮：桃树新梢生长量大，果实大，对氮素较敏感，幼树各初结果树氮素过多易引起新梢徒长和延迟结果，加重生理落果，要适当控制氮肥施量。通常情况下，一颗桃苗所需的肥料是22斤左右的人尿和0.5斤二铵肥。这样桃苗才能够获得足够的营养补给，将来果实的产量也能够得到有效提高。另外大家好要在秋季季节里来给桃苗施肥，如果过早给桃苗施肥的话，那桃苗根系将有可能受到不良伤害。

下面为大家介绍一下桃树苗需要的栽培：

1.及时浇水与覆盖；桃树苗栽植当年的主要任务一是保成活，二是促生长。只有栽植当年到位，翌年才能有产量和效益。桃树苗栽植以后应立即浇水，水渗下后进行地面覆盖，可以盖草，也可以覆膜。盖草，即用作物秸秆、树叶、杂草覆盖输盘，这样即能保墒，还能防寒，成活率也。覆盖地膜，在定植行内沿行向覆盖地膜，一是可地温，有利于快速生根；二是可以保温，防止水分蒸发，成活率；三是可以杂草生长。

2.定干与扶干；根据树形要求，需要干的要及时定干，定干高度一般为30~50cm，剪口下15~30cm为带，要有5~10个饱满芽，以便主枝。主干形不要定干，疏去分枝即可。芽苗栽后桩过高，影响愈合，形成死茬；过低会使接芽风干枯死。亦可在接芽上方10cm处剪砧，主干形时当作临时支柱使用。

3.检查成活率情况，及时补植；如果定植芽苗，砧木上的萌蘖与接芽争夺养分，要及时剪除，关键时期是4~5月。除萌蘖是一项细致的作业，切勿将接芽误当砧木除去。如接芽，可选留一的萌蘖作为新砧木，待秋季补接。

4.摘心芽苗定植；当新稍长至60cm左右时，若选用两主枝开心形或者三主枝开心形树形，可摘心定干，即选取两主枝或者三主枝，其余的摘心控制。

桃树苗是否能用粪不少果农朋友在种植桃树苗的时候，都会碰到一个问题，就是在挖好树坑之后是否可以撒粪直接喂桃树？直接喂粪会不会将桃苗烧死？事实上给桃树苗喂粪是没有问题的，不过需要好操作。

一、可以利用烘将鸡粪烘干，因为通过鸡粪烘烘干后的鸡粪不含水分，而且在烘干的中能够起到、的效果，可以一次性把含水量在80%左右的鲜鸡粪直接烘干至成品。

二、鸡粪必须要经过腐化，注意施用的量不能过多，以免造成肥害，施用的时候要浇水不能过干，否则便无法发挥出其肥效。粪也属于一种自然肥料，鸡粪通过晾晒使其成为粪块，或把粪块打碎形成颗粒鸡粪肥。由于鸡不能吸收饲料中的营养，因而所的鸡粪里面会存在一些饲料中的养分，有机质可以达到65%，粗蛋白素有30%，氮磷的含量在8%左右。粗蛋白素与氮磷是作为农作物绿化肥料是非常可观的，生物肥本身对一些蔬菜、水果生长就有一定辅助作用，加之有些元素在其中会促进作用进一步。