

中油6 新品种油桃树苗

产品名称	中油6 新品种油桃树苗
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

新品种油桃树苗新品种油桃树苗桃树苗

我是一个农村长大的孩子，也是一个苗木人，整天面朝黄土，背朝天。没有谁比我们更能体会到其中甘苦，没有明星、没有行业新秀，我们只能为自己代言。请给我一份信任，还你一片蓝天。以下图片近景实拍

第二是带土球起苗木法，栽植成活率高，但其施工费用高。大苗木移植时一般土球直径是植株头径的2-3倍。根据桃树苗出现僵苗的原因我们要进行适当的解决，首先是桃树苗在进行移栽工作前后，要做好相应的准备工作。栽前要充分整地，并挖好定植穴，合理施用肥料并与土壤充分混合，以待定植。粗蛋白素与氮磷钾是作为农作物绿化肥料是非常可观的，生物肥本身对一些蔬菜、水果生长就有一定辅助作用，加之有些元素在其中会促进作用进一步提高。在使用干鸡粪喂养桃树苗的时候只要掌握好每颗桃树的用量，不要过度施肥不然会出现烧死桃树苗的情况。

一般春季每周浇水1次。夏季生长旺盛，蒸发量大，每3~4 d浇水1次。秋季适当控水，以防徒长。生长季浇水应在早晨或傍晚进行，避免在烈日暴晒下浇水，也不能用冷凉的自来水或井水直接浇灌，并注意要浇透水。生产中要合理操作。

怎么培育桃树苗？1、苗圃地的选择

快速培育桃树苗嫁接成品苗，一定要选择土质为轻壤或中壤、排灌方便并且肥沃的地块为苗圃地。因在一年内培育成嫁接成品苗，必须选择良好的立地条件，这是快速育苗成功的基础。圃址选择后要进行平整土地，每亩施优质腐熟有机肥5—6立方米，深翻后作畦。

2、砧木种子的处理

砧木种子选择当年山桃或毛桃的新种子，在播种前要进行浸种，一般用冷水浸泡3—5天，每天换水1次，有条件的加入马尿或人尿少量。

3、播种时间

常规桃树育苗培育砧木通常将砧木种子于12底层积处理，第2年春季3月底—4月初将种子取出进行播种，这种出苗较晚且苗势较弱。而快速育苗应在每年秋季土壤冻前进行播种。播种采用双行带状，即大行距50cm，小行距30cm，每亩播种量山桃为40kg，毛桃60kg，覆土厚度为种子直径的3—4倍。

4、快速砧木苗，尽快达到嫁接粗度

春季苗木出土后，要及时、除草、虫害。4—6月每月2次，5—6月每月追施尿素1次，每次每亩15kg左右。要利剂控制金龟子为害幼苗。加强各项，使砧木苗在6月底以前达到嫁接粗度。

5、嫁接时间

常规育苗通常在每年7月下旬—8月下旬进行嫁接，当年接芽不萌发。而快速育苗接芽当年萌发成苗，就要提前嫁接，一般要求在6月底—7月初进行芽接。接穗选择生长良好的长梢，接芽发育良好。

6、解绑、折砧和抹芽

嫁接后2—3周解绑并在接芽以上1cm处将砧木折伤后压平，向上生长的副梢剪除，主梢摘心。这种措施是使接芽处于优势部位，迫使接芽萌发。折砧后接芽及砧木上原有芽均可萌发，要将砧木上萌发芽及时抹除，接芽迅速萌发生长。当接芽长到15—20cm时剪砧。

7、加强土肥水，接芽快速生长

接芽萌发后，要及时中耕除草、追肥，使苗圃地无杂草为害，接芽成活后每隔10—15天追施1次尿素，每次每亩施10kg左右，并且结合施肥。为使苗木成熟度，每隔15天左右结合虫害喷施0.3%的。当年秋季一般嫁接苗木高度在70—80cm，达到桃树定干高度。10月底将苗木挖出，除净叶片后砂藏假植。

桃树苗栽培桃子素有“寿桃”和“仙桃”的美称，因其肉质鲜美，又被称为“天下果”。要想吃到好桃，就需要上心桃树苗，

因此，桃树种植需要着重注意科学性和技巧性。合理选择幼苗，想要高产，就要精心挑选种子，挑选品种时要注重桃子丰产性、成熟期、白花结果等能力。对挑选桃树的生长周期进行研究。桃树全年生长，可采取大棚种植的方式或者是将部分成品的成熟时间提前，有效避开成熟高峰，从而得到较为合理的价格。播种前采用风选等物理方法除去病种，再

用10%浸种灵进行种子消毒处理，采用旱育或湿润方式育秧间栽稻统一于4月5、6日播种，主栽稻于4月10-15日播种，移栽前一周选用低毒防稻螟虫、稻飞虱一次，预防叶稻瘟一次，从而大大降低了大田期病虫害源基数减轻了大田期压力。

(2)疏间：将过密枝条或大枝从基部去掉的方法叫疏间。在扩冠期常用的疏间法主要有疏间直立枝留平斜枝、疏间强枝留弱枝、疏间弱枝留强枝、疏间轮生枝、疏间密挤枝等方法，以利于扩大树冠、平衡树势和提早结果。疏间作用是维持原来的树体结构;改善树冠内膛的光照条件，提高叶片光合效能，增加养分积累，有助于花芽形成和开花结果。

下面为大家介绍一下桃树苗需要的栽培：

1.及时浇水与覆盖；桃树苗栽植当年的主要任务一是保成活，二是促生长。只有栽植当年到位，翌年才能有产量和效益。桃树苗栽植以后应立即浇水，水渗下后进行地面覆盖，可以盖草，也可以覆膜。盖草，即用作物秸秆、树叶、杂草覆盖输盘，这样即能保墒，还能防寒，成活率也。覆盖地膜，在定植行内沿行向覆盖地膜，一是可地温，有利于快速生根；二是可以保温，防止水分蒸发，成活率；三是可以杂草生长。

2.定干与扶干；根据树形要求，需要干的要及时定干，定干高度一般为30~50cm，剪口下15~30cm为带，要有5~10个饱满芽，以便主枝。主干形不要定干，疏去分枝即可。芽苗栽后桩过高，影响愈合，形成死茬；过低会使接芽风干枯死。亦可在接芽上方10cm处剪贴，主干形时当作临时支柱使用。