

## 5公分圆皇梨树苗当年挂果

产品名称	5公分圆皇梨树苗当年挂果
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	12.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

## 产品详情

泰安区园艺场，始建于2000年，是经山东省部门备案，三证齐全单位，苗圃2000余亩。本中心历经20多年风雨洗礼，以保证为育苗宗旨，以值得信赖广交天下好友。多年来，经山东农业大学、山东省果树研究所等多家科研院校，近百余名科研专家研究，先后发展和培育了多种名特优质果树、绿化苗木新品种，产品往众多省市地区，受到广大客户广泛赞誉和一致好评。本中心为山东果树研究所定点优质果树苗繁育推广中心。公司秉承“顾客至上，锐意进取”经营理念，坚持“客户”则为广大客户提供优质服务。欢迎惠顾！

3、播种时间常规桃树育苗培育砧木通常将砧木种子于12月底层积处理，第2年春季3月底—4月初将种子取出进行播种，这种方法出苗较晚且苗势较弱。而快速育苗应在每年秋季土壤冻前进行播种。播种采用双行带状，即大行距50cm，小行距30cm，每亩播种量山桃为40kg，毛桃60kg，覆土厚度为种子直径的3—4倍。桃子是人们日常里熟悉的水果，随着科学的发展，桃树的种植研究也得到有效发展，随着人们对生活质量要求不断的提升，培养营养价值高及质量高的桃树成为了当下需要解决的问题之一，促进桃树产业发展，获取更多的经济效益。随树龄增大及产量增加，需氮量也增加。氮素不足时，新梢生长量小，枝条细而短，影响花芽分化，同时果实小，色泽差，品质低，枝与芽抗寒力下降。（2）磷：桃需磷量比氮、钾少，主要作用是使传粉受精良好，增加果实含糖量量和促花芽形成。

我基地经营苗木:桃苗：映霜红桃苗，秋彤桃苗，永莲系列桃苗，春雪桃苗，金秋红苗，中16号桃苗等。苹果苗：烟富8号苹果苗，中秋王苹果苗，M26苹果苗，M9T337苹果苗，红色之爱苹果苗等。樱桃苗：吉塞拉樱桃苗，车厘子樱桃苗，红灯樱桃苗，美早樱桃苗，布鲁克斯樱桃苗等。核桃苗：香玲核桃苗，8518核桃苗，元丰核桃苗，辽核核桃苗等。梨树苗：晚秋黄梨梨树苗，秋月梨树苗，爱宏岩梨树苗，红香酥梨树苗，梨梨树苗，梨苗等。板栗苗：泰山板栗苗，华光板栗苗，大红袍板栗苗，燕红板栗苗等。

柿子苗：柿子苗，次郎柿子苗，大秋柿子苗，阳丰柿子苗，罗田柿子苗等。石榴苗：泰山红石榴苗，蒙阴霜红石榴苗，突尼斯软子石榴苗等。李子苗：秋姬李子苗，清脆李子苗，脆红李子苗，李子苗，奉凰李子苗等。山楂苗：大棱山楂苗，大棉球山楂苗，大金星山楂苗，甜山楂苗。花椒苗：大红袍花椒苗，九花椒苗，无刺花椒苗。蓝莓苗：兔眼蓝莓苗，都克蓝莓苗，蓝丰蓝莓苗，美登蓝莓苗等。香椿苗：泰山红香椿苗。葡萄苗：无核机心葡萄苗，阳光玫瑰葡萄苗，茉莉香葡萄苗，腾人葡萄苗，夏黑葡萄苗，巨峰葡萄苗等。冬枣苗：冬枣枣树苗，金丝4号冬枣苗，脆枣苗等。无花果：波姬红无花果，布兰瑞克无花果苗，玛斯义陶芬无花果苗等。猕猴桃：红阳猕猴桃苗，海沃德猕猴桃苗，徐香猕猴桃苗，泰山一号猕猴桃苗等。草莓苗；红颜草莓苗，章姬草莓苗，全明星草莓苗，甜查理草莓苗，丰香草莓苗等

桃树苗的修剪桃树苗整理，1)短截：就是把一年生枝条剪去一部分，距芽上方0.5~1.0厘米，短截对全枝或全树来讲是削弱作用，但对剪口下芽抽生枝条起促进作用，可以扩大树冠，复壮树势，但枝条短截后可以促进侧芽的萌发。粗蛋白素与氮磷钾是作为农作物绿化肥料是非常可观的，生物肥本身对一些蔬菜、水果生长就有一定辅助作用，加之有些元素在其中会促进作用进一步提高。在使用干鸡粪喂养桃树苗的时候只要掌握好每颗桃树的用量，不要过度施肥不然会出现烧死桃树苗的情况。山区因开花期气温较低，为把握起见，一般不采取疏花，而是采取疏果。疏果时间为第二次生理落果结束后的稳果期，即果实长到拇指大小时进行。疏果应视品种和树势而定，一般强树强枝多留、弱树弱枝少留，坐果率低的多留、坐果率高的少留，小果型品种多留、大果型品种少留，长果枝多留、中果枝少留、短果枝和花束状结果枝基本不留。

## 浅谈梨树苗高产栽培

梨是抗逆性较强、适性较广果树，寿命长、适宜密植、丰产性好。在后一年挂果，三年丰产，四年亩产可达10000斤。晚秋黄梨品质好，前景分广阔。

1.在栽植方面，从苗木落叶开始即可栽植，一般可采取1.5×2.5米距离栽植，亩栽178株。也可高密栽培（1.5-2.5×1.5米，分宽窄行，亩栽260株，可实现早期丰产）。定植穴深0.8米，宽1米（高密栽培可挖沟，沙壤土不挖）。穴底铺秸秆至20厘米深，然后分层施入50~100千克有机肥，覆土镇实，即可移植。

## 2、土壤

（1）、深翻熟化，改良土壤。深翻时期以秋季深翻为适宜，一般深度为60~100厘米。深翻同时要结合深施有机肥，逐年扩大深翻范围，但必须注意保护根系，尤其粗1厘米以上主、侧根。

（2）、秋耕及中耕除草。

（3）、果园间作。果园间作目的是“以园养园、以短养长”，但间作物具备条件是：生长期短、植株矮小、能改良土壤结构、本身具有经济价值以及病虫害较少。

(4)、种植绿肥，果园覆盖。

### 3、施肥

(1)、花前肥：1月至开花前进行，施性氮肥为主，施量占全年施氮量20%，初结果和旺树此时不宜施氮肥。

(2)、壮果肥：6月至7月初进行，如树势正常，新梢量多，负果适度，追肥以肥为主。如树体衰弱，负果量多，以氮肥为主。采收前一个月停止施氮肥。

(3)、根外追肥：4~5月份梨树由储藏养分转变到当年同化养分转变时期及采收后、大年，采根外追肥对及恢复树体营养水平，效果非常明显。

无论是栽培方面还是其他方面都要注意，这样才能保证苗木正常生长，并且果实产量，和产量方面都达到！

6、叶面喷肥很重要。叶面肥可以多样化，尿素、磷酸二氢钾和精品叶面肥都可以，同时添加少量生长激素。7、留芽立杆。不论采用主干形还是一边倒形，都要当机立断选留一壮芽，其余的抹除，芽长到10厘米高时应尽快绑缚在杆上。如果不用单元素化肥用复混肥（必须是三元复混肥），则将用量的1/3做基肥，另2/3做追肥。3、追肥：在施基肥的基础上，将氮肥总量的1/2做追肥。花前和生理性落果后各施一次，每次施肥量各占氮肥总量的1/4，即每株施氮0.058—0.112kg，相当于尿素0.13—0.25kg。