

# 脆黄桃苗木亩产万斤桃 2年黄桃苗

产品名称	脆黄桃苗木亩产万斤桃 2年黄桃苗
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

## 产品详情

泰安园艺场，始建于2000年，是经山东省部门备案，三证齐全单位，苗圃2000余亩。本中心历经20多年风雨洗礼，以保证为育苗宗旨，以值得信赖广交天下好友。多年来，经山东农业大学、山东省果树研究所等多家科研院校，近百余名科研专家研究，先后发展和培育了多种名特优质果树、绿化苗木新品种，产品往众多省市地区，受到广大客户广泛赞誉和一致好评。本中心为山东果树研究所定点优质果树苗繁育推广中心。公司秉承“顾客至上，锐意进取”经营理念，坚持“客户”则为广大客户提供优质服务。欢迎惠顾！

8. 加强病虫害 主要病虫害有柿园斑病、柿角斑病、柿蒂虫和柿棉蚧等。要以预防为主，综合，保证树体完整及树势健壮。9. 培月牙土埂 冬季在距树根部1m左右、西北方向培以高70cm的月牙土埂，可降低树干附近的风速，提高地温，减轻和避免受冻抽条。4、巧施肥水：进入结果盛期的大树，要加强肥水管理，春季早施基肥，秋季施足基肥，但追肥不能过早。一般在5月份枝条枯顶期和7月份果实膨大期追肥，这两次肥对提高坐果率有明显的促进作用，并且还可以增加下一年的花芽数量和提高花芽质量，遇天气干旱时进行浇水。柿子树栽培需要注意什么柿子树种植的注意事项柿子树是阳性树种，所以种植的气候和土壤也是有要求的。柿子树要在充足阳光和深厚、肥沃、湿润、排水良好的土壤，适生于中性土壤才行。1、选好品种：可根据当地立地条件和市场情况以早、中、晚熟品种按比例栽培，并配植授粉树。

我基地经营苗木:桃苗：映霜红桃苗，秋彤桃苗，永莲系列桃苗，春雪桃苗，金秋红苗，中16号桃苗等。苹果苗：烟富8号苹果苗，中秋王苹果苗，M26苹果苗，M9T337苹果苗，红色之爱苹果苗等。樱桃苗：吉塞拉樱桃苗，车厘子樱桃苗，红灯樱桃苗，美早樱桃苗，布鲁克斯樱桃苗等。核桃苗：香玲核桃苗，8518核桃苗，元丰核桃苗，辽核核桃苗等。梨树苗：晚秋黄梨梨树苗，秋月梨树苗，爱宏岩梨树苗，红香酥梨树苗，梨梨树苗，梨苗等。板栗苗：泰山板栗苗，华光板栗苗，大红袍板栗苗，燕红板栗苗等。

柿子苗：柿子苗，次郎柿子苗，大秋柿子苗，阳丰柿子苗，罗田柿子苗等。石榴苗：泰山红石榴苗，蒙阴霜红石榴苗，突尼斯软子石榴苗等。李子苗：秋姬李子苗，清脆李子苗，脆红李子苗，李子苗，奉凰李子苗等。山楂苗：大棱山楂苗，大棉球山楂苗，大金星山楂苗，甜山楂苗。花椒苗：大红袍花椒苗，九花椒苗，无刺花椒苗。蓝莓苗：兔眼蓝莓苗，都克蓝莓苗，蓝丰蓝莓苗，美登蓝莓苗等。香椿苗：泰山红香椿苗。葡萄苗：无核机心葡萄苗，阳光玫瑰葡萄苗，茉莉香葡萄苗，腾人葡萄苗，夏黑葡萄苗，巨峰葡萄苗等。冬枣苗：冬枣枣树苗，金丝4号冬枣苗，脆枣苗等。无花果：波姬红无花果，布兰瑞克无花果苗，玛斯义陶芬无花果苗等。猕猴桃：红阳猕猴桃苗，海沃德猕猴桃苗，徐香猕猴桃苗，泰山一号猕猴桃苗等。草莓苗；红颜草莓苗，章姬草莓苗，全明星草莓苗，甜查理草莓苗，丰香草莓苗等

柿子苗不同肥料的施肥方法介绍 在柿子苗的生长过程中我们需要对其进行按时施肥才能保证其茁壮成长，而且每一种肥料的施肥方法还不同，所以施肥工作是一项苗木种植的工作，今天我们就来介绍一下柿子苗不同肥料的施肥方法以及注意事项。2、石灰水脱涩法：按水：生石灰为10：1的比例调配，在石灰水温和时放入柿果，以刚好淹没柿果为度，轻轻搅拌，然后封闭容器口，约3-4天后柿子可脱涩。3、混装脱涩法：将柿果与少量成熟的苹果、梨、猕猴桃等果实（用量约为柿子的1/10），混装于容器内密封，利用其他成熟果实所产生的乙烯促进柿果脱涩，在20℃的条件下3-7天即可较好脱涩。山地柿园施有机肥有困难，可种植绿肥，每667平方米可埋施绿肥0.5~1吨。柿树追肥可分两次，一次在新梢停止生长至开花前施用，以氮肥为主，适当配施磷、钾肥，主要是促进花器官发育，提高坐果率。第二次在膨果初期施用，以三元复混肥为好。

## 浅谈梨树苗高产栽培

梨是抗逆性较强、适性较广果树，寿命长、适宜密植、丰产性好。在后一年挂果，三年丰产，四年亩产可达10000斤。晚秋黄梨品质好，前景分广阔。

1.在栽植方面，从苗木落叶开始即可栽植，一般可采取1.5×2.5米距离栽植，亩栽178株.也可高密栽培（1.5-2.5×1.5米,分宽窄行,亩栽260株,可实现早期丰产）。定植穴深0.8米,宽1米(高密栽培可挖沟，沙壤土不挖).穴底铺秸秆至20厘米深，然后分层施入50~100千克有机肥，覆土镇实，即可移植。

## 2、土壤

（1）、深翻熟化，改良土壤。深翻时期以秋季深翻为适宜，一般深度为60~100厘米。深翻同时要结合深施有机肥，逐年扩大深翻范围，但必须注意保护根系，尤其粗1厘米以上主、侧根。

（2）、秋耕及中耕除草。

（3）、果园间作。果园间作目的是"以园养园、以短养长"，但间作物具备条件是：生长期短、植株矮小、能改良土壤结构、本身具有经济价值以及病虫害较少。

(4)、种植绿肥，果园覆盖。

### 3、施肥

(1)、花前肥：1月至开花前进行，施性氮肥为主，施量占全年施氮量20%，初结果和旺树此时不宜施氮肥。

(2)、壮果肥：6月至7月初进行，如树势正常，新梢量多，负果适度，追肥以肥为主。如树体衰弱，负果量多，以氮肥为主。采收前一个月停止施氮肥。

(3)、根外追肥：4~5月份梨树由储藏养分转变到当年同化养分转变时期及采收后、大年，采根外追肥对及恢复树体营养水平，效果非常明显。

无论是栽培方面还是其他方面都要注意，这样才能保证苗木正常生长，并且果实产量，和产量方面都达到！

1、每株施用美农欣多元素1斤或硅钙镁钾肥1斤，恢复健壮生长。2、也可用氨基酸涂杆时，加入宁南霉素或贝博，方法是将宁南霉素或贝博配成50倍液与氨基酸混合涂杆。（二）保花、保果措施：1花开三分之一喷“云大全树果”600倍+富路硼1000倍间隔3-5天，再喷一次。正确的做法：对落花落果严重的品种，可在果台副梢长为20~25厘米时，留6~7片叶进行轻摘心。对于红富士等大果型的品种必须保护利用好果台副梢。误区五：柿子苗剪子、锯不消毒 腐烂病、干腐病的流行，与剪子、锯等带病菌有很大关系。1、尿素是容易溶性的化肥，移动性强，极易造成流失。旱地撒施尿素后，切忌立即浇水。2、碳态氮化肥不要与碱性的肥料混施。碳铵、硫铵、硝铵、磷铵等碳态氮化肥遇到碱性的物质，会造成氮的损失。切忌与草木灰、窑灰钾肥等碱性肥料以及石灰氮等混合施用。