

2公分春红桃树苗 适合的土壤环境

产品名称	2公分春红桃树苗 适合的土壤环境
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

我是一个农村长大孩子，也是一个苗木人，整天面朝黄土，背朝天。没有谁比我们更能体会到其中甘苦，没有明星、没有行业新秀，我们只能为自己言。请给我一份信任，还你一片蓝天。以下图片近景实拍

嫁接可芽接或切接。芽接于6-8月进行，切接在1~2月进行。扩坑改土，深翻施重肥。追肥应以勤施薄施，梢期多施为原则。肥料要先稀后浓，用量随树体扩大而增加，注意整形控梢，培养丰产树型，夏剪主要将徒长枝进行摘心或短剪，并疏剪从主干、主枝萌发出来的徒长枝，冬剪主要是剪去枯枝、病虫枝、下垂拖地枝。

同时促进碳水化合物的增加，使李树早果丰产。六、以疏为主，疏短结合。李树常以自然开心形整。定植苗高80厘米时定干，主干上错落着生3个主枝，直线延长，在侧面分生副主枝构成骨干枝。夏季，各主枝达20—30厘米长时进行摘心或短截。调查中发现受冻绝产的园片中，有水的水池和药池上方的枝座果率极高，对产量几乎无影响。同一果园，树势弱的园片较树势强的园片冻害重，沙滩果园受害惨重，粘土地果园受害相对较轻。二、树行与冻害的关系苹果、梨、杏等果树，树冠下部重，上部轻。

怎么培育桃树苗？1、苗圃地选择

快速培育桃树苗嫁接成品苗，一定要选择土质为轻壤或中壤、排灌方便并且肥沃地块为苗圃地。因在一年内培育成嫁接成品苗，必须选择良好立地条件，这是快速育苗成功基础。圃址选择后要平整土地，每亩施优质腐熟有机肥5—6立方米，深翻后作畦。

2、砧木种子处理

砧木种子选择当年山桃或毛桃新种子，在播种前要进行浸种，一般冷水浸泡3—5天，每天

换水1次，有条件加入马尿或人尿少量。

3、播种时间

常规桃树育苗培育砧木通常将砧木种子于12月底层积处理，第2年春季3月底—4月初将种子取进行播种，这种苗较晚且苗势较弱。而快速育苗在每年秋季土壤冻前进行播种。播种采双行带状，即大行距50cm，小行距30cm，每亩播种量山桃为40kg，毛桃60kg，覆土厚度为种子直3—4倍。

4、快速砧木苗，尽快达到嫁接粗度

春季苗木出土后，要及时、除草、虫害。4—6月每月2次，5—6月每月追施尿素1次，每次每亩15kg左右。要利剂控制金龟子为害幼苗。加强各项，使砧木苗在6月底以前达到嫁接粗度。

5、嫁接时间

常规育苗通常在每年7月下旬—8月下旬进行嫁接，当年接芽不萌发。而快速育苗接芽当年萌发成苗，就要提前嫁接，一般要求在6月底—7月初进行芽接。接穗选择生长良好长梢，接芽发育良好。

6、解绑、折砧和抹芽

嫁接后2—3周解绑并在接芽以上1cm处将砧木折伤后压平，向上生长副梢剪除，主梢摘心。这种措施是使接芽处于优势部位，迫使接芽萌发。折砧后接芽及砧木上有芽均可萌发，要将砧木上萌发芽及时抹除，接芽迅速萌发生长。当接芽长到15—20cm时剪砧。

7、加强土肥水，接芽快速生长

接芽萌发后，要及时中耕除草、追肥，使苗圃地无杂草为害，接芽成活后每隔10—15天追施1次尿素，每次每亩施10kg左右，并且结合施肥。为使苗木成熟度，每隔15天左右结合虫害喷施0.3%。当年秋季一般嫁接苗木高度在70—80cm，达到桃树定干高度。10月底将苗木挖，除净叶片后砂藏假植。

桃树苗栽培桃子素有“寿桃”和“仙桃”美称，因其肉质鲜美，又被称为“天下果”。要想吃到好桃，就需要上心桃树苗，

每生产50千克果子，需施基肥100~150千克。基肥施用期以9月下旬~10月上、中旬为好，施用突出“深、重、全”的原则。以沟施为主。无机肥主要是根据树势、产量进行经验施肥。在氮、磷、钾三要素中，脆红李对钾的需求量较大。李子苗常见的栽培清树摘净并清除残留在树上的病果、虫果、僵果，然后收集在一起挖抗深埋。剪去树上的干枯枝、病虫枝、根部萌发的根蘖并带出园外深埋或烧掉。叶面施肥果实采收后应尽早喷施1次0.2

%~0.3%的磷酸二氢钾溶液，以增强树势，有利于树体营养的积累和越冬。正常年只需浇一次水，即：秋施基肥后浇水（是沟施）沉实。如遇干旱年份，可灌花前水、花后水、果实膨大水等。2、排水：脆红李树耐旱不抗涝，如遇大雨要及时排水，保持园内不积水。李子苗种植密度知识、排水技法一、园地选择。

下面为大家介绍一下桃树苗需要栽培：

- 1.及时浇水与覆盖；桃树苗栽植当年主要任务一是保成活，是促生长。只有栽植当年到位，翌年才能有产量和效益。桃树苗栽植以后立即浇水，水渗下后进行地面覆盖，可以盖草，也可以覆膜。盖草，即作物秸秆、树叶、杂草覆盖输盘，这样即能保墒，还能防寒，成活率也。覆盖地膜，在定植行内沿行向覆盖地膜，一是可地温，有利于快速生根；是可以保温，防止水分蒸发，成活率；三是可以杂草生长。
- 2.定干与扶干；根据树形要求，需要干要及时定干，定干高度一般为30~50cm，剪下15~30cm为带，要有5~10个饱满芽，以便主枝。主干形不要定干，疏去分枝即可。芽苗栽后桩过高，影响愈合，形成死茬；过低会使接芽风干枯死。亦可在接芽上方10cm处剪砧，主干形时当作临时支柱使。
- 3.检查成活率情况，及时补植；如果定植芽苗，砧木上萌蘖与接芽争夺养分，要及时剪除，关键时期是4~5月。除萌蘖是一项细致作业，切勿将接芽误当砧木除去。如接芽，可选留一萌蘖作为新砧木，待秋季补接。
- 4.摘心芽苗定植；当新稍长至60cm左右时，若选两主枝开心形或者三主枝开心形树形，可摘心定干，即选取两主枝或者三主枝，其余摘心控制。

桃树苗是否能粪不少果农朋友在种植桃树苗时候，都会碰到一个问题，就是在挖好树坑之后是否可以撒粪直接喂桃树？直接喂粪会不会将桃苗烧死？事实上给桃树苗喂粪是没有问题，不过需要好操作。

一、可以利烘将鸡粪烘干，因为通过鸡粪烘烘干后鸡粪不含水分，而且在烘干中能够起到、效果，可以把含水量在80%左右鲜鸡粪直接烘干至成品。

、鸡粪必须要经过腐化，注意施量不能过多，以免造成肥害，施时候要浇水不能过干，否则便无法发挥其肥效。粪也属于一种自然肥料，鸡粪通过晾晒使其成为粪块，或把粪块打碎形成颗粒鸡粪肥。由于鸡不能吸收饲料中营养，因而所鸡粪里面会存在一些饲料中养分，有机质可以达到65%，粗蛋素有30%，氮磷含量在8%左右。粗蛋素与氮磷是作为农作物绿化肥料是非常可观，生物肥本身对一些蔬菜、水果生长就有一定辅助作，加之有些元素在其中会促进作进一步。

在使粪喂养桃树苗时候只要好每颗桃树量，不要施肥不然会现烧死桃树苗情况。