

卖凤尾竹北京散尾葵批发基地

产品名称	卖凤尾竹北京散尾葵批发基地
公司名称	北京绿苑名坊花卉园艺有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区花乡
联系电话	86-010-66516507 13001003098

产品详情

生活当中，不少朋友把凤尾竹和散尾葵容易混淆，因为二者确实很相似，如果不放在一起，单纯来看，不少人就不知道究竟是凤尾竹还是散尾葵，并且二者都是办公室和家庭常见绿色植物，花木君就给朋友们介绍一下二者区别与养护。先说凤尾竹，凤尾竹是原产我国的小型丛生竹，属于禾本科、箬竹属常绿植物，丛生、秆高1米到3米，直径0.5-1厘米，节长16-20厘米，中空，从观感上来看，比筷子要细；叶细小，一般在3厘米左右，常20片排生于枝的两侧，似羽状；叶色浓密成球状，梢头微弯、壁薄、竹秆深绿色、被稀疏白色短刺、幼时可见白粉、秆环不明显，笋期较长，从4月至10月不断萌发新笋，出笋期可以延续3-6个月。

凤尾竹株型矮小，绿叶细密婆娑，风韵潇洒，好似凤尾，因此得名。植物体木质化，常呈乔木或灌木状，广泛分布于我国南方省份，由于此竹富有灵气而被命名为"观音竹"，不少庙宇道观里都栽植此竹，观赏价值较高，若配以山石摆件，制做成盆景，非常有情趣。散尾葵 再看散尾葵，属于外来物种，原产马达加斯加，又名黄椰子、紫葵，属于棕榈科、散尾葵属丛生常绿灌木或小乔木。高2米到5米，茎粗4、5厘米，茎干光滑，黄绿色，无毛刺，嫩时披蜡粉，上有明显叶痕，纹状呈环。叶面滑细长，羽状全裂，长40厘米到1.5米，叶柄稍弯曲，先端柔软。花期5月，果实略为陀螺形或倒卵形，果期8月。

散尾葵引进国内后，由于株型高大，生长迅速，叶型细高而微弯，四季常绿，养护简单粗放，因而是办公室常见绿化植物。散尾葵 凤尾竹和散尾葵的区别：科属不同：上面介绍了，二者不是同一科属的植物。一个是我国原产的竹子类，一个是引进的棕榈类植物。茎干区别：凤尾竹茎干细小，基本上没有筷子粗，散尾葵高大，一般都在2两米左右，茎干比凤尾竹粗壮；凤尾竹茎干中空，散尾葵是实心的。叶子区别：凤尾竹叶子细小，散尾葵叶子长并且大，散尾葵叶子是凤尾竹的十倍有余。开花周期不同：凤尾竹很少开花，有的甚至几十年上百年才开一次花；散尾葵属于热带植物，养护好的话每年都会开金黄色花。凤尾竹的养护管理：凤尾竹喜温暖湿润和半阴环境，耐寒性稍差，不耐强光曝晒，怕渍水，宜肥沃、疏松和排水良好的壤土，冬季温度不低于0 。

土壤：凤尾竹喜酸性、微酸性或中性土壤，最好为疏松肥沃、排水良好的沙质壤土，可用园土拌腐殖土与细沙做基质，为了提高成活率，可以加入泥炭土和蛭石珍珠岩最好。水分：凤尾竹喜湿怕涝，上盆浇定根水后，尽量少浇水，但要保持盆土湿润，如果盆土缺水，竹叶会卷曲，此时，应及时浇水，则竹叶又会展开。春秋季节每三天左右浇水一次，夏天平均1至2天浇水一次，冬天少浇水，但要保证盆土湿润，以防"干冻"。光照：凤尾竹喜光稍耐阴，喜温暖湿润的气候。凤尾竹喜向阳高爽之地，有"向阳则茂，宜种高台"之说;春、夏、秋三季只需放置在窗口通风处，入冬放置在向阳处，就可良好生长。

施肥：在生长季节可用腐熟的饼肥水每月施肥一次，冬季和夏季不要施肥。

散尾葵的养护管理：散尾葵和凤尾竹的养护管理基本相同，唯一区别是散尾葵是热带植物，因此在浇水上要比凤尾竹多，在光照和温度上要比凤尾竹不耐寒，更喜温暖的气候，适宜生长温度为20 到35 ，如果低于10 就可能死亡，而凤尾竹只要不低于0 就可过冬。凤尾竹和散尾葵的繁殖一般都采取分株繁殖，在春秋季节，将生长过密的株丛，从盆中倒出，从根茎处用刀切开，注意不要伤根，另行上盆即可。二者的病虫害一般都是容易发生叶枯病和锈害，可采取加强通风，发病期避免雨淋和喷淋；及时将受害枝叶剪除，阻止继续浸染，修剪后伤口涂抹达科宁药膏进行处理；如有病害发生可用70%甲基托布津800液或75%百菌清1000倍液喷洒，间隔7-10天喷施一次，连续喷3至4次，可有效控制病情。