

6公分樱桃树 黄水晶樱桃苗一亩地种植多少棵

产品名称	6公分樱桃树 黄水晶樱桃苗一亩地种植多少棵
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

黄水晶樱桃苗一亩地种植多少棵

泰安苗木有限公司目前栽培的大樱桃品种，除了拉宾斯、斯坦勒、艳阳、桑提娜等少数品种为自花结实品种可以单一栽培外，95%以上的大樱桃品种自花不结实、无常授粉结果，必须配置授粉树。即使是自花结实品种，也建议大家配置一定比例授粉树，以达到的产量。

年是关键，苗木发芽后保留一个主枝向上生长，注意喷药防止害虫侵害顶芽，发出的侧枝粗度超过主枝一半的随时剪除，以防止侧枝与主枝争夺养分，影响主干向上生长，从主干基部厘米开始留分枝。前期和中期分施几次氮肥尿素，苗木快速生长，一般当年即可长到米高以上。月份以后停止使用氮肥，追施磷钾肥，对侧枝扭稍拉枝，可根据树势适度喷洒植物生长调节剂，如多效唑矮壮素等，以达到控制旺长，花芽形成，为第二年结果打好基础。

配置授粉树需要两个条件

一是花粉量大、与主栽品种花期相遇；

二是与主栽品种授粉亲和，从学术角度说就是他们的S基因型要不同。

在这两个条件的基础上，授粉品种尽量选择经济性状优良、售价高的品种。

以美早为主栽品种的果园，建议大家选择桑提娜、黑珍珠、福星、布鲁克斯等品种为授粉树。

以福晨为主栽品种，建议大家选择黑珍珠、水晶、桑提娜、拉宾斯为授粉品种。不要选择早大果、布鲁克斯为授粉品种。

拓展资料桃树休眠期十二月至二月果树休眠期，主要病害流胶病腐烂病干腐病。粗皮腐烂康倍涂抹病斑。冬剪:按照不同的树形标准，及时疏除徒长枝交叉枝重叠枝无花枝等，合理选留果枝，采用长放修剪法，果枝长放不短截。各骨干枝头依生长空间适当处理。萌芽前期三月份花芽萌动前，主要病虫害流胶病小叶病介壳虫。赢力倍 刹克斯倍 高纯锌倍。水肥追施萌芽肥以氮素肥料为主，每棵施尿素-斤，施肥后及时浇透萌芽水。

以福星为主栽品种，可以选择萨米脱、艳阳、黑珍珠、拉宾斯等为授粉品种。

以萨米脱为主栽品种，可选择艳阳、黑珍珠、佳红、斯帕克里为授粉品种。大家注意生产中常见的美早、红灯2个品种的S基因型相同，不能相互授粉。在生产上，建议樱桃建园时一般至少要栽培3个品种，以保证品种间相互授粉。面积10亩以上的果园品种要5个以上，而且成熟期要错开，以防采收期过于集中。

周围的枝干可适当剪去部分，减缓生长，也它和大的枝干抢夺养分。整体总之要做到透风有光，形状杰出。花果这是增产保质的重要措施。花期实时人工授粉，采纳多种保花保果。着花坐果过多时，要实时疏花疏果。疏花以为好，每个花序留一两个便可。疏果期在疏花后-天，大的水果如苹果梨提倡留一个单果，对于小的如葡萄枣子要进行果穗梳理。给果实套袋可以防虫，通常在收成前天拿掉，利于光照增色。接近成熟期时，每天傍晚对果树喷少量水，增强光合作用，也可达到果实糖分，加大着色面积的作用。

配置比例上，主栽品种可选择1-2个，所占比例在60-70%，授粉品种占30-40%。

对于采摘园，品种种类比例可以多一些、丰富一些，不同成熟期、不同特色的优良品种，拉长果实采摘期，不同人群的需要。

而对于授粉树配置不当的成龄树果园，我们可通过高接授粉品种、有条件地可以直接移栽结果的授粉树，来解决授粉树配置不当的问题。

栽培技术一般用嫁接繁殖。其砧木在南方用毛桃，北方用山桃。也有用本砧或李梅杏毛樱桃等作砧木的。实生繁殖在某些产区仍有应用。澳大利亚用扦插法繁殖黄桃已获成功。桃园不宜连作。栽植距离南方稍密，每亩约~株；北方稍稀，每亩约~株。山地栽培和用毛樱桃矮化砧苗时密度可。一般在秋冬定植,北方则行春植。桃树生长,幼树宜控制氮肥施用，以免引起徒长。盛果期后可氮肥施用量，并配合施用磷钾肥料。每年除施基肥外，还须在开花后果实期和采收后，施用性追肥。

施肥建议产量水平公斤/亩以上有机肥~方/亩，氮肥N~公斤/亩，磷肥PO~公斤/亩，钾肥KO~公斤/亩；产量水平~公斤/亩有机肥~方/亩，氮肥N~公斤/亩，磷肥PO~公斤/亩，钾肥KO~公斤/亩；产量水平~公斤/亩有机肥~方/亩，氮肥N~公斤/亩，磷肥PO~公斤/亩，钾肥KO~公斤/亩。对前一年落叶早或负载量高的果园，应加外追肥，萌芽前可喷施~次%~%的尿素，萌芽后至月中旬之前，定期按次尿素与次的喷施，浓度为%~%。