

2年核桃苗多少钱黑核桃苗优新品种

产品名称	2年核桃苗多少钱黑核桃苗优新品种
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

核桃苗嫁接的流程——核桃苗方块芽接嫁接时间

5月下旬至7月初均可进行。此期嫁接成活率高，生长旺盛。过早，接穗上的芽太嫩，嫁接后不易成活;过晚，嫁接后新梢生长期短，新梢的成熟度低，越冬困难。

嫁接前准备

选接穗：选择当年生新梢中下部较饱满的芽。***选择直顺的新梢，尽量避免弓字形和三棱形的新梢做接穗，接穗采后立即去掉叶片，留1厘米长的叶柄即可，以防水分蒸发。***随采随接，若不能随采随接，要小心保管好，放在潮湿阴凉地方，保存最多不能超过72小时。

选砧木：两年或两年以上的实生幼树选当年生新梢时，生长量要大于40厘米，也可以选一

年生枝，接芽部位的直径要大于1.2厘米。

嫁接步骤黑核桃苗

取芽：取长方形芽或正方形芽均可。上边刀口距芽上边缘1厘米，下刀口距叶柄下边缘约1厘米，两边以叶柄宽度为准或稍宽即可。可以做一个标准工具进行取芽，既准又快。

砧木处理：在选好的砧木上比较光滑的一面定好位置，把要开口处的下部叶全部去掉，上部留3~4个复叶，用于供给营养，把多余的上部梢去掉。开一个与接芽相当的口，可以单开门，也可以双开门。开口的下部可以多出2~3毫米，作为伤流的槽，以免伤流伤芽。

贴芽：把取下的芽立即放入门内，贴好，压实，绑紧。对于罗锅树，芽和门要注意对好，肚对肚，背对背。用宽为1.5厘米的透明塑料条，从距下边缘1厘米的地方开始向上裹，裹到距刀口上边缘1厘米的地方止，把芽片包紧包严，防止水分蒸发和雨水渗入，注意要露出芽。

嫁接后7~10天，可以看出成活情况，活的，芽保持绿色;死的，芽变褐或黑，要及时补接。12~13天时，活了的芽明显膨大。芽成活后要及时除萌，以便集中供养。

剪砧木：当嫁接的新芽萌发3~5厘米时，在芽上方留3~5厘米枝干，其余的全部去掉，把新萌的枝芽轻轻绑在留好的枝干上，以防风折。另外，要根据新梢的生长量，及时解掉绑扶的塑料条。

嫁接后管理施肥方法第一

放射状肥5年生以上的幼树从树冠边缘的不同方位开始，向树干方向挖 4-8 条放射状的沟，长度依树冠的大小而定，宽度 40-50 厘米，深度依肥料种类而异。施肥基沟深为 30-40 厘米，追肥沟深为 10-20 厘米。每年施肥沟的位置要变更，并随树冠的不断扩大而逐渐外移。

剪掉上部枝条后，新芽长得很快，但秋天不易落叶，贪青旺长，所以，要采取相应的措施，以防其遭受冻害。8月下旬开始控肥水，以防徒长。在立秋前后进行摘心，以提高新枝的木质化程度。9月上中旬叶还未落时，要人工促其老化，可喷乙烯利50ppm，不宜浓度过大。

核桃树栽植第二年修剪

据当地气温在3月20日春分前浇反清水！现在要给核桃树定干修剪！具体的方法如下！主干疏层形

有明显的中心干，干高0.8-1.2米，主枝6-7个，分三层，成形后树冠呈半圆形或圆头形。中心枝要选留直立向上的强枝加以培养，以保持其优势。一层主枝要选留角度好、方向正、位置适当、长势均衡的三个分枝加以培养，层内距为40-60厘米。其余枝条采取去强留弱的方法，使留下的枝条辅养树体。侧枝的选留：侧枝分布要适当。一层主枝上各选留3个，二层主枝上各选留2个，三层主枝上各选留1个。基部三主枝的第一侧枝要同向选留，以防互相干扰。一侧枝距中心干的距离为80-100厘米；在一侧枝相反方向40-80厘米处选留第二侧枝，在二侧枝对面80厘米处选留三侧枝。这样可以充分利用空间，避免侧枝丛生拥挤。自然开心形自然开心形又称三大主枝自然开心形，无明显的中心干，三大主枝同时着

生在主干上。由于核桃幼树生长快，极性强，上一个主枝往往直立生长，所以在时要多留1-2个主枝，2-3年后主枝基角已基本固定再选留成3个主枝，疏除多余的分枝。否则不能形成理想的树形。其侧枝的选留方法与主干疏层形基部三主枝基本相同，只是一侧枝距主干的距离适当缩短。注意修剪时一定要斜剪，必要的时候涂上油漆！

核桃苗管理：5月份左右需要注、随时注意观察核桃苗，此季节要观察是否有病虫害，发现虫害要及时打聚酯类型杀虫剂，喷打时间在傍晚4-5点左右。

2、敷地膜的客户注意，气温升高，可以把地膜去掉，或者敷点草，以免地膜根部温度过高，烧死苗子。

3、苗子在浇水时顺便在踩实苗子根部土壤、以免根与土之间有空隙会产生菌病。

4、套种其他作物的客户、一定要留好营养带、尤其是小麦（成熟期热量较大）

以免后期苗子营养不良叶子干枯或是热浪灼伤。

5、全部展开叶子的可以喷施叶面肥加托布津或者多菌灵！

6、自己或者周围打除草的，一定要注意用药的选择。

7、打除草剂之前请提前告知我！根据土地实际墒情浇水，别旱了！