

# 1年生石榴苗河南种植 3公分石榴树价格

产品名称	1年生石榴苗河南种植 3公分石榴树价格
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

## 产品详情

### 1公分石榴树苗如何进行修剪.1公分石榴树苗

1公分石榴树苗1公分石榴树苗如何进行修剪泰安园艺场位于泰安高新区，始建于2000年，是经山东省部门备案，三证齐全单位，苗圃2000余亩。本中心历经20多年风雨洗礼，以保证为育苗宗旨，以值得信赖广交天下好友。多年来，经山东农业大学、山东省果树等多家科研院校，近百余名科研专家研究，先后发展和培育了多种名特优质果树、绿化苗木新品种，产品销往众多省市地区，受到广大客户的广泛赞誉和一致好评。本中心为山东果树定点优质果树苗繁育推广中心。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

排水沟深度应使高水位低于根系集中层40厘米以下，积水轻或沙滩地园片4~6行树挖一条沟，积水重或土质黏重的可2~3行树挖一条沟，沟口与排水渠相通。遇大雨，雨水可迅速从李园排出。李子苗栽植时期和栽植方法(1)栽植时期：北方秋栽易发生冻害和抽条现象，所以一般采用春栽。(2)花后肥：在谢花1~2周施入，以氮为主，配以磷钾肥。主要是促进新梢和果实生长，减少落果。(3)壮果肥(硬核期)：在5月下旬至6月上旬果实硬核期施入，以钾肥为主、配以氮磷肥。促进胚和核的发育、花芽分化、果实膨大和为下一年结果打下基础。一般株施磷酸二氢钾0.5公左右，以提高果实糖度，增进着色。(4)采果肥：在果实成熟前15~22天施入，以磷、钾肥为主，促进果实膨大，提高果实品质。叶面喷肥在整个生长季均可进行。种类和浓度：尿素0.3%，磷酸二氢钾0.3%~0.5%，硫酸亚铁0.2%~0.5%，硼砂0.3%，硫酸锌0.1%，氨基钙300~400倍液，氯化钙0.2%~0.3%。我基地经营各种苗木:桃苗：映霜红桃苗，秋彤桃苗，永莲系列桃苗，春雪桃苗，金秋红苗，中油16号桃苗等。苹果苗：烟富8号苹果苗，中秋王苹果苗，M26苹果苗，M9T337苹果苗，红色之爱苹果苗等。樱桃苗：吉塞拉樱桃苗，车厘子樱桃苗，红灯樱桃苗，美早

櫻桃苗，布鲁克斯櫻桃苗等。核桃苗：香玲核桃苗，8518核桃苗，元丰核桃苗，辽核核桃苗等。

基肥秋施为好，成年李树，基肥每株施农家肥50—100公斤。2、追肥（1）花前追肥：可在李树萌芽前10天（4月上旬），株施0.5—1公斤性氮肥或25公斤腐熟人粪尿。（2）花后追肥：应及时追施性氮钾肥，以减少生理落果，在5月下旬至6月中旬，株施0.5公斤。四、科学施肥。科学施肥能使树木体发育良好。防止“大小年”结果，提高产量，增时果实品质，延长结果年龄，增强树体对不良环境和病虫害的抵抗力。李树进入结果期后一般年施3—4次肥。除子地下施肥外，还应补施叶面肥1—2次，在果实硬核期和膨大期分别用0.4%尿素加0.3%磷酸二氢钾混合喷洒一次，在清晨露水干后或下午时以后喷洒好。这样可以随时补充树体营养。3、施肥量：李树的需肥数量与树龄的增长、结果量的增减及环境条件有变化等方面有关。因此要看树施肥，看地施肥。（1）根据树体大小确定施肥量：定植的一年生小树，每年分春秋两次施入50公斤左右基肥。

李子树苗想丰产怎么做一、适地适树。李子苗为蔷薇科李属植物。李产区与南方气候似，可选用优良品种，如脆红，单果重100克，外观漂亮，8月下旬成熟，品质，离核，味甜。

开春幼苗萌芽时，要检查苗木成活情况，发现死苗要及时拔除，补栽新苗。李子树苗整形的原理及作用是指从李幼树定植后开始，把每一株树都剪成既符合其生长结果特性，又适应于不同栽植方式、便于田间管理的树形，直到树体的经济寿命结束。在一栋设施内，好栽植2~3个品种，以相互授粉。简述李子苗栽植方法、定栽植点：山地以梯田走向为行向确定栽植点。坡地地形多变，上下各行不强求整齐一致。平地如采用长方形栽植时，栽植点的测定，可先在小区的长边和短边划定相互垂直的两条基线，再在各条基线上，按规定的株行距作出标记，然后按相对应的标记拉绳，其交叉点即为栽植点，在各点上撒石灰作标记。常用砧木有毛桃、中国李。毛桃作砧木亲和力强、生长快、结果早、耐旱、果大味甜，但不耐湿，易发生根病、流胶病，树势早衰、寿命短；李砧适于湿润地区，嫁接成活率高，寿命长，嗜肥，产量亦高，但果实不及桃砧大。接穗采自优质高产的母树，选取树冠外围中上部生长发育充实的一年生枝条，一般随采随接成活率高，也可以利用冬季修剪的枝条加以贮藏供作接穗。

李子苗常见的栽培清树摘净并残留在树上的病果、虫果、僵果，然后收集在一起挖坑深埋。剪去树上的干枯枝、病虫枝、萌发的根蘖并带出园外深埋或烧掉。

防虫害为了病源、害虫越冬基数，果实采收后可在李树上喷施50%多菌灵可湿性粉剂800~1000倍液，或50%托布津1000~1200倍液，或80%的代森锌可湿性粉剂800~1000倍液，或50%的退菌特800李小食心虫、李枯叶蛾可用40%的2500~3000倍液，或40%的乳油1500~2000倍液，或50%的辛硫磷800倍液混合40%的乐果800倍液，或50%的1000倍液进行。

叶面施肥果实采收后应尽早喷施1次0.2%~0.3%的溶液，以增强树势，有利于树体营养的积累和越冬。此时叶面应少施或不施尿素。