

## 2公分3公分突围桃苗 早熟桃好品种

产品名称	2公分3公分突围桃苗 早熟桃好品种
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

### 产品详情

五月脆李子苗品种介绍又名凤山李，6月中、下旬成熟，树势中庸，树冠自然开心形。果实正圆形或近圆球形，平均单果重30~50克，单果重35克。果皮，果肉或偶带片状红色。缝合线正，缝沟浅，大小均匀。果粉厚，灰白色，肉质脆，味甜，核小离核，可食率96.8%。

要做到早间苗，晚定苗，及时进行移植补苗，使苗木分布均匀，生长良好。间苗应在后或后，结合中耕除草分-次进行。土壤孔隙度大的间苗后应进行弥缝，浇水，以保护幼苗根系。定苗时的保留株数可稍大于产苗量。当幼苗受到某种灾害时，定苗时间要适当推迟。浇水浇水是培育壮苗的重要措施，干旱少雨地区能否及时浇水，往往是育苗成败的关键。因此，凡有条件的地方，都要按照各类苗木档同生长阶段对水分的要求和气候，土壤状况合理浇水。

茵红李子苗品种介绍适应性强，对气候、土地要求不严，生长快、投产早,技术要求不高，在较粗放的条件下易高产，果实品质优良，成熟期较晚，市场价位高，平均单果重40克，果重可达60克以上；果实扁圆形，强光面是，全果着粉，果肉黄绿色，汁多，肉脆，皮薄，离核；7月中旬成熟，比脆红李早20天，市场销售情况良好，较耐贮运，具有较明显的市场优势。

要做到早间苗，晚定苗，及时进行移植补苗，使苗木分布均匀，生长良好。间苗应在后或后，结合中耕除草分-次进行。土壤孔隙度大的间苗后应进行弥缝，浇水，以保护幼苗根系。定苗时的保留株数可稍大于产苗量。当幼苗受到某种灾害时，定苗时间要适当推迟。浇水浇水是培育壮苗的重要措施，干旱少雨地区能否及时浇水，往往是育苗成败的关键。因此，凡有条件的地方，都要按照各类苗木档同生长阶段对水分的要求和气候，土壤状况合理浇水。

青脆李子苗品种介绍核小而肉厚，形成了青脆李特有的风味，备受人们喜爱。青脆李，饱满，玲珑剔透，形态美艳，口味甘甜，是人们喜爱的水果之一。它既可鲜食，又可以制成罐头、果脯，全年食用。青翠李的营养丰富，适量吃些李子，可以生津、肝热，有利于健康。于7月中旬-9月下旬陆续成熟上市。