

连翘苗 50公分-1米连翘苗 2年连翘苗

产品名称	连翘苗 50公分-1米连翘苗 2年连翘苗
公司名称	绛县泽森苗木种植专业合作社
价格	.25/棵
规格参数	1年连翘苗:0.3公分 2年连翘苗:0.4公分 3年连翘苗:0.5公分
公司地址	山西省运城市绛县古绛镇中杨村104号
联系电话	13903486159 13903486279

产品详情

连翘苗价格 50公分连翘苗 80公分连翘苗 1米连翘苗 2年连翘苗 1年连翘苗种植，3年以后结果。6-8年丰产，单株产量青翘8-10斤，经济效益可观，是农民朋友发家致富的好帮手摇钱树。

连翘，是一种广泛分布于我县东部山区的一种落叶小灌木，其果实是常用的中药材，用途广、用量大，是我县中药材产业发展的骨干品种之一。随着市场需求的日益增加，连翘价格的高位运行，我县连翘产业的优势和潜力逐步显现，如能顺势而为，这种看似不起眼的小灌木，就能成长为县域经济发展的一个大产业。

连翘种植、管理、采摘，都属劳动密集型产业范畴，劳动强度不大，对劳动者素质和技能要求不高，特别适合妇女和中老年劳动力参与。连翘采摘季节（7月下旬至9月中旬）正好错开了春种秋收的农忙时节，能够充分利用农村剩余劳动力和剩余劳动时间。当前，农村有大量的留守妇女、留守老人，他们除耕种有限的土地外，当地也没有什么赚钱门路，发展连翘产业就可为他们开辟一条力所能及、效益可观的增收之路。在2002年实施退耕还林工程时，他在1.5亩退耕地里种植连翘，多年来精心管理，效益逐年提高，从2008年开始见效，年收均在4000元左右。2014年，适逢连翘价格上涨，1.5亩连翘园当年收入1.4万多元。

连翘苗种植前景，经济效益：生态建设、旅游景观建设、农民增收产业发展、护林防火、偏远山区土地资源利用等方面的重要作用，在荒山绿化、通道绿化、村镇绿化等重点工程中，把连翘放在优先发展的地位。充分利用“四荒”（荒山、荒坡、荒地、荒沟）、“四旁”（村旁、路旁、地旁、河旁）资源，大力发展连翘种植。把连翘种植作为产业扶贫、精准扶贫的一个骨干项目，发动千家万户广泛参与。要鼓励民营企业、社会资本，到农村承包“四荒”，发展连翘的规模种植，大力扶持农村专业合作社、种植大户，建立连翘采摘园区。在全县形成“连翘遍地栽，黄花漫山开，增收新渠道，旅游好景观”的景象，真正树立起全国连翘产业大县的良好形象。全县人工种植连翘达到30万亩的规模，年可增加产量600万公斤，增加收入1.2亿元。

连翘繁殖技术 连翘怎样育苗？

1播种育苗

1.1圃地的选择以及整地

适合选择是向阳避风的、排水性良好的、土层是深厚以及疏松肥沃的沙壤坡地或者是壤土的水田地，将基肥施足，进行深耕细耙，将杂草、石块、树根等拣去，用高床，目的是防止积水，床的宽度是一到一点二米，高度是零点二到零点三米，长五到十米作畦。床面要进行平整，目的是有利于进行灌溉。

1.2播种的时间以及种子的处理

一般情况下在二月份的下旬的时候将种子放在温水之中进行浸泡二到三天，捞出来之后进行晾干，接着再用三倍的湿沙和种子进行掺混均匀了，在室外的向阳之处挖宽度是一米，深度是四十厘米的地沟进行埋藏催芽。经三十到六十天，也就是三月份的下旬到四月份的下旬的时候，等到种皮裂口，胚根刚刚露出来的时候，取出来进行播种。

1.3播种以及播种的方法

用种子进行繁殖，每公顷进行播种一百五十千克左右。为了方便于进行苗期的管理，一般的情况下用条播，在播之前要灌足了底水，晾晒二到三天，进行深耕细耙，按照行距是二十到三十厘米，在苗床之上开上深度是三到四厘米的横沟，顺沟将砂藏催芽的种子给播下，播幅大约是十厘米，覆上一到二厘米的灰肥与细土，稍加的镇压，接着用紫草进行覆盖以保墒。

1.4田间管理

1.4.1水肥管理

在播种了之后依据土壤的墒情进行适当的浇水，在种子发芽期间的浇水应该遵循少量多次的原则，常常保持床面的湿润，目的是防止种子芽干与幼苗的日灼。连翘的出苗率是百分之六十八，等到幼苗出齐了之后，浇水的量要多，但是次数是要少的，注意每次要浇透浇足了，浇水是要在早晚的时候进行的，切

忌在中午的时候进行大水的漫灌。不能够形成积水或者是造成土壤的板结，如果积水过多的话要及时的进行排水。在苗期的时候为了促进苗木的生长，应该在七到八月份的时候进行追肥二到三次。在幼苗期的时候是以氮肥、磷肥为主的;在苗木速生期的时候氮、磷、钾适当的进行配合;在苗木硬化期的时候是以钾肥为主的，要停施氮肥与浇水，目的是将苗木的木质化的程度提高了，避免遭到冻害。对于土壤的追肥应该采用沟施法，把肥料施在根系的附近，每667m²使用的量是为二点五到五千克。在根外进行的追肥适合在阴天或者是潮湿的早晨来进行，把肥料喷施于叶子的正反两个面。一般的情况之下尿素的浓度是百分之零点二到百分之零点五，过磷酸钙的浓度是百分之五到百分之一，每667m²使用量是一点五到二点五千克。当年生的苗的高度可以达到五十到八十厘米。经过调查连翘的保苗率是96%。

1.4.2松土除草

为了将杂草争水争肥减少与土壤的板结，在浇水以及雨之后要及时的进行松土除草。行间草要结合松土来进行，株间草用手拔除，要坚持“除早、除小、除了”的原则。

1.4.3间苗补苗

为了保证苗木的质量与产量，依据现地的情况必须及时的进行间苗补苗。其中间苗的原则为留优去劣，留疏去密。进行间苗的对象是受病虫害危害的、机械损伤的、生长得不良的、过分的密集的苗木。补苗选择在阴雨天或者是在傍晚的时候进行比较的好。在补苗了之后及时的进行浇水，使得苗木的根系和土壤的密结，在必要的时候可以适当的进行遮荫。

1.4.4病虫害防治

叶斑病是连翘的常见的病害。首先要做的是肥水管理要加强，培养健壮的植株，提高它抗病的能力。其次要进行喷75%百菌清可湿性颗粒0.083溶液或者是50%多菌灵可湿性颗粒0.125%溶液来进行防治，每十天进行喷洒一次，进行连续喷洒三到四次可以有效的将病情控制住。常常见到的虫害有蛾姑与钻心虫。用50%的辛硫磷乳油100ml进行对水二到三千克，进行拌麦种五十千克，进行堆闷二到三小时之后再行诱杀蝼蛄;钻心虫会危害植株的茎秆，可以用敌敌畏溶液进行喷雾来防治，用40%乐果乳油0.2%液堵塞蛀孔以毒杀，或者将受害的植株进行剪除烧毁。

2分株育苗

分株可以在秋季落叶了之后到春季发叶了之前的时候来进行。可以每隔1- 2a分一次，具体是依据植株的长势来定的。也就是将植株挖出来，地上的一个枝干分成一株，并且带有部分的根系;如果没有枝干也是可以把根分成若干株的，分别进行定植。还可以把定植了4a以上的母株的周围萌生的新株分别的连根挖出进行定植。

3 扦插育苗

3.1扦插时间

可以硬枝或者是嫩枝都可以进行扦插的。插条和插穗必须选择健壮的没有病虫害的一年生的枝，穗的长度是十厘米的左右，顶端有一到二个芽口，切口在节之处，生根比较容易。进行硬枝扦插适合在早春的时候来进行，进行嫩枝扦插的时候适合在六月份底七月初的时候进行。要随时采条随时剪随时插。

3.2做床和扦插

苗床的长度与宽度有利拔草以及喷水就可以了。在床底填充三厘米厚的河沙或者是蛭石，在搂平压实后要浇透水。在插穗之后用ABT2号生根粉进行浸泡二到四个小时，就可以进行扦插了。插距是5厘米X 5厘米，深度时三厘米。在进行扦插之后要浇透水。

3.3 插之后的管理

搭六十到七十厘米的简易的小拱棚，在上面覆上塑料膜。经常的进行喷雾，保持床面的湿润，基质的湿度保持在百分之六十左右，空气的湿度是百分之八十到百分之九十，气温是二十五摄氏度左右，地温大于气温三摄氏度。每七天左右进行喷洒800-1000倍液多菌灵来进行消毒，二十天之后进行吐叶生根。在期间要进行除草，等到新叶长出了之后可以进行追肥。