

# 1公分中蟠17号蟠桃树苗 蟠桃苗好品种

产品名称	1公分中蟠17号蟠桃树苗 蟠桃苗好品种
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	4.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

## 产品详情

泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）位于举世闻名的泰山脚下，是全国有名的苗木之乡。我基地专业繁育果树苗、绿化苗已有几十年，信誉度高、重承诺、抓质量、保纯度是我们的一贯宗旨。我们基地是由山东省果树研究所、山东省农科院、农业大学从国内、国外优选出100多个果树品种，建立了基地。从母本园中采穗，优选出一批跨世纪新品种，适应性广，经济效益高的良种苗木，自繁育400多万株优质果苗，确保品种纯正。苗木销往全国各地得到用户好评。专业不是说出来的，也不是写出来的，专业来自于实力，更来自于客户的认可。泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）郑重承诺：本场提供苗木保证纯度、法律公正、代办检疫、保湿邮寄。桃树苗：春雪、突围、秋彤、莱山蜜、映霜红、永莲蜜桃、金秋红蜜、仓方早生、新川中岛、中华福桃、中华寿桃、中油4号、中油5号等苹果苗：金帅、红肉、红富士、红嘎啦、红将军、新红星、烟富3号、烟富6号、烟富8号、美国八号等梨树苗：黄金、黄冠、圆黄、秋月、绿宝石、晚秋黄、玉露香、红香酥、早酥红、早红考密斯等樱桃苗：红灯、美早、先锋、早大果、黑珍珠、拉宾斯、萨米脱、布鲁克斯等核桃苗：香玲、鲁光、元丰、辽核、清香、8518等草莓苗：红颜、章姬、丰香、甜查理、法兰地、全明星等柿子苗：次郎、富有、磨盘、合柿、斤柿、牛心柿、阳丰甜柿、日本甜柿等花椒苗：大红袍、九叶青等山楂苗：大金星、大五棱等石榴苗：泰山红、大青皮等葡萄苗：巨峰、夏黑、红提、藤稔、京亚、赤霞珠、金手指、美人指、玫瑰香、红宝石、红巴拉多等李子苗：秋姬、脆红、青脆、蜂糖、安哥诺、红宝石、黑宝石等枣树苗：梨枣、雪枣、冬枣、金丝枣等板栗苗：华光、华丰、石丰、处曙红、泰山一号等杏树苗：凯特、金太阳、珍珠油、红等蓝莓苗：都克、蓝丰、喜来、北陆、达柔等无花果苗：青皮、金傲芬、波姬红、布兰瑞克等果树苗：桃树苗、苹果苗、梨树苗、核桃苗、樱桃苗、草莓苗、香椿苗、花椒苗、柿子苗、山楂苗、石榴苗、葡萄苗、李子苗、板栗苗、杏树苗、枣树苗、蓝莓苗、无花果苗、猕猴桃苗等。绿化苗：樱花、海棠、侧柏、龙柏、木槿、法桐、国槐、白蜡、银杏、黄栌、冬青、皂角、火炬、臭椿、垂柳、紫薇、玉兰、合欢、丁香、杨树、蜀侏、桧柏、雪松、黑松、油松、景松、紫叶李、红叶李、太阳李、榆叶梅、五角枫、扶芳藤、美人梅、千头椿、香花槐、金银花、白皮松、华山松、红叶碧桃、龙柱碧桃、菊花碧桃、红叶小檗、紫叶矮樱、大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、小叶女贞、北海道黄杨等。

选择地势较高，不易积水的地块。土壤要求为壤土或沙壤土，沙地或黏土地先要进行整地。根据设计好的株行距挖坑或挑沟，株距在2米以内的进行挖沟，挖沟时间为栽植的上一年秋末冬初封冻前，一般挖深80~100厘米、宽1米的栽植沟，每667平方米施入经过腐熟的有机肥4000~5000千克，施基肥时将表土与肥料混合均匀，回填到沟内。穴栽挖1米见方的栽植穴。有条件的回填前在底部填入30~40厘米厚的秸秆或杂草。之后浇水沉实备栽。苗木选择与定植

同学们，你们听说过《西游记》里孙悟空偷吃王母娘娘蟠桃的故事吗？我以前从来没见过蟠桃，也没吃过蟠桃，但这次，我才真真正正地体会到了蟠桃是多么的美味。

1. 栽植密度与苗木选择土壤肥沃，由水浇条件的，株行距采用2米×4米或2.5米×4米，667平方米栽植67~83株；丘陵山地株行距采用2米×3米或1.5米×4米，667平方米栽植100株。苗木要选择健壮、无病虫害，基茎1厘米以上的优质成品苗。
2. 合理配置授粉树蟠桃苗虽然花粉量大，自然结果率65%以上，不配置授粉树也能结果，但是为获得优质果品，最好配置授粉树。授粉树的品种以21世纪为好，授粉品种与主栽品种的比例为1:4~5，可以隔行栽植或隔株栽植。

(2) 秋耕，在秋季桃树落叶的前后需要进行秋耕工作，深度在20到30厘米之间，结合有机肥料的施加进行。

- (3) 栽植时间与方法在土壤解冻后的4月上旬栽植最好，成活率高。栽植时先将根系进行合理修剪，剪留15~20厘米，对损伤的根系要剪出新茬，之后在水中浸泡24小时，使苗木吸足水分，栽前在3~5波美度石硫合剂中浸泡5~10分钟消毒。栽植时边埋土边提干，苗木根系要尽量舒展，然后浇足水。进行培土，并埋过苗木原来土印3~5厘米。将1米见方的地膜，铺在树盘里，地膜四周用土压住，以利增湿保湿、提高成活率。

定植后的管理

1. 土肥水管理定植第1年，及时施肥，增加树体营养，加速树体生长，以达到早成形、早结果的目的。具体方法：当新梢长到10厘米时开始每隔10~15天喷施1次叶面肥，主要是300倍尿素。结果树1年追4次肥：第1次在萌芽前追速效氮肥，每株追尿素400克；第2次花后7天，每株追700克尿素；第3次硬核期(6月上旬)，追果树专用复合肥，每株1.2~1.5千克；第4次在果实膨大期(8月底)追三元复合肥，每株0.7~1千克，硫酸钾每株0.5千克。每次追肥后要及时浇水。落叶前结合深翻扩穴，每株施经过腐熟的有机

肥20~25千克，同时加入氮磷钾复合肥0.75千克。盛果期树的施肥标准按每结100千克果施有机肥250~300千克，量化下来即每667平方米桃园，施纯氮15~20千克、五氧化二磷5~7千克、氧化钾20~30千克，氮磷钾的比例3:1:4。2. 整形修剪 王母娘娘用手表计时，花仙子和孔雀仙子计数……“停，时间到！”

花仙子和孔雀仙子异口同声地说：“180个！”“哇！”大家都惊呆了，凌霄殿里立刻响起了热烈的掌声……不用说，小就用“新型时装”上场，东跳跳，西跳跳，口甬里还依依哇哇地唱着什么儿歌，迎得了大仙的掌声。采用两主枝开心形或自然开心形。定干高度50~60厘米，干高40~50厘米，定干后选上端2个对生枝做主枝，夹角90°~100°，主枝开角45°~50°向两侧延伸，垂直于行间，其余着生在枝干上的枝条及早抹除。对选留做主枝的新梢要及时拉枝开角，冬剪时剪留长度为60~70厘米，每个主枝上培养2~3侧枝，第1侧枝开角60°~80°，第2、3侧枝之间的距离为60厘米左右，夏剪时将背上直立枝疏除，禁止在背上培养大型枝组。以培养中小型结果枝组为主，结果枝组主要着生在主枝的两侧。幼树修剪采取轻剪长放，长梢修剪为主。大量结果后转向常规修剪，及时运用单枝更新及双枝更新技术，复壮结果枝组。夏季修剪时，疏除背上枝、徒长枝、直立枝、枯死枝、病虫枝、细弱枝、竞争枝，保持主枝延长枝的生长优势，当侧枝生长长度超过60厘米时，要及时剪除上端部分，以促发2次枝，增加枝叶量，达到扩冠增产的目的。具体方法：

(1)定植当年的修剪分4次进行。第1次在发芽后进行抹芽，以减少养分的消耗，使养分集中，保证整形带内新梢的生长。抹芽后每株保留6~8个新梢，距离地面30厘米以下的萌芽全部抹掉。第2次在5月下旬至6月上旬，当新梢长到30厘米时按整形的要求选出2个或3个生长健壮、方位角度合适的新梢作为主枝，将其他新梢进行摘心或扭梢，控制其生长。第3次在7月上旬，当新梢长到7~10厘米时，采取拿枝软化或拉、压等办法调整主枝角度，使主枝角度保持在50°~60°第4次在9月上旬。此时新梢停止生长，将各类新梢未木质化的部分去掉，以减少后期树体养分的消耗。(2)桃树栽植后的第1年修剪正常情况下，经过

一年的生长，主枝的长度多在100厘米以上。冬剪的主要任务是剪截主枝、侧枝、果枝和辅养枝。一般剪口直径粗度为1.2厘米，剪口芽要充实饱满，保证明年抽出健壮的延长枝;副梢、侧枝剪口直径粗度为0.7~1厘米，但必须短于主枝长度，当主枝之间的生长势不一致时，则采取抑强扶弱的办法，平衡树