

3公分4公分油桃树苗 紫肉油桃苗油桃树苗

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 3公分4公分油桃树苗 紫肉油桃苗油桃树苗 |
| 公司名称 | 泰安市岳美苗木有限公司 |
| 价格 | 15.00/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄 |
| 联系电话 | 13335292778 |

产品详情

泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）位于举世闻名的泰山脚下，是全国有名的苗木之乡。我基地专业繁育果树苗、绿化苗已有几十年，信誉度高、重承诺、抓质量、保纯度是我们的一贯宗旨。我们基地是由山东省果树研究所、山东省农科院、农业大学从国内、国外优选出100多个果树品种，建立了基地。从母本园中采穗，优选出一批跨世纪新品种，适应性广，经济效益高的良种苗木，自繁育400多万株优质果苗，确保品种纯正。苗木销往全国各地得到用户好评。专业不是说出来的，也不是写出来的，专业来自于实力，更来自于客户的认可。泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）郑重承诺：本场提供苗木保证纯度、法律公正、代办检疫、保湿邮寄。桃树苗：春雪、突围、秋彤、莱山蜜、映霜红、永莲蜜桃、金秋红蜜、仓方早生、新川中岛、中华福桃、中华寿桃、中油4号、中油5号等苹果苗：金帅、红肉、红富士、红嘎啦、红将军、新红星、烟富3号、烟富6号、烟富8号、美国八号等梨树苗：黄金、黄冠、圆黄、秋月、绿宝石、晚秋黄、玉露香、红香酥、早酥红、早红考密斯等樱桃苗：红灯、美早、先锋、早大果、黑珍珠、拉宾斯、萨米脱、布鲁克斯等核桃苗：香玲、鲁光、元丰、辽核、清香、8518等草莓苗：红颜、章姬、丰香、甜查理、法兰地、全明星等柿子苗：次郎、富有、磨盘、合柿、斤柿、牛心柿、阳丰甜柿、日本甜柿等花椒苗：大红袍、九叶青等山楂苗：大金星、大五棱等石榴苗：泰山红、大青皮等葡萄苗：巨峰、夏黑、红提、藤稔、京亚、赤霞珠、金手指、美人指、玫瑰香、红宝石、红巴拉多等李子苗：秋姬、脆红、青脆、蜂糖、安哥诺、红宝石、黑宝石等枣树苗：梨枣、雪枣、冬枣、金丝枣等板栗苗：华光、华丰、石丰、处曙红、泰山一号等杏树苗：凯特、金太阳、珍珠油、红等蓝莓苗：都克、蓝丰、喜来、北陆、达柔等无花果苗：青皮、金傲芬、波姬红、布兰瑞克等果树苗：桃树苗、苹果苗、梨树苗、核桃苗、樱桃苗、草莓苗、香椿苗、花椒苗、柿子苗、山楂苗、石榴苗、葡萄苗、李子苗、板栗苗、杏树苗、枣树苗、蓝莓苗、无花果苗、猕猴桃苗等。绿化苗：樱花、海棠、侧柏、龙柏、木槿、法桐、国槐、白蜡、银杏、黄栌、冬青、皂角、火炬、臭椿、垂柳、紫薇、玉兰、合欢、丁香、杨树、蜀侏、桧柏、雪松、黑松、油松、景松、紫叶李、红叶李、太阳李、榆叶梅、五角枫、扶芳藤、美人梅、千头椿、香花槐、金银花、白皮松、华山松、红叶碧桃、龙柱碧桃、菊花碧桃、红叶小檗、紫叶矮樱、大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、小叶女贞、北海道黄杨等。

固原紫肉油桃苗油桃树苗一边倒技术

甜油桃密植栽培技术

一、品种选择

油桃由于果面光滑,果皮韧性较差,大多数品种在南方高温多湿的气候条件下,易裂果和产生日灼。在南方一般要选择早熟和特早熟品种,***选择通过南方生产实践不裂果或裂果较轻的品种进行栽培。我们推广(选育)的特早熟品种曙光优系、艳光优系、早红宝石新系、早红珠优系、燕红11号;早熟品种中油金铭、金红等、双红、中油桃4号、中油桃5号、燕红12号、瑞光22号等品种(系)完全适合南方地区大面积发展。

所以能够从初夏一直卖到秋末。 表面光丽迷人其它任何桃的表面都是有毛的,但是油桃因其表面光滑如油,与苹果,李子的表面一样光滑故称其为油桃。其它桃的果面只有部分呈红色,但油桃的整个果面都呈鲜红色,跟樱桃一样,因此油桃以其果皮,果色鲜红迷人,光彩夺目的外观深受市场的欢迎。它是国际市场上风行的一种新兴水果,专家预测油桃将逐渐取代其它桃而一统天下,二十一世纪是油桃的时代。4.油桃上市早些;普通的桃子上市略晚些。但由于不同品种和普通桃子成熟时间也不同。

二、改土建园

1、园地选择

桃根系需氧量大,不耐涝,建园时应选择排水良好的沙壤土或砾质土,PH值5-6为最适宜,PH值低于4,高于8不宜种桃。2、改土建园

油桃栽培一般选择中等肥力以上的土地建园，如在土壤瘠薄和土壤结构较差的条件下建园，必须进行土壤改良。改良的办法通常是挖定植沟或定植穴。定植沟一般挖沟宽80-100厘米,深60-80厘米,行向以南北行向为宜,深施底肥,底肥以有机肥为主,化肥为辅。有机肥一般每亩5000公斤,化肥可用多元素复合肥,一般每亩用100公斤左右,施一层有机肥，撒上一层化肥,然后回填熟土，回填平面高出表土平面10厘米左右。若有机肥缺乏,也可用稿秆野草、树叶之类,先填入沟(窝)内，厚度以压实后距土面30厘米为宜,然后灌水以湿透稿秆,再将化肥兑成肥液均匀浇于稿秆上,回填泥土至比表土平面高10厘米,回填泥土应尽量使用耕作层的土壤,时间应比栽植时间提前一个月以上,有利于底肥腐熟。定植穴一般80厘米见方,深60厘米,其余方法与定植沟相同。

3、苗木栽植

栽植密度

一般亩栽222-333株,南方也有亩栽444株的,我们推广每亩栽222株(株行距3x1米)、278株(株行距2.4x1米)、333株(株行距2x1米)三种密度。这三种密度投产快、前期产量高、进入丰产期早,经济效益比稀植高两倍以上。

栽植时间

从秋季落叶至第二年春季发芽前都可栽植,但以秋季落叶后栽植为***,有利于成活和根系的生长。

栽植方法

以亩栽222株为例,按每株1米的株距,挖一大窝,将苗木受伤的根系和小枝剪掉,苗木置于窝内,根系向四周拉平分布均匀,然后用细土将根系四周空隙填满,上复细土踏实,使根系与土壤紧密结合,扶正苗木,栽植深度以根颈处略高于地平面为宜。栽后立即浇施定根水,每株浇水15-25公斤,如土壤干燥应多浇,以土壤能随水自然下沉为宜。待水渗完后覆土,覆土可以做成20厘米高的锅盖形,以防止树杆摇动。在干旱和低温地区覆土后树盘还须盖上1平方米的地膜,以保持水份,提高地温,提高苗木成活率。

三、土肥水管理

密植油桃一般栽后第二年开始挂果并且有一定的产量。因此栽后第一年的主要任务就是要尽量扩大树冠,达到理想的结果枝量。一般前期(2-6月)施肥以氮肥和磷肥薄施勤施为主,以每月施一次为好,施肥量每亩用人畜粪30担加尿素10公斤(第一次、二次各5公斤),后期注意施用磷钾肥,促使新梢老熟,以利于花芽分化。第二年以后在施肥上应以提高产量,控制树冠,延长密植园寿命为主,施肥时间一般在10月份至落叶前施入,以0月上旬为好,此次施肥量应占全年施肥量的60%,肥料种类以有机肥为主,配以适当的氮磷钾肥,每亩可用人畜粪2500公斤,磷钾多元复混肥100公斤深施。追肥每年施三次即可,一般在谢花、硬核期前和果实发育膨大后期。在谢花后施肥量不能过大,以免新梢生长加速加重生理落果。

桃的耐旱性强,怕涝,一般不需灌水,如遇山地较干旱,可在果实膨大期视实际情况灌水1-2次

,在雨季注意清理排水沟，大雨后注意中耕松土,增强土壤通透性,以满足根系生长需氧量大的要求。如反背枝，立生枝，下垂枝都要让其挂果，以缓和树势，提高单株产量，有经验的果农常说“以剪压树树不怕，以果压树树”。 盛果期的修剪：此时主枝逐渐开张，树势逐渐缓和，树冠相对稳定，枝条生长量降低，徒长枝减少，结果枝增加，短果枝的比重上升，生长与结果矛盾激化，内膛及下部枝易枯死。此时修剪量比幼树期重，对骨干枝要回缩更新，采用疏缩结合，去弱留强。内膛如果已经空虚。应注意让其多挂果对特旺的树应注意从第二侧枝上培养回生枝填补空间，增加结果部位，桃树一进入盛果期就要注意从基部培养更新枝。油桃的表皮是而光滑的，发亮的，颜色比较鲜艳，好象涂了一层油；普通的桃子表皮有绒毛，颜色发红或微黄，无亮光。2.油桃的皮不好剥；普通的桃子熟了的时候，皮是可以剥的。3.油桃的肉质是脆的，水分相对少些；普通的桃子生的时候是脆的，熟了就是软的，水分很多。