

李子树，10公分李子树，12公分李子树，10公分李子树

产品名称	李子树，10公分李子树，12公分李子树，10公分李子树
公司名称	绛县晋航苗木种植专业合作社
价格	.00/株
规格参数	5公分李子树:5公分李子树 李子树价格:李子树价格 李子树:李子树
公司地址	山西运城绛县柴家坡村
联系电话	13223596889

产品详情

李子树，10公分李子树，12公分李子树，10公分李子树咨询13834107921柴先生 微信同号

(1) 李子树施肥技术

1) 幼龄李园(挂果前)施肥技术。建园第一年在5月1日前以施清水或清粪水为主，5月后至8月每半个月施一次含2%尿素的清粪水(50千克清粪水+0.1千克尿素)，9月株施3.5千克-5千克腐熟的农家肥：第二年3月-8月每半个月施一次含3%尿素的清粪水(50千克清粪水+0.15千克尿素)，9月株施7.5千克-10千克腐熟的农家肥。注：1千克是2斤

2) 投产李园施肥技术。基肥。基肥占全年施肥量的60%，在采果后至秋季落叶前(9月-10月)施入。株产50千克的树，每株施入腐熟的畜禽肥25千克-35千克，混合腐熟的饼肥(花生麸、或菜籽麸)2千克-4千克，搭配1千克的过磷酸钙，采用沟施为主，结合穴施。开环状沟或平行沟，深20公分-45公分，宽30公分-40公分，施肥位置在树冠滴水外缘处，施入肥料后覆盖土壤淋施肥水100千克，沤制肥水的比例是花生麸(菜籽麸)：猪粪：水=1:20:100.基肥逐年错位施入土壤。

追肥。追肥占全年施肥量的40%，其中萌芽肥（花前肥）约占15%，2月中、下旬施入，株产50千克的树，每株用腐熟的鸡粪或猪粪7-10千克加花生麸（菜籽麸）1千克加过磷酸钙1千克，混合堆沤腐熟后穴施，施后应保持土壤湿润；壮果肥占25%，果实成熟前30-45天施入，株产50千克的树，每株施清粪水50千克加硫酸钾型（高钾）复合肥0.5千克-0.8千克，以多点多穴方法施入。

叶面喷施。根据不同生长期的树相指标和生产实际要求，适当进行根外追施氮、磷、钾和营养型液态肥，同时根据李园缺素症状进行钙、镁、锰、铁、锌、硼等微、中量元素肥料的叶面喷施，全生长期叶面喷肥不能超过3次。

（2）李子树整形与修剪

1) 整形。采用三主枝开心形。一年生成苗在距地面15公分-25公分左右有饱满芽处定干，在主干间隔5公分-8公分错落分布选留三个主枝，主枝分枝角度在 45° - 65° ，每个主枝上留3-5个侧枝，插空排列，呈 70° - 80° 。树体总高度控制在3.5米以内。

2) 修剪。 幼年树。定植三年内的幼树重点是培养主侧枝，调整角度，抑强扶弱，平衡树势。以夏季修剪为主，多采用拉枝、抹芽、摘心等修剪方法。冬季修剪适当短截延长枝，迅速形成骨架和扩大树冠；疏除内堂枝、密生枝和位置不当的枝。

结果树。根据品种特性。树龄、产量等确定结果母枝的剪留强度和更新方式。逐渐加重短截，调节生殖与营养生长的平衡。疏除内堂枝、密生细弱枝和病虫枯枝，使枝梢分布均匀、互不遮荫、树体通风透光。适时更新修剪，防止结果部位外移和大小年结果。结合夏剪，以冬剪为主。

衰老树。重回缩骨干枝至5年左右位置，刺激潜伏芽抽生萌条，培养成新的树冠。同时，对衰老树中下部长出的徒长枝进行拉枝或适当短截，促发分枝，形成结果枝，以填充树冠，恢复树势和结果能力，延迟结果年限。

（3）花果管理期

1) 保花保果。花期遇不良气候，可通过花期放蜂和叶面喷施复合营养液提高结实率，营养液配制比例30

斤水+硼砂15克+尿素30克+磷酸二氢钾15克。

2) 疏花疏果。 原则。李结实性强，通过整形修剪、疏果等措施调控产量，原则上每亩控制在1000千克-2000千克之间。

疏花。结合冬季修剪，剪除过多的花芽、弱小花，春季花序分离期进行花前复剪，剪除过多的花枝、花序。

疏果。按30-40:1的叶果比，在谢花后4-8周，分次疏除（一般2-5次）过多的幼果。壮树强枝多留，弱树弱枝少留，按先里后外、先上后下，疏除弱小果、畸形果、病虫果、授粉受精不良果；无论长、短果枝，均间隔2公分-3公分留一个果，花束状结果留枝一个果。