

## 甜脆柿子苗2019年种植流行品种甜脆柿子苗

产品名称	甜脆柿子苗2019年种植流行品种甜脆柿子苗
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

### 产品详情

泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）位于举世闻名的泰山脚下，是全国有名的苗木之乡。我基地专业繁育果树苗、绿化苗已有几十年，信誉度高、重承诺、抓质量、保纯度是我们的一贯宗旨。我们基地是由山东省果树研究所、山东省农科院、农业大学从国内、国外优选出100多个果树品种，建立了基地。从母本园中采穗，优选一批跨世纪新品种，适应性广，经济效益高的良种苗木，自繁育400多万株优质果苗，确保品种纯正。苗木销往全国各地得到用户好评。专业不是说出来的，也不是写出来的，专业来自于实力，更来自于客户的认可。泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）郑重承诺：本场提供苗木保证纯度、法律公正、代办检疫、保湿邮寄。桃树苗：春雪、突围、秋彤、莱山蜜、映霜红、永莲蜜桃、金秋红蜜、仓方早生、新川中岛、中华福桃、中华寿桃、中油4号、中油5号等苹果苗：金帅、红肉、红富士、红嘎啦、红将军、新红星、烟富3号、烟富6号、烟富8号、美国八号等梨树苗：黄金、黄冠、圆黄、秋月、绿宝石、晚秋黄、玉露香、红香酥、早酥红、早红考密斯等樱桃苗：红灯、美早、先锋、早大果、黑珍珠、拉宾斯、萨米脱、布鲁克斯等核桃苗：香玲、鲁光、元丰、辽核、清香、8518等草莓苗：红颜、章姬、丰香、甜查理、法兰地、全明星等柿子苗：次郎、富有、磨盘、合柿、斤柿、牛心柿、阳丰甜柿、日本甜柿等花椒苗：大红袍、九叶青等山楂苗：大金星、大五棱等石榴苗：泰山红、大青皮等葡萄苗：巨峰、夏黑、红提、藤稔、京亚、赤霞珠、金手指、美人指、玫瑰香、红宝石、红巴拉多等李子苗：秋姬、脆红、青脆、蜂糖、安哥诺、红宝石、黑宝石等枣树苗：梨枣、雪枣、冬枣、金丝枣等板栗苗：华光、华丰、石丰、处曙红、泰山一号等杏树苗：凯特、金太阳、珍珠油、红等蓝莓苗：都克、蓝丰、喜来、北陆、达柔等无花果苗：青皮、金傲芬、波姬红、布兰瑞克等果树苗：桃树苗、苹果苗、梨树苗、核桃苗、樱桃苗、草莓苗、香椿苗、花椒苗、柿子苗、山楂苗、石榴苗、葡萄苗、李子苗、板栗苗、杏树苗、枣树苗、蓝莓苗、无花果苗、猕猴桃苗等。绿化苗：樱花、海棠、侧柏、龙柏、木槿、法桐、国槐、白蜡、银杏、黄栌、冬青、皂角、火炬、臭椿、垂柳、紫薇、玉兰、合欢、丁香、杨树、蜀侏、桧柏、雪松、黑松、油松、景松、紫叶李、红叶李、太阳李、榆叶梅、五角枫、扶芳藤、美人梅、千头椿、香花槐、金银花、白皮松、华山松、红叶碧桃、龙柱碧桃、菊花碧桃、红叶小檗、紫叶矮樱、大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、小叶女贞、北海道黄杨等。

柿树落花落果如何防？

**花期环剥** 在初花期进行，盛花期完成。环剥适用于壮树、壮枝或大型结果枝组。环剥口宽度为0.3~0.5毫米，剥后用塑料布条包扎剥口，以保持剥口湿度，促进愈合。

**合理夏剪** 在生长期内疏去过密枝、无效枝，迎风面多留枝、背风面少留枝，促进通风透光。一般柿树经过修剪后，隐芽会大量萌发，为减少营养消耗，应将无用萌芽在木质化前抹除；有生长空间的长枝，特别是徒长枝，要在40厘米时摘心。

**疏除花蕾** 当结果母枝上抽生2~4个结果枝时，保留前2个结果母枝中部的3个花蕾，其它结果枝上的花蕾全部疏除，留作预备枝。若结果母枝抽生5个以上的结果枝时，应保留前3个结果枝结果，每个结果母枝上留中部3个花，其余全部疏掉。

**巧施肥水** 进入结果盛期的大树，要加强肥水管理，春季早施基肥，秋季施足基肥，但追肥不能过早。一般在5月份枝条枯顶期和7月份果实膨大期追肥，这两次肥对提高坐果率有明显的促进作用，并且还可以增加下一年的花芽数量和提高花芽质量，遇天气干旱时进行浇水。

**化学调控** 在盛花期和幼果期各喷一次500ppm赤霉素加1%尿素，可改善花和果实的营养状况，防止柿蒂与果柄发生离层，增强花和幼果对养分的吸收功能、子房膨大，提高坐果率；果实迅速膨大期，叶面喷施0.3%~0.5%尿素溶液和钼酸铵等微量元素肥料，可减少落花落果。

**防治病虫** 生长期，人工摘除病果、虫果；6月上旬喷50%乳油1000倍液，消灭柿蒂虫；6月中旬，喷一次1.5~400倍波尔多液，或65%代森锌可湿性粉剂500~600倍液，或喷一次2.5%绿色功夫1500倍液+1.5%菌立灭800倍液，可防治柿炭疽病、角斑病、圆斑病。5月中下旬、7月下旬至8月上旬幼虫发生高峰时，喷洒20%灭扫利乳油2500倍液，主要喷洒在柿树的果实、果柄和果蕾处，每隔10~15天喷施1次，连喷2~3次。

### 柿子树落花落果难题突击

柿子是柿科落叶乔木植物柿的果实，甜腻可口，营养丰富。柿子树一年种，百年收，树龄可达300年，造

福后代，但是柿树对环境条件较为敏感。栽培管理技术不当，容易造成落花落果。近年来，在生产上柿子树的落花落果现象严重影响着果农的收入，因此，应该加强防治。

### 一.加强水肥管理

柿树根系怕积水，在雨季要做好及时排水工作。分别在萌芽期、开花期和幼果迅速生长期进行灌溉，在萌芽前尤应注意灌水。开花前后灌水有利坐果，防止落花落果，结合施肥进行灌水则更有利肥效的发挥。

柿树需肥量较大，氮与钾对生长和结果都很重要。果实采收后从9月中旬到12月进行施基肥的工作，施肥宜早不宜晚；要重施基肥，基肥以有机肥为主，对氮、磷、钾的需求比一般为5 3 4。幼树每株施基肥15~25kg,结果树施50~75kg。幼树每年在萌芽后应施追肥1次,结果树施2~3次。追肥以速效肥为主，一般在新梢停长后至开花前及果实迅速膨大时分两次施入。在生长期6月上旬~8月中旬结合喷药进行叶面施肥，增产效果十分明显。

### 二.适时环割

花期是树体营养消耗多的时期，为使营养物质充足供应新器官的建造，使光合产物向下运输受阻，优先供给开花坐果的需要，提高坐果率，可于花期在主干或主枝上进行环割。环割在初花期进行，盛花期完成。环割适用于壮树、壮枝或大型结果枝组，环割后涂抹“促花王2号”，促进伤口愈合，促花、保果。

### 三.合理修剪

修剪不当（过重或过轻）容易造成落花落果，生长期内更要注重修剪工作。在生长期内疏去过密枝、无效枝,在迎风面多留枝，可起防风作用；在背风面少留些枝，促进通风透光，使树体各部位合理分布。保证叶果比例适当，平衡生殖生长与营养生长的关系，可以有效地防止落花落果。修剪时要小心，对于造成的伤口涂抹“愈伤防腐膜”，促进伤口尽早愈合，防止病虫害侵入树体为害。