

## 5公分梨树 1公分早酥红梨苗出售价格多少

产品名称	5公分梨树 1公分早酥红梨苗出售价格多少
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

### 产品详情

晚秋黄梨树苗：结果早，产量高。晚秋黄梨株形紧凑，矮化密植，每亩栽160株，单株成年树高2米左右。结果早，一年生树苗便可形成花芽，且挂果集中，三年进入丰产期。易，省工时。晚秋黄梨无需人工授粉，水肥要求不严，抗逆力强，每年只需喷洒5-6次低生物即可。品质好，贮期长。晚秋黄梨，果圆形，单果重800克左右，皮薄核小，无石细胞，果肉细滑，洁白香甜，果实切面15天内不变色、不变质。贮藏期可达6个月。

待水渗干后封土。封土后一般嫁接部位与地面平为宜，嫁接部位高的应高出地面3公分左右，这一点应根据嫁接部位的高度灵活掌握。(2)山坡地、不易保水的沙壤地或水源地或水源不足的地块，在栽植时可在树坑中撒上一匙保水剂(公司有货供应)。

早红考密斯梨树苗：早红考密斯是美国引进的新品种，临沂地区阳历7月中下旬成熟，果实细颈葫芦形，平均单果重190g，大280g。落花后幼果即为直到果实成熟，成熟后果面变为鲜红色，外观漂亮。果面光滑，果点，果肉绿白色，刚成熟时肉质硬而稍韧，经8-12天肉质变，石细胞少，汁液多，风味酸甜、微香，含可溶性固形物13%，品质上等，可大面积发展。

玉露香梨树苗：玉露香梨是山西省农科院果树以库尔勒香梨为母本、雪花梨为父本杂交育成的优质中熟梨新品种，玉露香梨以汁多、酥脆、含糖高、无公害等特点。荣获2008年北京会供应水果称号。2013年在第十一届中华名梨·梨王擂台赛中获“梨王”称号。2014年被农业部确定为果树发展主导品种。试验基地在山西隰县培育，由于山西隰县地处黄土高原，昼夜温差大，初次就达到了好的效果，具有库尔勒香梨的口感，同时优于母本，个大、核小可食率达90%以上，无沙，甜度大，果品上市就深受消费者的欢迎

据启东园艺站调查，1997年8月18日梨果成熟季节遭遇11号强台风袭击，风力大于11级。8月19日调查了30株棚架栽培和30株普通栽培的4年生丰水梨树的落果情况。三、方便管理棚架栽培的梨树降低了树体高度，不仅有利于管理，如疏花、疏果、人工授粉、套袋、修剪、喷药、果实采摘，还有利于精细操作，提高工作效率。

**早酥红梨树苗：**早酥红梨优质早熟梨树苗品种，7月中上旬成熟，果面光滑，鲜红有光泽，皮薄而脆，果心很小，可食率高，果肉莹白，质细，脆而爽口，石细胞极少，汁特多，味甜微酸，可溶性固形物含量14%，含糖量12.2%，品质极上。早酥红梨是梨中贵族新品，具有独特的细胞生长和等，还具有极好的观赏价值，是生态观光果园的品种。

**红香酥梨树苗：**属中熟品种。树冠中等大，圆头形，长势中庸，枝势较开张。萌芽率高，成枝力较强。以短果枝结果为主。叶片卵圆形，叶缘细锯齿。花冠色。果实纺锤形或长卵圆形，平均单果重220克。果面洁净、光滑，果点中等大、较密。果皮绿，向阳面红色。果肉白色，石细胞较少，汁多，味甜，有香味。可溶性固形物含量12~14%。郑州地区8月底~9月初成熟。常温下，货架期可达2个月。

**秋月梨树苗：**秋月梨树苗属于晚熟品种，10月下旬成熟。果个大，平均单果重450 g，大可达1 000 g。果形端正，果实整齐度极高，商品果率高。果形为扁圆形，果形指数0.8左右。果皮黄红褐色，果色纯正；果肉白色，肉质酥脆，石细胞极少，口感清香，可溶性固形物含量14.5%左右。果核小，可食率95%以上，品质上等。

**园黄梨树苗：**园黄梨果实大，平均果重250克左右，大果重可达800克。果形扁圆，果面光滑平整，果点小而稀，无水锈、黑。成熟后金，不套袋果呈色，果肉为的纯白色，可溶性固形物含量为12.5%~14.8%，肉质细腻，几无石细胞，酥甜可口，并有奇特的香味，品质极上。在重庆7月上旬成熟，在山东8月中下旬成熟，常温下可贮15天左右，冷藏可贮5~6个月，耐贮性好，品质高。

**新梨7号梨树苗：**新梨7号以早酥梨为父本、库尔勒香梨为母本进行高接换种培育而成。生长速度快，4月份开花，6月中旬就可采食。自然采收期长，可从7月中旬至8月底，与中熟品种相同。口感大特点是酥、皮很薄，吃起来口感像香酥梨，爽口；丰产性很强，大部分以短果枝结果，单果重一般达180左右，大的果可达到200克。

**梨树苗：**梨9月上旬成熟，果肉而，白色，石细胞少，果心很小。含糖量可达14.7%度。味清甜，而俱香气。风味独特，品质。易成花一般载后次年成花可见果。异花授粉，极丰产。梨即“百果之宗”。梨是梨的一种。因其，酸甜适口，所以又有“天然矿泉水”之称。

**矮化梨树栽培，管理过程方便以及抗灾能力强：**修剪、拉枝、疏花、授粉、疏果、喷药、套袋采摘等等操作省工省时、大风刮倒树与枝、吹落梨果，所以实行矮化势在必行。1、苗木的选择与消毒购梨苗时应选择品种纯正，叶芽饱满，根系多而完整，没有病虫害，离嫁接口10厘米处径粗0.8厘米以上的当年壮苗为好。

**梨树苗，**是蔷薇目蔷薇科植物的一种。乔木，高达5-8米，树冠开展；小枝，二年生枝紫褐色，具稀疏皮孔；冬芽卵形，暗紫色；花期4月，果期8-9月。果实卵形或近球形，果心小，果肉洁白，质细腻，石细胞及残渣少，松脆，果形周正，风味酸甜适口。具有早果早丰、抗病性强等优点。

**奥冠红梨树苗：**奥冠红梨果实扁圆形或近圆形，纵径9厘米，横径9.8厘米，果形指数0.92，果大，平均单果重650克，大果重960克；果皮浓红色，表面光滑，果点小且不明显，梗洼深、广，果梗短、粗；脱萼，萼洼深、狭。果心小，圆形，对称，心室5个，小，卵形。阳面和阴面均能着色；果皮中厚，果肉，肉质细腻，汁液多，风味酸甜，果心小，可溶性固形物含量14.6%；在山东省聊城市，在4月上旬花芽萌动，叶芽萌动4月上旬至中旬，盛花期4月中旬，果实成熟期在9月中旬，果实成熟期比对照(原)品种满天红早7至10天，果实发育期145至150天，落叶11月初至11月中下旬，年营养生长天数为215~240天，较耐储藏，在常温下可储藏40至50天；对梨黑病和黑星病有一定的抗性。

(2)树苗栽上后20天左右不下雨时应浇水一次，此期间不得缺水，以免影响成活。3.果园作物的套种与设施：套种是果园前两年收入的主要来源。套种作物不当会直接影响农户的经济收入和果树的生长。一般

来说，果园套种不可种玉米、棉花等高杆作物，适应种植大蒜、蔬菜、花生、瓜类、豌豆或低杆的中草药等。

翠冠梨树苗：生长势明显强于新世纪，萌芽率高，成枝力强。易形成花芽，结果早，以长果枝和短果枝结果为主，丰产，在科学的条件下大小年结果不明显。一般3月中旬萌芽，3月下旬开花，7月下旬果实成熟。翠冠适应性广，抗逆性强，平地海涂均可栽植，其缺点是果面易形成锈，对此可采用套袋栽培、控制肥水、幼果期避免使用

泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）位于举世闻名的泰山脚下，是全国有名的苗木之乡。我基地专业繁育果树苗、绿化苗已有几十年，信誉度高、重承诺、抓质量、保纯度是我们的一贯宗旨。我们基地是由山东省果树研究所、山东省农科院、农业大学从国内、国外优选出100多个果树品种，建立了基地。从母本园中采穗，优选出一批跨世纪新品种，适应性广，经济效益高的良种苗木，自繁育400多万株优质果苗，确保品种纯正。苗木销往全国各地得到用户好评。专业不是说出来的，也不是写出来的，专业来自于实力，更来自于客户的认可。泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）郑重承诺：本场提供苗木保证纯度、法律公正、代办检疫、保湿邮寄。桃树苗：春雪、突围、秋彤、莱山蜜、映霜红、永莲蜜桃、金秋红蜜、仓方早生、新川中岛、中华福桃、中华寿桃、中油4号、中油5号等苹果苗：金帅、红肉、红富士、红嘎啦、红将军、新红星、烟富3号、烟富6号、烟富8号、美国八号等梨树苗：黄金、黄冠、圆黄、秋月、绿宝石、晚秋黄、玉露香、红香酥、早酥红、早红考密斯等樱桃苗：红灯、美早、先锋、早大果、黑珍珠、拉宾斯、萨米脱、布鲁克斯等核桃苗：香玲、鲁光、元丰、辽核、清香、8518等草莓苗：红颜、章姬、丰香、甜查理、法兰地、全明星等柿子苗：次郎、富有、磨盘、合柿、斤柿、牛心柿、阳丰甜柿、日本甜柿等花椒苗：大红袍、九叶青等山楂苗：大金星、大五棱等石榴苗：泰山红、大青皮等葡萄苗：巨峰、夏黑、红提、藤稔、京亚、赤霞珠、金手指、美人指、玫瑰香、红宝石、红巴拉多等李子苗：秋姬、脆红、青脆、蜂糖、安哥诺、红宝石、黑宝石等枣树苗：梨枣、雪枣、冬枣、金丝枣等板栗苗：华光、华丰、石丰、处曙红、泰山一号等杏树苗：凯特、金太阳、珍珠油、红等蓝莓苗：都克、蓝丰、喜来、北陆、达柔等无花果苗：青皮、金傲芬、波姬红、布兰瑞克等果树苗：桃树苗、苹果苗、梨树苗、核桃苗、樱桃苗、草莓苗、香椿苗、花椒苗、柿子苗、山楂苗、石榴苗、葡萄苗、李子苗、板栗苗、杏树苗、枣树苗、蓝莓苗、无花果苗、猕猴桃苗等。绿化苗：樱花、海棠、侧柏、龙柏、木槿、法桐、国槐、白蜡、银杏、黄栌、冬青、皂角、火炬、臭椿、垂柳、紫薇、玉兰、合欢、丁香、杨树、蜀桧、桧柏、雪松、黑松、油松、景松、紫叶李、红叶李、太阳李、榆叶梅、五角枫、扶芳藤、美人梅、千头椿、香花槐、金银花、白皮松、华山松、红叶碧桃、龙柱碧桃、菊花碧桃、红叶小檗、紫叶矮樱、大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、小叶女贞、北海道黄杨等。

乳剂型来加以克服。

丰水梨树苗：丰水梨是一种原产于的梨，该品种树冠中大，幼树期生长旺，结果后树势中庸，萌芽力高，成枝力弱，成花容易，结果早，以短果枝结果为主，座果率极高。其果实，口感。是三水梨之一，其品质优于幸水和新水。品质上等，平均单果重240克，大单果重750克。

5.购苗：(1)购苗的同时应领购公司配备的生根剂(或生根粉、壮苗生根剂);(2)苗木购回后，先把嫁接部位的膜带去掉，也可以用片将膜带划断，然后把树根断口重新修剪一下，使断口处整齐，便于新根滋生;(3)将生根剂按说明比例兑水后，把根部修剪过的树苗在生根液中浸泡3个小时。