

2公分西梅李子树苗价格 西梅李子苗报价

产品名称	2公分西梅李子树苗价格 西梅李子苗报价
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	15.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

北京西梅李子苗报价客户至上，早春是树体梢、叶、花、果等器官的再造期，需要大的营养物质。例如树体内贮藏的营养及地下根系吸收的各种矿质元素和水分,在营养充足的情况下,树体萌芽整齐、生长速度快、新器官生长健壮,坐果率高,幼果发育速度快。此期需肥以氮肥为主,可施用高氮水溶肥等。01 萌芽期追肥追肥时期

北京西梅李子苗报价客户至上

2.波尔多液,主打药剂:在对葡萄防病的过程中,应以波尔多液为主打药剂,适当配合喷施其他药剂。具体做法是,于花后喷1次1:0.7:220倍波尔多液,葡萄膨大期时喷1次1:0.7:200倍波尔多液,葡萄采收后喷1次1:1:180倍波尔多液,秋季喷1~2次1:1:160倍波尔多液。中间如果发生白腐病、炭疽病等,则要对症喷药。这些药剂多为酸性,与波尔多液配合施用应严格控制间隔时间。

甜樱桃矮化栽培建园前根据影响树势和产量的内在因素(品种、砧木、土壤类型、气候条件)选择适宜的栽植模式(行株距)和树形,如自由纺锤形、细长纺锤形、沃根纺锤形、赞恩纺锤形、HYTEC树形、Solaxe树形、塔图拉网架形、开心形、西班牙丛枝形、多主枝自然形、布鲁纳改良纺锤形、扇形等。无论采用何种树形,整形修剪的任务:一是定植后综合采取多种措施促发新枝,尽快占据果园有效空间,完成高光效树形培养;二是开始结果后,通过精细修剪调控花芽的形成,尽快进行树势和产量关系(叶果比)的调控。这也是矮化栽培特点(树体小、结构简单、结果早、产量高、树体营养生长和生殖生长矛盾突出)的必然要求;同时简单的矮化树体结构也为采用不同修剪手法进行树形培养和叶果比精细调节提供了方便。甜樱桃矮化栽培整形修剪的精细化,使主枝配置、新梢生长、叶片发育、

花芽形成等更加协调。如早春萌芽前通过对枝条上单个芽的管理(促进其萌发或疏除),可节约树体营养,使碳、氮贮藏营养得到大化利用,避免树体资源浪费。

以亩栽222株为例,按每株1米的株距,挖一大窝,将苗木受伤的根系和小枝剪掉,苗木置于窝内,根系向四周拉平分布均匀,然后用细土将根系四周空隙填满,上复细土踏实,使根系与土壤紧密结合,扶正苗木,栽植深度以根颈处略高于地平面为宜。栽后立即浇施定根水,每株浇水15-25公斤,如土壤干燥应多浇,以土壤能随水自然下沉为宜。待水渗完后覆土,覆土可以做成20厘米高的锅盖形,以防止树杆摇动。在干旱和低温地区覆土后树盘还须盖上1平方米的地膜,以保持水份,提高地温,提高苗木成活率。栽植方法从秋季落叶至第=年春季发芽前都可栽植,但以秋季落叶后栽植为好,有利于成活和根系的生长。栽植时间

定植后在基部留高10厘米左右重截,让其萌发4~6个新梢作为主枝,当年就可结果。以后再在各主枝上进行短截,促其再发新枝,用以扩大树冠和培养枝组。优点是树冠较矮小,适于风大以及北方保护地栽培,便于密植管理;缺点是通风透光较差,结果部位低,影响果实品质。【丛生形】3、整形修剪 以春栽为主,采用防寒栽培的地方,也可秋植。栽植后及时定干,定干高度40~60厘米。根据品种、整形方式和土质条件确定栽植密度,栽植密度为1~2米×3~4米。2、栽植时期与密度

四、防虫治病,进行“ ”。采果后及时清园,剪去枯枝、病虫枝,清除脱落在地面上的病虫枝叶,集中烧毁或深埋。秋季板栗树的病虫应适时施药,农药可选用倍量式波尔多液、40%乳剂1500-2000倍液,2.5%敌乳油8000倍液等。

我们的地址:山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄电话:13335292778联系手机:13335292778
期待您的咨询