

1公分冰脆李子苗 适合南方种植的李子树苗

产品名称	1公分冰脆李子苗 适合南方种植的李子树苗
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

冰脆李子苗冰脆李子苗接穗泰安岳美园艺场位于泰安高新区，始建于2000年，是经山东省部门备案，三证齐全单位，苗圃2000余亩。本中心历经20多年风雨洗礼，以保证为育苗宗旨，以值得信赖广交天下好友。多年来，经山东农业大学、山东省果树等多家科研院所，近百余名科研专家研究，先后发展和培育了多种名特优质果树、绿化苗木新品种，产品销往众多省市地区，受到广大客户的广泛赞誉和一致好评。本中心为山东果树定点优质果树苗繁育推广中心。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

地膜要求铺平、盖严。播种前2至3天，将经过层积处理的种子放在温室或室内进行催芽，将发芽的种子拣出待播。二、播种用人工在地膜上扎孔。要求株距3至5厘米，孔深2至4厘米，孔径5厘米，行距为宽窄行，窄行30厘米，宽行60至70厘米。

整形的主要内容包括以下三方面：(1) 主干高低的确定：主干是指从地面开始到主枝的分枝处的高度。主干的高低和树体的生长速度、增粗速度呈反相关关系。栽培生产中，应根据桃建园地点的土层厚度、土壤肥力、土壤质地、灌溉条件、栽植密度、生长期温度高低、管理水平等方面进行综合考虑。灌水：为确保栽植的李树苗冬春发生冻害、抽条等伤害。在入冬前，可在离苗木50厘米的西北面，堆成月牙形土堆防寒，等开春苗木萌芽后再拆除土堆。检查成活率及补苗：新栽苗木灌水后及时检查，如有苗木歪斜或穴内填土不平现象，应扶直并填土补平栽植坑。我基地经营各种苗木：桃苗：映霜红桃苗，秋彤桃苗，永莲系列桃苗，春雪桃苗，金秋红苗，中油16号桃苗等。苹果苗：烟富8号苹果苗，中秋王苹果苗，M26苹果苗，M9T337苹果苗，红色之爱苹果苗等。樱桃苗：吉塞拉樱桃苗，车厘子樱桃苗，红灯樱桃苗，美早樱桃苗，布鲁克斯樱桃苗等。核桃苗：香玲核桃苗，8518核桃苗，元丰核桃苗，辽核核桃苗等。

李子树苗果园土壤如何保持水土大力提倡李子苗果园生草和覆草。采取相应措施，防止土壤和水盐碱化，禁止开垦原始森林，禁止过度开发利用水资源，禁止国家或地方政策不允许的一切土地农用方式。但在干旱且无灌溉条件地区不适宜。是近年来，我国北方晚霜冻害尤为严重，一些春季开花早的果树，经常遇到晚霜危害，轻者减产，重者绝收。有些地区晚霜危害已成为发展果树的限制因子。为了今后能有效预防晚霜冻害，特给你几点建议，供您和其他朋友参考：一、果园地势与冻害的关系根据对栖霞、蓬莱、招远、莱阳、海阳、牟平各县市（区）受冻害果树的调查表明，晚霜冻害的轻重与果园立地条件、地势有关。同时促进碳水化合物的增加，使李树早果丰产。六、以疏为主，疏短结合。李树常以自然开心形整。定植苗高80厘米时定干，主干上错落着生3个主枝，直线延长，在侧面分生副主枝构成骨干枝。夏季，各主枝达20—30厘米长时进行摘心或短截。

李子树苗想丰产怎么做一、适地适树。李子苗为蔷薇科李属植物。李产区与南方气候似，可选用优良品种，如脆红，单果重100克，外观漂亮，，8月下旬成熟，品质，离核，味甜。

(3)根据物候期确定施肥种类和数量： 施肥时间：9月中下旬~10月上旬；物候期：果实采收后，花芽分化后期；施肥量：每株施入畜粪50千克~100千克花前肥。 施肥时间：4月上旬；物候期：花芽萌动至开花前；施肥量：每株施0.5千克~1千克化肥或腐熟人粪尿25千克幼果肥。6月上旬砧苗长到20厘米时全部摘心，促进分根和加粗生长。李子苗栽培施肥时间和施肥量李子苗栽培施肥时间和施肥量施肥是李树综合管理中的重要环节。实践证明合理的施肥，能使树体发育良好，促进花芽形成，减少落花落果，获得较高的产量，而且使果实品质好、含糖量高、色泽好、延长结果年限，增强树体对不良环境和病虫害的抵抗能力。李子有自花不孕现象，因而，栽培品种不宜单一，应隔一定距离栽植花期一致的不同品种做授粉树，比例为4：1或8：1。肥水管理（一）施肥1、基肥基肥是能较长时间供给李树苗多种养分的基本肥料，一般以迟效农家肥为主，如堆肥、厩肥、作物秸秆、绿肥、落叶等。

李子苗常见的栽培清树摘净并残留在树上的病果、虫果、僵果，然后收集在一起挖坑深埋。剪去树上的干枯枝、病虫枝、萌发的根蘖并带出园外深埋或烧掉。

防虫害为了病源、害虫越冬基数，果实采收后可在李树上喷施50%多菌灵可湿性粉剂800~1000倍液，或50%托布津1000~1200倍液，或80%的代森锌可湿性粉剂800~1000倍液，或50%的退菌特800李小食心虫、李枯叶蛾可用40%的2500~3000倍液，或40%的乳油1500~2000倍液，或50%的辛硫磷800倍液混合40%的乐果800倍液，或50%的1000倍液进行。

叶面施肥果实采收后应尽早喷施1次0.2%~0.3%的溶液，以增强树势，有利于树体营养的积累和越冬。此时叶面应少施或不施尿素。

叶面喷布可多次进行（10~15天左右一次），还可结合病虫等共同喷布，花期用0.2~0.3%的硼酸液喷布树冠，可提高座果率。（三）灌溉与排水1、灌水：脆红李虽然抗旱，但要达到高产，必须有充足的水分供应：花期不宜灌水，否则会引起落花落果。李绝大多数品种自花不结实，栽培时必须配置一定数量的授粉品种，要求授粉品种不仅与主栽品种花期相近而且花粉量大，授粉亲和性好的1~3个。授粉品种与主栽品种的比例以1：5~4为宜。李树树冠较苹果、杏小，高度也矮，属于小乔木类型，可以适当密些。如“天达-

2116” ，它里面含有大量的分子链活性物质，喷施后在树体表面形成一层分子膜，且里面的多种微量元素能够提高细胞质的浓度，能够有效激活作物体内的甲壳素酶和蛋白酶，极大地提高氨基酸和甲壳素的含量，增加细胞膜中不饱和脂肪酸的含量，降低细胞的冰点，使之在低温下能够正常生长。

李子苗如何避免冻害霜害和冻害是指果树在生长期夜晚土壤和植株表面温度短时间降至0℃或0℃以下或者遇到霜降，致使果树部分遭受伤害的现象。平均每年霜冻危害面积达34万km²，重的年份达77万km²，每年造成农作物，果树和蔬菜损失达30亿元。是近年来，北方晚霜冻害尤为严重，一些春季开花早的果树，经常遇到晚霜危害，轻者减产，重者绝收。有些地区晚霜危害已成为发展果树的因子。

为了今后能有效预防晚霜冻害，特给你几点建议，供您和其他朋友参考：

一、果园地势与冻害的关系

根据对栖霞、蓬莱、招远、莱阳、海阳、牟平各縣市（区）受冻害果树的调查表明，晚霜冻害的轻重与果园立地条件、地势有关。因为水的热容量大，白天吸收的大量热量夜间释放，从而可减缓气温剧变的影响，因此沿海约10km范围内水源周围的果树冻害较轻，其次是气流量较大、气体交换的山顶和风口处及地势高的果园受害较轻。受害重的是平泊地、干涸河床、低洼平地，其原因是冷空气凝聚在地势低洼地带。调查中发现受冻绝产的园片中，有水的水池和药池上方的枝座果率极高，对产量几乎无影响。同一果园，树势弱的园片较树势强的园片冻害重，沙滩果园受害惨重，粘土地果园受害相对较

结果期修剪应以疏剪为主，疏除病虫枝，密生枝，交叉枝，干枯枝，使枝条均匀分布，利于通风透光，增进枝档发育，使树冠疏密适度，内外立体结果，达到丰产稳产李子苗管理需要做的工作非常少，这个时间农户是比较清闲的。桃叶片的光合作用比较强，每平方米叶面积净同化量为4.8克，光强以1000勒克斯好。在一定限度内，光照减少到全光照的60%时，对同化量影响不大；但降到30%时同化量即为60%，18%时同化量仅为27%，一般南方品种群耐阴性高于北方品种群。播种是将发芽的种子播在孔内，1穴1粒或2粒。在种子上盖2厘米厚的湿细土，把穴口封严。为保证播种质量和出苗整齐，种子不发芽不播种。播种以4月上旬前进行为宜。播种后天气晴，4至5天就有苗子顶出地膜，7至10天苗子就可以出齐。

冰脆李子苗接穗_冰脆李子苗

泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）位于举世闻名的泰山脚下，是全国有名的苗木之乡。我基地专业繁育果树苗、绿化苗已有几十年，信誉度高、重承诺、抓质量、保纯度是我们的一贯宗旨。我们基地是由山东省果树研究所、山东省农科院、农业大学从国内、国外优选出100多个果树品种，建立了基地。从母本园中采穗，优选出一批跨世纪新品种，适应性广，经济效益高的良种苗木，自繁育400多万株优质果苗，确保品种纯正。苗木销往全国各地得到用户好评。专业不是说出来的，也不是写出来的，专业来自于实力，更来自于客户的认可。泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）郑重承诺：本场提供苗木保证纯度、法律公正、代办检疫、保湿邮寄。桃树苗：春雪、突围、秋彤、莱山蜜、映霜红、永莲蜜桃、金秋红蜜、仓方早生、新川中岛、中华福桃、中华寿桃、中油4号、中油5号

等苹果苗：金帅、红肉、红富士、红嘎啦、红将军、新红星、烟富3号、烟富6号、烟富8号、美国八号等
梨树苗：黄金、黄冠、圆黄、秋月、绿宝石、晚秋黄、玉露香、红香酥、早酥红、早红考密斯等
樱桃苗：红灯、美早、先锋、早大果、黑珍珠、拉宾斯、萨米脱、布鲁克斯等
核桃苗：香玲、鲁光、元丰、辽核、清香、8518等
草莓苗：红颜、章姬、丰香、甜查理、法兰地、全明星等
柿子苗：次郎、富有、磨盘、合柿、斤柿、牛心柿、阳丰甜柿、日本甜柿等
花椒苗：大红袍、九叶青等
山楂苗：大金星、大五棱等
石榴苗：泰山红、大青皮等
葡萄苗：巨峰、夏黑、红提、藤稔、京亚、赤霞珠、金手指、美人指、玫瑰香、红宝石、红巴拉多等
李子苗：秋姬、脆红、青脆、蜂糖、安哥诺、红宝石、黑宝石等
枣树苗：梨枣、雪枣、冬枣、金丝枣等
板栗苗：华光、华丰、石丰、处曙红、泰山一号等
杏树苗：凯特、金太阳、珍珠油、红等
蓝莓苗：都克、蓝丰、喜来、北陆、达柔等
无花果苗：青皮、金傲芬、波姬红、布兰瑞克等
果树苗：桃树苗、苹果苗、梨树苗、核桃苗、樱桃苗、草莓苗、香椿苗、花椒苗、柿子苗、山楂苗、石榴苗、葡萄苗、李子苗、板栗苗、杏树苗、枣树苗、蓝莓苗、无花果苗、猕猴桃苗等。
绿化苗：樱花、海棠、侧柏、龙柏、木槿、法桐、国槐、白蜡、银杏、黄栌、冬青、皂角、火炬、臭椿、垂柳、紫薇、玉兰、合欢、丁香、杨树、蜀桧、桧柏、雪松、黑松、油松、景松、紫叶李、红叶李、太阳李、榆叶梅、五角枫、扶芳藤、美人梅、千头椿、香花槐、金银花、白皮松、华山松、红叶碧桃、龙柱碧桃、菊花碧桃、红叶小檗、紫叶矮樱、大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、小叶女贞、北海道黄杨等。