

金华千喜苗木供应报价1-30公分杨梅果树、东魁杨梅小苗

产品名称	金华千喜苗木供应报价1-30公分杨梅果树、东魁杨梅小苗
公司名称	金华市金东区千喜苗木场
价格	5.00/棵
规格参数	直径:1-30公分 高度:30-500cm 冠幅:20-500公分
公司地址	金华市金东区千喜苗木场
联系电话	13506585554

产品详情

金华千喜苗木供应报价1-30公分杨梅果树、东魁杨梅小苗.

杨梅（杨梅科杨梅属植物）编辑

杨梅：属于木兰纲、杨梅科、杨梅属小乔木或灌木植物，又称圣生梅、白蒂梅、树梅具有很高的***价值，在中国华东和湖南、广东、广西、贵州等地区均有分布。杨梅原产中国浙江余姚，1973年余姚境内发掘新石器时代的河姆渡遗址时发现杨梅属花粉，说明在7000多年以前该地区就有杨梅生长。该属有50多个种，中国已知的有杨梅、白杨梅、毛杨梅、青杨梅和矮杨梅，经济栽培主要是杨梅。

杨梅枝繁叶茂，树冠圆整，初夏又有红果累累，可爱，是园林绿化结合生产的优良树种。孤植、丛植于草坪、庭院，或列植于路边都很合适；若采用密植方式来分隔空间或起遮蔽作用也很理想。

杨梅长虫了能吃么

杨梅的***部分其实是它外果皮外层柱状凸起形成的红褐色多汁组织。由于是完全的，虫子可以轻易地在杨梅凹凸不平的表面产卵。

杨梅虫其实一点也不可怕多

杨梅虫是果蝇的幼虫，还是一种蛋白，在繁殖季节，它会被杨梅的气味所吸引，在杨梅表面上产卵，它的卵孵化变成幼虫后钻入果肉中，以果肉为食。

清洗杨梅多

杨梅买回家应及时吃掉，不能及时吃掉的要先用高浓度的盐水浸泡，这样小虫子便会受到窜出来。若放冰箱保存也要先盐水除虫，否则虫子冻就跑不出来了。

内容整理：捉虫行动

中文学名 杨梅 拉丁学名 *Myrica rubra* (Lour.) S. et Zucc. 别 称 圣生梅、白蒂梅、树梅 界 植物界 门 被子植物门 纲 木兰纲（双子叶植物纲） 亚 纲 金缕梅亚纲 目 杨梅目 科 杨梅科 属 杨梅属 种 杨梅(*M. rubra*) 分布区域 中国华东和湖南、广东、广西、贵州等地 环境分布 低山丘陵向山坡或山谷中 生态习性 陆生植物 生活型 常绿乔木 日 照 果树 水 分 1000毫米以上 温 度 均气温15~21 土 壤 喜酸性土壤 海 拔 海拔125-1500米 ***价值 生食 象征意义 誉为“绿色企业”和“ ” 原产地 中国浙江余姚

目录

1 形态特征

2 生长环境

3 分布范围

4 主要价值

形态特征编辑

树干

常绿乔木，高可达15米以上，胸径达60余厘米；树皮灰色，老时纵向浅裂；树冠圆球形。小枝及芽，皮孔通常少而不显著，幼嫩时被圆形而盾状着生的腺体。

叶

叶革质，，生存至2年脱落，常密集于小枝上端部分；多生于萌发条上者为长椭圆状或楔状披针形，长达16厘米以上，渐尖或急尖，边缘中部以上具***疏的锐锯齿，中部以下常为全缘，基部楔形；生于孕性枝上者为楔状倒卵形或长椭圆状倒卵形，长5-14厘米，宽1-4厘米，圆钝或具短尖至急尖，基部楔形，全缘或偶有在中部以上具少数锐锯齿，上面深绿色，有光泽，下面浅绿色，，被有***疏的金黄色腺体，干燥后中脉及侧脉在上下两面均显著，在下面为隆起；叶柄长2-10毫米。

花蕊

杨梅

花雌雄异株。雄花序单独或数条丛生于叶腋，圆柱状，长1-3厘米，通常不分枝呈单穗状，***在基部有不显著的短分枝现象，基部的苞片不孕，孕性苞片近圆形，全缘，背面，被有腺体，长约1毫米，每苞片腋内生1雄花。雄花具2-4枚卵形小苞片及4-6枚雄蕊；花***椭圆形，暗红色，。雌花序常单生于叶腋，较雄花序短而细瘦，长5-15毫米，苞片和雄花的苞片相似，密接而成覆瓦状排列，每苞片腋内生1雌花。雌花通常具4枚卵形小苞片；子房卵形，，，短的花柱及2鲜红色的细长的柱头，其内侧为具乳头状凸起的柱头面。雌花序上端1（***2）雌花能发育成果实。

果实

杨梅花

核果球状，外表面具乳头状凸起，径1-1.5厘米，栽培品种可达3厘米左右，外果皮肉质，多汁液及树脂，味酸甜，成熟时深红色或紫红色；核常为阔椭圆形或圆卵形，略成压扁状，长1-1.5厘米，宽1-1.2厘米，

内果皮硬，木质。4月开花，6-7月果实成熟。

生长环境编辑

杨梅，喜酸性土壤，原产中国温带、亚热带湿润气候的海拔125-1500米的山坡或山谷林中，主要分布在长江流域以南、海南岛以北，即北纬20度至31度之间，与柑桔、枇杷、茶树、毛竹等分布相仿，但其能柑桔、枇杷强。 [1]

分布范围编辑

杨梅在中国分布的省份有云南、贵州、浙江、江苏、福建、广东、湖南、广西、江西、四川、安徽、台湾等，国外，如日本和韩国有少量栽培，东南亚各国，如印度、缅甸、越南、菲律宾等国也有分布。