

中油蟠5号蟠桃苗新品种介绍

产品名称	中油蟠5号蟠桃苗新品种介绍
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	6.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

泰安岳美苗木有限公司大棚桃栽植编辑1.苗木（1）购苗秋后至春节前购苗为宜。春节后购苗，极易发生品种混杂现象，而且优良品种。大棚株行距 0.9×1.8 米左右，亩栽411株左右。（2）运苗零度以上装车，苗木淋湿后封严。苗到家零度以上卸车并入室，盖严保温保湿，严禁置于零度以下的。

在定植后芽长 - 厘米时施次薄肥水，以后每 - 天追肥一次至月初停止，并控制水分，以利成花。第二年于月下旬月中旬月下旬各追肥一次，追肥以氮肥为主，每次株施尿素 - 克。于月下旬 - 月初施基肥，株施腐熟的猪鸡粪肥千克过磷酸钙克。丰产树定植第年起施肥在南方，杏树早结果早丰产，密植园第年即可丰产期。这时期杏树着重施次肥。第次于发芽前月中旬施春肥发芽肥，以氮肥为主，并将全年钾肥全部施入，可结合薄肥水施用。

（3）贮苗苗木购回后如果不立即栽植，那么有两种贮存。埋土法选零度以上的天气，将苗木成捆平埋坑中，坑深60-80厘米，覆土30厘米比地面稍高，上覆草堆，不，只泼水，7

度以下保存。此法易，春季土壤解冻后立即栽植。第二假植法背风处开沟，深60厘米，长宽不限，方向不限。将捆拆开，挨株斜栽于沟中，填沙土或细土，超过苗木阴阳线20-30厘米，大水灌透并填充空隙，然后盖草，以免风吹日晒而失水。2.栽植时间秋栽不缓苗，长势壮，时间在树叶变黄至封冻前。秋栽需要防寒防抽干，冬季特别严寒地区如东北、内蒙等地不能安全越冬，不能秋栽。春栽缓苗，长势弱，时间在1-4月，土壤解冻后至发芽前，越晚长势越弱。大棚果树适于春栽，这是因为大棚秋冬季节生产蔬菜，而果苗需要低温休眠，升温不能正常生长。另外，大棚果树也可以先栽树后建棚。3.整地起垄露地行距2.5米左右，大棚行距1.8米左右。露地南北行或东西行皆可，山地可沿等高线定行。冬暖棚南北成行，由西向东排列。拱棚的行向与棚向垂直，即南北棚东西成行，东西棚南北成行。沿行起垄，垄高20厘米左右。起垄前有两种整地。（1）全园深翻地面撒施发酵粪，通常5立方米/亩左右，新棚10立方米/亩以上，旧棚有机质含量较高，可以不施粪。然后深翻40厘米左右。（2）沿行开沟深60-80厘米，宽80-100厘米，下半部填入500公斤左右杂草和熟土相混，上半部填入有机肥5立方米/亩左右，并与熟土相混，直至填满。熟土不够，可以从行间挖取，并将心土撒于行间，然后大水沉实。4.苗木处理栽前把砧木芽全刻去，只留嫁接芽，并把绑膜解去。5.配授粉树至少2个品种，隔行相间栽植或隔株相间栽植，而且不同品种必须花期相遇。

果实质量，而且寿命长，可延续后果~年。后果枝和花簇状果枝是产量构成的根底。樱桃酸樱桃在初果期，长中果枝的比例大，而在盛果期则短果枝和花簇状果枝为主。b幼树的修剪为了幼树早后果，在的根底上，对各类枝条的修剪水平要轻，以生临时的摘心为主。以控制枝梢旺长，添加分枝，加迅扩展树冠。夏季修剪工夫应推延到萌芽前，以防止剪口失水枯槁。除对主枝延伸枝短截和适当间疏一些过密枝外，其他中小枝要尽量保存。

6.垄上栽植先将苗木栽到垄的一边，南北行嫁接口向东，东西行嫁接口向北。露地株距1.25米左右，大棚株距0.8米左右。填土时上下如捣蒜状，使根际充满细土。继续上提，使苗

木阴阳线超出地平面5-10厘米。栽后当天大水一次浇透，水渗后继续埋土，成苗埋土超过嫁接口10厘米，芽苗埋土超过嫁接口1厘米（发芽前扒土嫁接芽并喷杀虫剂）。此时苗木即栽于垄上，千万不能深栽，阴阳线不能低于地平面。以后随果树生长继续培垄，至少高出地平面30厘米。7.苗木定干芽苗于嫁接口上方1厘米处剪平。成苗根系小的定干50厘米左右，根系大的高定干100厘米左右。8.保湿保活（1）成活关键的措施是保湿，垄上先盖5厘米厚的湿草，草上覆盖地膜，以保持湿度，地温。树干周围撒土，以免热气从膜孔中出来树干。（2）剪掉所有枝杈，只留一个主干，以水分蒸发。（3）苗用报纸包裹以水分蒸发，发芽时上端。也可用地膜将苗木缠一层，以水分蒸发，千万不能包多层，否则昼夜冻融交替而死苗。（4）发芽后及时抹去砧木芽，否则芽苗嫁接芽不发。（5）如果大棚栽植，栽后一个月内温度不宜超过28℃，否则苗木尚未发生新根而先发芽，蒸发失水萎蔫死亡。

每穴施入无机肥~千克。将肥料与土壤拌匀后，再栽苗，并立刻浇定根水。二土肥水管理编辑樱桃的土壤管理，据我们的实验察看以为以春季加掩盖，其它时节停止中耕除草的管理办法。由于掩盖加重了春旱对植株的影响，对果实生长有良好作用。在樱桃采收后，撤除或翻埋掩盖物。据计算，普通成年园每亩应掩盖~千克麦秆为宜。樱桃树一年应施肥~次。即采果后施肥次要是为恢复树势，促进花芽分化，进步来年产量。在采果后立刻施入厩肥禽畜粪尿，并掺加少量化肥。

（6）行间间作物不影响苗木受光，好安排肥水需求量大的矮杆间作物。如果大棚栽植，5月上旬必须拔菜。9.加快生长（1）栽后每7-10天浇水一次，保持地表，直至9月。其间下一场大雨，可以少浇一次水，但下小雨不能代替浇水。（2）5-8月，每次浇水前，取2号复合肥8-10公斤/亩，预先化开，随水冲施。（3）每15天左右向叶底面喷布一次24号叶肥。

c后果树的修剪常在采果后停止冬季修剪。采用疏剪去除过密过强扰乱树冠的多年生大枝

，停止树冠构造，促进花芽构成。在疏除大枝时，留意伤口要小，要平，以利尽快愈和。疏除一年生枝时，可先在其基部腋花芽以上剪截，待后果光秃后，再疏除。夏季修剪时，应留意对主干枝先端和短果枝的~年生枝段停止适当回缩，以安慰养分生长和新果枝的不时构成，避免后果部位外移和树冠外部光秃。d衰老树的修剪次要义务是及时更新复壮应用生长势强的徒长枝来构成新的树冠。