

春鹃、毛鹃、杜鹃小苗容器苗产地 金华30高度春鹃杯苗批发

产品名称	春鹃、毛鹃、杜鹃小苗容器苗产地 金华30高度春鹃杯苗批发
公司名称	金华市金东区千喜苗木场
价格	.00/棵
规格参数	品牌:千喜苗木 高度:30-100cm 冠幅:20-100cm
公司地址	金华市金东区千喜苗木场
联系电话	13506585554

产品详情

春鹃、毛鹃、杜鹃小苗容器苗报价 金华30高度春鹃价格.

春鹃，又名映山红、满山红、山踯躅、红踯躅、山石榴,常绿灌木，高约2米；分枝多，枝细而直。叶互生，长椭圆状卵形，先端尖，表面深绿色，疏生硬毛，背面淡绿色。总状花序，花单生或顶生，漏斗状，花色多样，品种繁多。有常绿杜鹃、落叶杜鹃；根据花期分为春鹃、夏鹃和春夏鹃。依花型分为单瓣、套瓣和重瓣。花瓣又有扁平、微皱边和皱边之分。花期4-5月，果熟期10月。多生于山坡、丘陵灌丛中。

中文学名 春鹃 拉丁学名 *Rhododendronsimsii*&R.spp. 别 称

映山红、满山红、山踯躅、红踯躅、山石榴等 界 植物界 门 被子植物门Magnoliophyta

纲双子叶植物纲Magnoliopsida 目 杜鹃花目Ericales 科 杜鹃花科Ericaceae 属 杜鹃花属*Rhododendron* 种

杜鹃花*R.Pentanthera**R.Tsutsusi* 分布区域 集中于云南、和四川三省区的横断山脉一带 英文名

SimsAzalea、*IndianAzalea*

目录

1 形态特征

2 生长环境

3 分布范围

4 主要价值

形态特征编辑

春鹃是当今的花卉之一。它是杜鹃花科中一种小灌木，有常绿性的，也有落叶性的。北半球温带各地，都有春鹃花的分布。春鹃花美丽。管状的花，有深红、淡红、玫瑰、紫、白等多种色彩。当春季春鹃花开放时，满山鲜艳，像彩霞绕林，被人们誉为“花中西施”。五彩缤纷的春鹃花，唤起了人们对生活热烈美好的感情，它也象征着的繁荣富强和人民的幸福生活。这就是我国人民热

春鹃

爱春鹃的真谛。春鹃花的代表种，就是俗称的“映山红”。它几乎长江流域各省以至云南、台湾等山地和丘陵上的疏林或灌木丛中。漏斗状的花，花瓣有酸味，可当水果吃，但一次***不能过多，否则会引起鼻出血。

落叶灌木，高约2米；枝条、苞片、花柄及花等均有棕褐色扁平的糙伏毛。叶纸质，卵状椭圆形，长2—6厘米，宽1—3厘米，尖，基部楔形，两面均有糙伏毛，背面较密。花2—6朵簇生于枝端；花萼5裂，裂片椭圆状卵形，长2—4毫米；花冠鲜红或深红色，宽漏斗状，长4—5厘米，5裂，上方1—3裂片内面有深红色斑点；雄蕊7—10，花丝中部以下有微毛，花***紫色；子房及花柱近基部有糙伏毛，柱头头状。蒴果卵圆形，长约1厘米，有糙伏毛。花期4—5月，果熟期10月。为酸性土指示植物。叶含黄酮类(杜鹃花醇)、三萜成分、乌苏酸。

花单生或呈总状花序，花冠钟状或阔漏斗状，通常五裂，色彩因种类不同而有红、黄、白、紫、粉红等色，一般春鹃在四月开花，夏鹃在五、六月开花。蒴果，种子多数而细小。

春鹃花盛开之时，恰值杜鹃鸟啼之时，古人留下许多诗句和优美、动人的传说，并有以花为节的习俗。杜鹃花多为灌木或小乔木，因生态环境不同，有各自的生活习性和形状。小的植株只有几厘米高，呈垫状，贴地面生。大的数丈，巍然挺立，蔚为壮观。

生长环境编辑

春鹃花喜欢酸性土壤，在钙质土中生长得不好，甚至不生长。因此土壤学家常常把春鹃花作为酸性土壤的指示作物。春鹃花经过人们多年的培育，已有大量的栽培品种出现，花的色彩更多，花的形状也多种多样，有单瓣及重瓣的品种。春鹃性喜凉爽、湿润、通风半阴环境，既怕酷热又怕严寒，生长适温为12至25，夏季气温超过35，则新梢、新叶生长缓慢，处于半休眠状态。

夏季要防晒遮阴，冬季应注意保暖防寒。忌烈日暴晒，适宜在光照强度不大的散射光下生长，光照过强，嫩叶易被灼伤，新叶老叶焦边，严重时会导致植株死亡。冬季，露地栽培春鹃要采取措施进行防寒，以保其安全越冬。观赏类的春鹃中，西鹃抗寒力弱，气温降至0以下容易发生冻害。春鹃花原产中国，马来半岛及亚洲南部高山亦有分布。我国四川、云南、贵州山区常绿杜鹃种类丰富，落叶杜鹃从东北到华南都有分布。天然群落分布于高山，生长在阴坡上，属半荫性植物。喜生于气候凉爽、空气湿度大、酸性土壤，也耐瘠薄，但不耐积水。

我国除新疆外南北各省区均有分布，尤以云南、和四川种类多，为杜鹃花属的***分布中心。春鹃花属种类多，习性差异大，但多数种产于高海拔地区，喜凉爽、湿润气候，恶酷热干燥。要求腐殖质、疏松、湿

润及pH值在5.5~6.5之间的酸性土壤。部分种及园艺品种的适应性较强，耐干旱、瘠薄，土壤pH值在7~8之间也能生长。但在粘重或通透性差的土壤上，生长不良。春鹃花对光有要求，但不耐曝晒，夏秋应有落叶乔木或荫棚遮挡烈日，并经常以水喷洒地面。

春鹃花抽梢一般在春秋二季，以春梢为主。适宜的生长温度为15~20摄氏度，气温超过30摄氏度或***5摄氏度则生长停滞。冬季有短暂的休眠期，以后随温度上升，花芽逐渐膨大，一般露地栽培在3~5月开花，高海拔地区则晚至7~8月开花。北方在温室栽培。1~2月即可开花。春鹃花耐修剪，隐芽受后***易萌发，可藉此控制树形，复壮树体。一般在5月前进行修剪，所发新梢，当年均能形成花蕾，过晚则影响开

花。一般立秋前后萌发的新梢，尚能木质化。若形成新梢太晚，冬季易受冻害。为常绿或落叶灌木。

分布范围编辑

中国是春鹃花的分布中心，约有460种，除新疆和宁夏外，各省区均有分布。东南部、四川西南部、云南西北部是集成的产地，均分别占，云南的杜鹃花品种就占品种的一半以上。许多从这里引种。杜鹃花是一个大属，约有900余种，分布于欧洲、亚洲和北美洲，而以亚洲多，有850种，其中我国有530余种，占59%，集中于云南、和四川三省区的横断山脉一带，是杜鹃花的发祥地和分布中心。喜马拉雅山脉的不丹、锡金、尼泊尔、缅甸、印度北部，种类也较多，日本、朝鲜、苏联西伯利亚和高加索少数种类。

主要价值编辑

园林

可以盆栽，也可以在蔽荫条件下地栽。其形秀丽美观。庭院栽培的春鹃树，应调整为伞形，其形增添乐趣美景。适宜群植于湿润而有庇荫的林下、岩际，园林中宜配植于树丛、林下、溪边、池畔及草坪边缘；在建筑物背阴面可作花篱、花丛配植。一些种类可制作盆景。