

# 富平尖柿子树苗、富平尖柿子树苗价格

产品名称	富平尖柿子树苗、富平尖柿子树苗价格
公司名称	泰安开发区利群苗圃
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13561766718

## 产品详情

尖柿，落叶植物。皮为橙黄色，果肉为橙黄色。主要分布在中国陕西省富平县。品种简介：富平尖柿主要分布在陕西省富平县。果个中等，平均单果重155克，长椭圆形，大小较一致。皮橙黄色，果肉橙黄色，肉质致密，纤维少，汁液多，味极甜，无核或少核，品质上等。该品种最宜制饼，加工的“合儿饼”具有个大，霜白，底亮，质润，味香甜5大特色。富平尖柿从汉初就开始栽植，距今有2000多年的历史，种类繁多，有升底尖柿、重台柿、辣椒尖柿、珠柿、方柿等，其中升底尖柿为柿子树中的名优品种，其营养价值居同类产品之冠。

柿子树苗种植技术：柿子树栽培中注意的问题

1. 园地选择 柿子树喜光照，但抗风力差，所以园地应选择在向阳背风的地块，山沟，必要时，应在柿子园周围设防护林。
2. 选择抗寒性强的砧木 君迁子（黑枣）根系发达，分枝力强，细根多，吸肥吸水力强，能抗旱抗寒，所以一般多利用君迁子作砧木。
3. 注意保护根系 柿树根系单宁含量多，一旦受伤，恢复较慢，故影响柿树成活，因此在苗木出圃和移栽时，要注意保护根系。
4. 适期栽植 因柿树幼苗冬季易抽条，春栽较好。先将柿苗灌水假植于阴凉处，待田间柿树萌芽时再栽植、埋土、浇水、覆膜，可显著提高成活率。
5. 掌握好施肥时期和施肥浓度 柿树是深根性果树，施肥后10天无明显变化，有的2个月还无明显反应。一般基肥以有机肥为主，在采收前施入，氮肥和钾肥可作基肥和追肥均匀使用，磷肥流动性差，所以要全部混在基肥中施入。柿树根系的细胞渗透压低，施肥时肥的浓度也要低，每次浓度不易超过10mg/L，以免造成烧根死枝死树。
6. 微量元素和生长调节剂的施用 微量元素是植物体内许多酶的组成成分及活化剂，影响叶绿素的形成，影响细胞的伸长和分裂，影响树体的抗旱抗寒能力。可在1~2月用乙烯利等生长抑制剂处理，使柿树

萌芽早些，避过春寒；生长季节用多效唑、比久处理使树体健壮，枝条充实，冬季免受冻害。

7. 夏季修剪 幼树生长旺盛，生长停止较迟，对延长枝生长的新梢，长达20~30cm时进行摘心，促使枝条木质化，防治抽条受冬而且可促发二次枝，形成结果枝组。幼树分支角度小，顶端优势强，在6~7月份要及时拉枝开张角度，改变枝条方向，以缓和树势，扩大树冠，促进枝条下部芽充实饱满，有利于安全越冬季翌年发枝形成花芽。

8. 加强病虫害防治 主要病虫害有柿园斑病、柿角斑病、柿蒂虫和柿棉蚧等。要以预防为主，综合防治，保证树体完整及树势健壮。

9. 培月牙土埂 冬季在距树根部1m左右、西北方向培以高70cm的月牙土埂，可降低树干附近的风速，提高地温，减轻和避免受冻抽条。

10. 树干涂白 枝干受冻时易发生日灼或诱发胴枯病，11月份涂白预防同时兼治大青叶蝉。

### 柿棉蚧的发生预防防治

柿棉蚧又名柿毛毡蚧、柿毡蚧是为害柿树的主要害虫。雌、雄成虫，卵，若虫均为紫红色，雌成虫体长1.5mm，宽1mm。雄成虫1.2mm。一年发生4代，以若虫在2—3年生枝条皮裂缝、粗皮下及干柿蒂上越冬，翌年4月中下旬开始出蛻为害，5月中下旬成虫交尾，6月中旬、7月上旬、8月中旬、9月中旬为个代若虫的孵化盛期，10月中旬若虫开始越冬。前两代主要为害柿叶及1—2年生小枝，后两代主要为害柿果，以第三代为害最重。防治方法是：1) 保持果园清洁。剪除树上残留得病虫枝，刮除老翘树皮，及时集中烧毁。2) 保护天敌。利用黑缘红瓢虫、小黑瓢虫、草青蛉等控制柿棉蚧，在天敌发生期尽量不用或少用农药。3) 药剂防治。发芽前喷一次5度石硫合剂或5%柴油乳剂，消灭越冬若虫。4月上旬至5月初在若虫未形成蜡壳前，喷40%氧化乐果1500倍液，或50%DDV乳剂1000倍液。蜡壳形成后喷800—1500倍蜡蚧灵溶液。