

河南目前新品种黄桃苗 早熟黄桃树苗

产品名称	河南目前新品种黄桃苗 早熟黄桃树苗
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）位于举世闻名的泰山脚下，是全国有名的苗木之乡。我基地专业繁育果树苗、绿化苗已有几十年，信誉度高、重承诺、抓质量、保纯度是我们的一贯宗旨。我们基地是由山东省果树研究所、山东省农科院、农业大学从国内、国外优选出100多个果树品种，建立了基地。从母本园中采穗，优选一批跨世纪新品种，适应性广，经济效益高的良种苗木，自繁育400多万株优质果苗，确保品种纯正。苗木销往全国各地得到用户好评。专业不是说出来的，也不是写出来的，专业来自于实力，更来自于客户的认可。泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）郑重承诺：本场提供苗木保证纯度、法律公正、代办检疫、保湿邮寄。桃树苗：春雪、突围、秋彤、莱山蜜、映霜红、永莲蜜桃、金秋红蜜、仓方早生、新川中岛、中华福桃、中华寿桃、中油4号、中油5号等苹果苗：金帅、红肉、红富士、红嘎啦、红将军、新红星、烟富3号、烟富6号、烟富8号、美国八号等梨树苗：黄金、黄冠、圆黄、秋月、绿宝石、晚秋黄、玉露香、红香酥、早酥红、早红考密斯等樱桃苗：红灯、美早、先锋、早大果、黑珍珠、拉宾斯、萨米脱、布鲁克斯等核桃苗：香玲、鲁光、元丰、辽核、清香、8518等草莓苗：红颜、章姬、丰香、甜查理、法兰地、全明星等柿子苗：次郎、富有、磨盘、合柿、斤柿、牛心柿、阳丰甜柿、日本甜柿等花椒苗：大红袍、九叶青等山楂苗：大金星、大五棱等石榴苗：泰山红、大青皮等葡萄苗：巨峰、夏黑、红提、藤稔、京亚、赤霞珠、金手指、美人指、玫瑰香、红宝石、红巴拉多等李子苗：秋姬、脆红、青脆、蜂糖、安哥诺、红宝石、黑宝石等枣树苗：梨枣、雪枣、冬枣、金丝枣等板栗苗：华光、华丰、石丰、处曙红、泰山一号等杏树苗：凯特、金太阳、珍珠油、红等蓝莓苗：都克、蓝丰、喜来、北陆、达柔等无花果苗：青皮、金傲芬、波姬红、布兰瑞克等果树苗：桃树苗、苹果苗、梨树苗、核桃苗、樱桃苗、草莓苗、香椿苗、花椒苗、柿子苗、山楂苗、石榴苗、葡萄苗、李子苗、板栗苗、杏树苗、枣树苗、蓝莓苗、无花果苗、猕猴桃苗等。绿化苗：樱花、海棠、侧柏、龙柏、木槿、法桐、国槐、白蜡、银杏、黄栌、冬青、皂角、火炬、臭椿、垂柳、紫薇、玉兰、合欢、丁香、杨树、蜀侏、桧柏、雪松、黑松、油松、景松、紫叶李、红叶李、太阳李、榆叶梅、五角枫、扶芳藤、美人梅、千头椿、香花槐、金银花、白皮松、华山松、红叶碧桃、龙柱碧桃、菊花碧桃、红叶小檗、紫叶矮樱、大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、小叶女贞、北海道黄杨等。

怎么培育桃树苗？1、苗圃地的选择快速培育桃树苗嫁接成品苗，一定要选择土质为轻壤或中壤、排灌方便并且肥沃的地块为苗圃地。因在一年内培育成嫁接成品苗，必须选择良好的立地条件，这是快速育苗成功的基础。圃址选择后要平整土地，每亩施优质腐熟有机肥5—6立方米，深翻后作畦。2、砧木种子的处理砧木种子选择当年山桃或毛桃的新种子，在播种前要进行浸种，一般用冷水浸泡3—5天，每天换水1次，有条件的加入马尿或人尿少量。3、播种时间常规桃树育苗培育砧木通常将砧木种子于12月底

层积处理，第2年春季3月底—4月初将种子取出进行播种，这种方法出苗较晚且苗势较弱。而快速育苗应在每年秋季土壤冻前进行播种。播种采用双行带状，即大行距50cm，小行距30cm，每亩播种量山桃为40kg，毛桃60kg，覆土厚度为种子直径的3—4倍。因此选择种子时要根据不同品种的需要进行种植，这样才能高产；还可以根据根系的情况确定种植桃树的范围[1]。

4、快速培养砧木苗，尽快达到嫁接粗度。春季苗木出土后，要及时灌水、除草、防治虫害。4—6月每月灌水2次，5—6月每月追施尿素1次，每次每亩15kg左右。要利用药剂控制金龟子为害幼苗。加强各项管理，使砧木苗在6月底以前达到嫁接粗度。

5、嫁接时间常规育苗通常在每年7月下旬—8月下旬进行嫁接，当年接芽不萌发。而快速育苗接芽当年萌发成苗，就要提前嫁接，一般要求在6月底—7月初进行芽接。接穗选择生长良好的长梢，接芽发育良好。

6、解绑、折砧和抹芽嫁接后2—3周解绑并在接芽以上1cm处将砧木折伤后压平，向上生长的副梢剪除，主梢摘心。这种措施是使接芽处于优势部位，迫使接芽萌发。折砧后接芽及砧木上原有芽均可萌发，要将砧木上萌发芽及时抹除，促使接芽迅速萌发生长。当接芽长到15—20cm时剪砧。秋天来了，隐隐感到一点萧索，我头顶的叶子都变成了金**，原来我很开心，却发现他们开始一片一片落了下来。满地都是金黄。秋风告诉我，明年你会更美丽。我过了不知多少个春夏秋冬，而冬天，总是*寒冷的。这是上一个冬。

7、加强土肥水管理，促使接芽快速生长。接芽萌发后，要及时中耕除草、追肥灌水，使苗圃地无杂草为害，接芽成活后每隔10—15天追施1次尿素，每次每亩施10kg左右，并且结合施肥灌水。为使苗木成熟度提高，每隔15天左右结合防治虫害喷施0.3%的磷酸二氢钾。当年秋季一般嫁接苗木高度在70—80cm，达到桃树定干高度。10月底将苗木挖出，除净叶片后砂藏假植。桃树苗栽培管理技术桃子素有“寿桃”和“仙桃”的美称，因其肉质鲜美，又被称为“天下第一果”。要想吃到好桃，就需要上心管理桃树苗，下面为大家介绍一下桃树苗需要掌握的栽培管理技术：

1.及时浇水与覆盖；桃树苗栽植当年的主要任务一是保成活，二是促生长。只有栽植当年管理到位，翌年才能有产量和效益。桃树苗栽植以后应立即浇水，水渗下后进行地面覆盖，可以盖草，也可以覆膜。盖草，即用作物秸秆、树叶、杂草覆盖输盘，这样即能保墒，还能防寒，成活率也提高。覆盖地膜，在定植行内沿行向覆盖地膜，一是可提高地温，有利于快速生根；二是可以保温，防止水分蒸发，提高成活率；三是可以抑制杂草生长。

2.定干与扶干；根据树形要求，需要干的要及时定干，定干高度一般为30~50cm，剪口下15~30cm为整形带，要有5~10个饱满芽，以便培养主枝。主干形不要定干，疏去分枝即可。芽苗栽后桩过高，影响愈合，形成死茬；过低会使接芽风干枯死。亦可在接芽上方10cm处剪砧，培养主干形时当作临时支柱使用。

3.检查成活率情况，及时补植；如果定植芽苗，砧木上的萌蘖与接芽争夺养分，要及时剪除，关键时期是4~5月。除萌蘖是一项细致的作业，切勿将接芽误当砧木除去。如接芽死亡，可选留一强壮的萌蘖作为新砧木培养，待秋季补接。

4.摘心芽苗定植；当新梢长至60cm左右时，若选用两主枝开心形或者三主枝开心形树形，可摘心定干，即选取两主枝或者三主枝，其余的摘心控制。桃树苗是否能用**粪不少果农朋友在种植桃树苗的时候，都会碰到一个问题，就是在挖好树坑之后是否可以撒**粪直接喂桃树？直接喂**粪会不会将桃苗烧死？事实上给桃树苗喂**粪是没有问题的，不过需要掌握好*作方法。

一、可以利用烘**将鸡粪烘干，因为通过鸡粪烘**烘干后的鸡粪不含水分，而且在烘干的过程中能够起到消毒、杀菌的效果，可以一次性把含水量在80%左右的鲜鸡粪直接烘干至成品。

二、鸡粪必须要经过腐化，注意施用的量不能过多，以免造成肥害，施用的时候要浇水不能过干，否则便无法发挥出其肥效。 **粪也属于一种自然肥料，鸡粪通过晾晒使其成为**粪块，或把**粪块打碎形成颗粒鸡粪肥。由于鸡不能完全吸收饲料中的营养，因而所排出的鸡粪里面会存在一些饲料中的养分，有机质可以达到65%，粗蛋白素有30%，氮磷钾的含量在8%左右。粗蛋白素与氮磷钾是作为农作物绿化肥料是非常可观的，生物肥本身对一些蔬菜、水果生长就有一定辅助作用，加之有些元素在其中会促进作用进一步提高。在使用**粪喂养桃树苗的时候只要掌握好每颗桃树的用量，不要过度施肥不然会出现烧死桃树苗的情况。