

# 金华乐昌含笑行道树供应咨询 乐昌含笑养护指导

产品名称	金华乐昌含笑行道树供应咨询 乐昌含笑养护指导
公司名称	金华市金东区千喜苗木场
价格	.00/棵
规格参数	厂家:千喜苗木 直径:8-30公分 高度:400-1000cm
公司地址	金华市金东区千喜苗木场
联系电话	13506585554

## 产品详情

金华乐昌含笑行道树价格的咨询 乐昌含笑养护指导.

### 乐昌含笑简介

乐昌含笑，又名南方白兰花、广东含笑、景烈白兰、景烈含笑。1929年英国植物学家恩\*\*\*在乐昌市两江镇上茶坪村发现，并因此而得名。乐昌含笑是的以地方名称命名的一种植物。

乐昌含笑，木兰科，常绿乔木，喜欢温暖湿润的气候，生长适宜温度为15-32℃，能耐41℃的高温，也能耐寒，树干挺拔，树荫浓郁，花香醉人，可孤植或丛植于园林中，亦可作行道树。

原产于中国江西、湖南、广东、广西、贵州等地。越南也有。

乔木，高15-30米，胸径1米，树皮灰色至深褐色；小枝或嫩时节上被灰色微柔毛。

叶薄革质，倒卵形，狭倒卵形或长圆状倒卵形，长6.5-15（16）厘米，宽3.5-6.5（7）厘米，先端骤狭短渐尖，或短渐尖，尖头钝，基部楔形或阔楔形，上面深绿色，有光泽，侧脉每边9-12（15）条，网脉\*\*\*疏；叶柄长1.5-2.5厘米，有明显托叶痕，上面具张开的沟，嫩时被微柔毛，后脱落。

花梗长4-10毫米，被平伏灰色微柔毛，具2-5苞片脱落痕；花被片淡黄色，6片，芳香，2轮，外轮倒卵状椭圆形，长约3厘米，宽约1.5厘米；内轮较狭；雄蕊长1.7-2厘米，花\*\*\*长1.1-1.5厘米，\*\*\*隔伸长成1毫米的尖头；雌蕊群狭圆柱形，长约1.5厘米，雌蕊群柄长约7毫米，密被银灰色平伏微柔毛；心皮卵圆形，长约2毫米，花柱长约1.5毫米；胚珠约6枚。

聚合果长约10厘米，果梗长约2厘米；蓇葖长圆体形或卵圆形，长1-1.5厘米，宽约1厘米，具短细弯尖头，基部宽；种子红色，卵形或长圆状卵圆形，长约1厘米，宽约6毫米。

花期3-4月，果期8-9月

## 乐昌含笑与深山含笑的区别

乐昌含笑为常绿乔木，高15~30米。树皮灰色至深褐色。叶薄革质，倒卵形或长圆状倒卵形，长6.5~16厘米，宽3.5~7厘米，有光泽。3~4月开花，花淡黄色，具芳香。聚合果长圆形或卵圆形，8~9月果熟。种子卵形或长圆状卵形。

## 乐昌含笑

深山含笑常绿乔木，高20米；全株。树皮浅灰或灰褐色，平滑不裂。芽、幼枝、叶背均被。叶互生，革质，全缘，深绿色，叶背淡绿色，长椭圆形，先端急尖。花单生于枝梢叶腋，花白色，有芳香，直径10~12厘米。聚合果7-15厘米，种子红色。花期2-3月，果期9-10月。其枝叶茂密，冬季不凋，树形美观。

## 乐昌含笑种植

### 一、乐昌含笑的播种

#### 1.种子的准备

乐昌含笑开花期为4月，果熟期从9月下旬至10月上旬，聚合果呈紫红色，长约10cm，种子卵形或长椭圆状卵形，外种皮红色。

采种宜选择20-40年生的健壮母树，采下的聚合果摊在阴凉通风的室内后熟，待果壳自然开裂后取出种子；或把采下的果实放在室外摊晒数天再移放室内，开裂后取出种子。当种子外的红色假种皮后，放在清水中擦洗干净，放在室内摊放数天后用湿沙贮藏。如发现霉烂变质种子，应翻沙，捡去坏种子。乐昌含笑种子的千粒重约104-121g。

#### 3.播种方法

在室内或温暖地区，可于早春2月播种。在室外或寒冷地区，一般在3月土壤解冻后播种。播种前可用40以下温水将种子浸泡12-24h,使其吸足水分,加快种子萌芽速度,并可使出苗整齐。

准备在幼苗期出售种苗或分床移植，可采用撒播法，即在苗床上均匀地进行播种。撒播可以充分利用土地，播种密度大，苗木分布较均匀，单位面积产苗量高。其缺点是幼苗留床\*\*\*短，种植者做好移植准备。如果种植者不准备出售种苗或不准备当年移植，可采取条播法，即在苗床上按距离开沟，将种子均匀撒在沟内。一般条宽5cm，条距25cm，播种沟深1.5-2.0cm，种子播下好覆土1-2cm，并浇透水。苗床上加盖一层稻草以保持苗床湿度，以后根据种子出土的先后采取分次揭草。

## 乐昌含笑生长习\*\*\*

乐昌含笑喜温暖湿润气候，生长适宜温度为15~32℃，能耐41℃得高温，亦能耐寒，1~2年生小苗在-7℃低温下有轻微冻害。喜光，但苗期喜偏阴。喜土壤深厚、疏松、肥沃、排水良好得酸\*\*\*至微碱\*\*\*土壤。能耐地下水位较高得环境，在过于干燥得土壤中生长不良