

## 猕猴桃溃疡病，春季早期预防用药

产品名称	猕猴桃溃疡病，春季早期预防用药
公司名称	潍坊启农生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	规格:500ml
公司地址	山东省潍坊市寒亭区益新街777号庆鹏国际2号楼2006室（注册地址）
联系电话	13356786672

### 产品详情

进入2月份气温逐渐回暖，雨水增多，发现部分果园猕猴桃上了溃疡病，枝干已有流菌脓等发病症状发生。猕猴桃溃疡病是一种腐生性强、又极能耐低温的细菌性病害，近期气温回升较快，气温在0℃以上时，利于溃疡病的发生及蔓延，猕猴桃溃疡病进入高发危害期，对猕猴桃产业带来极大的危害。提醒果农朋友们春节过后一定要重点巡查果园受冻情况，没有上溃疡的及时用药做好预防措施，上了溃疡病的也要及时用药控制病害的蔓延，减轻危害。

#### 1、冻害检查与溃疡病预防，做好树体保护工作

经过两次大降温，部分猕猴桃种植区的冰冻与降雪比以往年份更严重，在冰雪融化后一定要全园巡查，及时检查树体冻伤情况，气温大幅变化树体易发生冻伤，主干受冻后会裂口、炸皮、伤流等，易被病菌侵染引发溃疡病。树皮炸裂、有伤口的，用溃腐灵1-10倍+沃丰素50-100倍+地力旺50-100倍+有机硅3000倍，涂刷主干1-2次，间隔5-7天。刚受冻或要预防冻害的，可用靓果安300倍+沃丰素600倍+红糖150倍全园喷雾。中草药制剂溃腐灵中含有的鱼腥草素可修复冻害后受损的组织细胞、修复冻害产生的裂纹、炸皮等伤口，阻断病原菌的入侵途径，防止病菌侵染。还可以直接杀菌，为树体补充氨基酸、多糖等营

养物质，增强树体抗逆性，扭转树势。

## 2、浇萌动水

浇萌动水，冬春干旱对树体及根系伤害很大，使根系生长不良，导致来年萌芽不整齐和影响开花质量。土壤较干旱时，尤其是针对去年发病较严重、树势较弱的树，在萌芽前用青枯立克150-300倍+地力旺300-500倍+沃丰素600倍灌根。提高树势，增强树体抗逆性。萌动水视土壤墒情决定是否灌溉。

## 3、展叶期喷雾

猕猴桃展叶期用靓果安300倍喷雾2次，其中1次复配沃丰素600倍喷雾，此时病原菌处于从冬季休眠期转向春季繁殖的活跃时期，病原菌数量相对集中且抗病力弱，此时喷雾药液被叶片迅速吸收上下传导，杀死树体内外的病原菌，还可直接补充营养，促使叶片老熟、转绿，提前进行光合作用制造营养物质，提高萌芽质量。

猕猴桃溃疡病防控需要长期防控结合，重在早期预防，决不是见证治病、期望喷几次药就能控制病害扩展。