

# 猕猴桃溃疡病发病后如何用药

产品名称	猕猴桃溃疡病发病后如何用药
公司名称	潍坊依一生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交叉口青辰国际B座811（注册地址）
联系电话	13011675299

## 产品详情

猕猴桃溃疡病是一种细菌性的病害，在春季气温回升，猕猴桃萌芽前树液开始输送时树体极易伤流而引发溃疡，树体养分从伤口大量外流，病原菌得到营养大量繁殖蔓延，树势转弱、加重病情，治疗难度加大。除红阳猕猴桃，其他中华系品种，如黄金果猕猴桃也容易得溃疡，但危害程度较低。

猕猴桃溃疡病一旦爆发，危害急、发病重、传播快，发病时再去治疗用药成本大不说，效果并不一定理想。因此，提前预防是关键。多年来，我们在猕猴桃溃疡病上已经推出“防、控、治、养”的周年立体化防控方案，取得良好成效。其中重要一环“防”就是我们推出的秋季刷干方案，秋季提早预防是最佳的防治时期。秋季刷干可提前愈合伤口，减少来年春季伤流、阻断病原菌的侵染途径，提前杀灭菌原，减少来年溃疡病发病率，同时为树体补充营养，增加其储备养分，提高树体抗逆性，保障树体安全越冬，防止树体受冻来年发生伤流，也有助于来年的开花坐果。

### 一、涂抹或高浓度喷干（控、治）

对伤流溃疡点，用溃腐灵1瓶+地力旺1瓶盖+有机硅2滴原液或者兑水10斤涂抹1-2次。涂抹范围应大于伤流点或手术创面范围若干倍，如果遇到较细的枝干，可按段涂抹；对于已经流红水的枝干，需往近根处延伸涂抹范围。

目的：涂抹杀菌；树皮吸收营养，由内而外愈合。扩大涂抹范围，是因为树皮可将吸收的药液集中起来，既杀菌又促进愈合，二是由于病原菌可随着韧皮向下蔓延，这样就起到控制危害扩散及保树的

作用。

## 二、中药制剂全园喷雾(治)

萌芽前使用溃腐灵30-60倍+沃丰素600倍枝干喷雾；如果萌芽了，可以用溃腐灵150-300倍+沃丰素600倍喷雾2次，间隔7天左右。后期用靓果安300倍+沃丰素600倍+大蒜油1000倍周年喷雾，每次间隔7-10天。

目的：提高叶片的光合作用，创造更多的养分。叶片吸收后，药液能随着输导组织上下传导，杀灭潜藏在韧皮部内的菌源。

## 三、灌根的方法与注意事项（养）

使用《青枯立克》60-300倍液+地力旺300倍液+沃丰素300倍液灌根。灌根区域为在树冠外围半径的1/2处以外，挖出环状沟，深度为20-30cm，以灌透毛细根区为准。