

龙鱼出售公司行业专家在线为您服务

产品名称	龙鱼出售公司行业专家在线为您服务
公司名称	杭州可丽水族用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区凤起路花鸟城东区75-78号
联系电话	13957171595

产品详情

杭州可丽水族用品有限公司十多年来，专注于家居水景以及饭店海鲜池工程的设计、制作与观赏鱼的销售和养护，拥有大型的产品展示店，可以为您提供各种不同款式的成品鱼缸，对有特殊设计要求的还可以量身定制，使鱼缸真正融入您家居的装修风格之中。

维生素对于人类的好处我就不必多说了，不仅如此在观赏鱼的生长健康方面作用也很大。如果观赏鱼缺乏维生素，会导致发育缓慢、免疫力下降等症状，但是有时候我们给鱼类补充了维生素，但是效果不佳，影响维生素吸收的原因是什么呢？

1.鱼类自身影响：不同的鱼类、不同的生活条件、不同的生长阶段对维生素种类和数量的需求不同。而且鱼体内不能合成vc、胆碱、肌醇和烟酸，它们必须从饲料添加，而且添加量较其他维生素的量要大得多。

2.饲料原料的影响：农作物的产地、施肥及收获物均会影响到其含量，从而影响鱼类饲料中添加维生素的量。如饲料中不饱和脂肪酸会增加ve的消耗量。再如某些原料作物含脂肪氧化酶，则会破坏ve、va的活性。

3.加工方法的影响：绝大多数的维生素在加工、贮存过程中，均会受到不同程度的损失。温度、湿度、光照强度、脂肪酶含量、微量元素种类及多寡、ph值高低等因素均可能损害饲料中维生素的活性，使维生素的含量下降。

4.疾病的影响：疾病的发生，将导致鱼体内酶系统活力改变。这就需要维生素的补给量随之发生变化，同时肠道内的寄生虫和细菌往往破坏其正常吸收功能。vc和ve可缩短鱼类治疗时间。

5.维生素之间的影响：添加维生素时要注意它们之间的相互作用，对一些易被破坏的维生素应选用包膜制剂。微量元素的存在是维生素失去稳定性的重要原因，例如fe、cu等微量元素与vd、ve、vb12、vc、va等混合，则会加快这些维生素的破坏。vc不能与其他维生素混合，亦不能与无机盐直接混合。

杭州可丽水族用品有限公司十多年来，专注于家居水景以及饭店海鲜池工程的设计、制作与观赏鱼的销售和养护，拥有大型的产品展示店，可以为您提供各种不同款式的成品鱼缸，对有特殊设计要求的还可以量身定制，使鱼缸真正融入您家居的装修风格之中。

观赏鱼的防病治病工作应坚持“预防为主，治疗为辅，防重于治”的原则。具体应做好以下几点：一是新购进的观赏鱼放养前，应进行鱼体消毒。

常用的消毒方法有：1、用浓度为3%~5%食盐溶液，浸洗观赏鱼5~15分钟，可预防细菌性及寄生虫引起的病。2、用高锰酸钾溶液，浓度为10毫克/升，浸洗5~10分钟。观赏鱼对此药没有异常反应，对鱼体有一定的灭菌作用。二是鱼缸、水族箱等容器要经常刷洗和消毒。一般可用3%~5%食盐或10毫克/升高锰酸钾溶液浸泡1~2天，也可用20毫克/升漂白粉消毒。三是定期进行水体消毒。四是换水、换鱼时要细心操作，避免鱼体受伤。五是要保证饲料质量，饲料要新鲜、清洁、适口、发霉变质的饲料不能投喂。

杭州可丽水族用品有限公司十多年来，专注于家居水景以及饭店海鲜池工程的设计、制作与观赏鱼的销售和养护，拥有大型的产品展示店，可以为您提供各种不同款式的成品鱼缸，对有特殊设计要求的还可以量身定制，使鱼缸真正融入您家居的装修风格之中。

热带鱼虽然种类繁多，习性差异较大，但它们的食性却可以大致分为三大类：肉食性鱼类，这类鱼占热带鱼的绝大部分；杂食性鱼类，这类鱼占热带鱼的一小部分；素食性鱼类，这类鱼占热带鱼的极少部分。下面主要将动物性鱼食作以介绍。

水蚤（又称红蜘蛛虫）

水蚤这种鱼虫颜色艳红，个头适中，在水中群集，跳动速度较慢，最适合热带鱼的口味。这种鱼虫含有较丰富的蛋白质、脂肪和钙质。这种鱼虫分布较广，几乎所有适合它们生长的淡水水域都有它们的足迹，是公认的最好的热带鱼饵料。这种鱼虫的缺点是：放在容器里时生命较短，尤其是夏季，它们只能活一至二天。所以在喂鱼前，一定要将它们冲洗干净，然后捞取活的喂鱼。

仓虫

这种鱼虫个体较大，皮较厚，蛋白质含量略低于水蚤，营养也比较丰富，适合于喂养成年热带鱼。这种鱼虫在捕捞时死亡较多，喂时更要注意冲洗和筛选。

剑水蚤（又称青蹦）

这种鱼虫个体较小，营养价值较低，容易死亡，它们在水中一蹦一停，速度较快，有些行动迟缓的热带鱼，尤其是幼鱼，往往追不上它们。所以这是一种较差的饵料。

红线虫

红线虫这种鱼虫身体细长，颜色暗红，生活在水质较脏的水泡、水沟边缘的浅水中，它们的身体一半在淤泥里，一半在水中不停地摆动。红线虫营养丰富，含有较多蛋白质和脂肪，是成年鱼较理想的食物，尤其是北方的冬季，捞不到其它活饵时，红线虫是唯一的新鲜饵料。这种鱼虫在喂鱼时一定要将它们散开，以免它们聚成球，影响鱼的摄食。这种鱼虫存放时，要放在底部平坦的容器里，其厚度不要超过一厘，要留少量的水，水位不要高于鱼虫的原度，要将容器置于阴凉处，并每天换二次水。这种鱼虫冬季

可在容器中活一个月。除红线虫以外，其它鱼虫在自然水域中都有其一定的活动规律，如傍晚和黎明时，鱼虫大都浮在水表层，这是捞取鱼虫的最1好时刻，但因天气变化，如刮风、下雨、阴天等，也会影响鱼虫沉浮，所以捞取鱼虫时，要细心观察，龙鱼出售公司，逐步掌握其活动规律，只有这样，才能收到较好的效果。

“洄水”

所谓“洄水”主要是指草履虫、轮虫。它们在大多数淡水水域里都可以看到，由于它们在水中呈白色云雾状，并且不断洄荡，所以称为“洄水”。捞取“洄水”必须用较细密的布做网，最1好用240目的尼龙过滤网制做。有时捞取“洄水”时会带进一些个体较大的鱼中心，应用网眼大一些的网将这些大鱼虫滤出后，再用“洄水”喂幼鱼，以免发生意外。许多热带鱼爱好者在繁殖卵生热带鱼时往往因为捞不到“洄水”，而发生幼鱼大量死亡现观赏鱼象。下面将人工养殖“洄水”（草履虫）的方法介绍一下：

人工养殖“洄水”的方法比较简单，将稻草用水煮沸，再添一些自来水，使稻草和水的比例达到1：100，将水温控制在20摄氏度以上，或者放在阳光下照射，十天以后，草履虫就会在水中大量的繁殖出来了。这时应及时捞取，每天捞取三分之一左右，并不断的生成，如此循环，便可用之不竭了。但是这种工人培养的“洄水”营养不够丰富，一般不宜长期使用。

龙鱼出售公司行业专家在线为您服务由杭州可丽水族用品有限公司提供。龙鱼出售公司行业专家在线为您服务是杭州可丽水族用品有限公司（www.hzklsz.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。