

开封树状月季 3公分树状月季批发 朋祥月季

产品名称	开封树状月季 3公分树状月季批发 朋祥月季
公司名称	南阳市朋祥月季种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西
联系电话	18637789888

产品详情

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，3公分树状月季种植，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

迟熟月季雨期的处理技术

防止裂花。

月季裂花与品种特性、处理水平、气候条件等有很大联系。其间白皮糯米糍裂花最严峻，树状月季其次为其他类型糯米糍。一般大核类品种裂花较少。但由于土壤、处理水平和气候变化，裂花越来越严峻。调查发现经常用有机肥改土的花园，肥水供应正常的花园，裂花较少。反之裂花较重。在花朵初步上色进入膨大期，遇上多雨气候，裂花也严峻。所以，旱季花园要做好排水作业，及时摇树，减少花穗上的水分。晴天后进行环割，树状月季品种，喷1-2次控梢灵，克制花肉胀大速度。及时去除裂花，防止诱发其他花朵开裂。已开裂的花朵，就像失掉操控的水管，体内的水不断通过创伤向外排放，会诱发同穗的花继续开裂。

迟花的花可喷1-2次农用核苷酸

增加花皮厚度及韧度，可减少裂花。晴天后，气温骤升，花皮失水较快，花园小气候湿度下降，可在迟早向结花树喷清水，确保供水均匀，也可减少裂花。

喷药防治月季蒂蛀虫。

能依照前期预测预告喷药的花园，基本上能操控月季蒂蛀虫的为害。但没有及时喷药的花园在现在多雨的情况下很难喷药防治。由此可见，前期的防治作业十分重要。跟着花朵老练，花皮抗病才干下降，在高温高湿的气候下月季病害容易发生。所以晴天后要喷药防治月季蒂蛀虫、月季霜疫霉病、月季炭疽病等。

没有结花的花园，可施适量的复合肥，晴天后进行修剪，培养强健的秋梢，为下一年的结花做准备。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

病虫害防治

刺蛾：主要为黄刺蛾、褐边绿刺蛾、丽褐刺蛾、桑褐刺蛾、扁刺蛾的幼虫，于高温季节大量啃食叶片。防治方法：一旦发现，应立即用90%的敌百虫晶体800倍液喷杀，或用2.5%的杀灭菊酯乳油1500喷。

介壳虫：主要有白轮蚧、日本龟蜡蚧、红蜡蚧、褐软蜡蚧、吹绵蚧、糠片盾蚧、蛇眼蚧等，其危害特点是刺吸月季嫩茎、幼叶的汁液，导致植株生长不良，主要是高温高湿、通风不良、光线欠佳所诱发。防治方法：可于其若虫孵化盛期，开封树状月季，用25%的扑虱灵可湿性粉剂2000倍液喷杀。

蚜虫：主要为月季管蚜、桃蚜等，它们刺吸植株幼嫩器官的汁液，为害嫩茎、幼叶、花蕾等，严重影响植株的生长和开花。防治方法：及时用10%的吡虫啉可湿性能粉剂2000倍液喷杀。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，3公分树状月季批发，均可电话咨询！

玫瑰与现代月季有别

每年的2月14日情人节，有情人都会通过互送礼物来表达爱意，而一束鲜花则是他们的。今年的情人节过后，报纸报道了这样一则新闻：“今天是情人节，街头出现了很多手捧鲜花推销的商贩。记者在跟随城管队员查抄无照花贩时得知，他们贩卖的‘玫瑰’其实都是和玫瑰酷似的现代月季。”看了这则新闻，人们不禁会问：玫瑰和月季到底有哪些相同点与区别呢？下面我们就简要介绍如下。

玫瑰和月季都是蔷薇属落叶灌木。

玫瑰茎干具有绒毛，小叶5-9片，椭圆形，有边刺，叶脉下陷，有褶皱。花瓣倒卵形，重瓣至半重瓣，花有紫红色、白色，芳香。花期5-6月，果期8-9月，扁球形。玫瑰原产于我国北方。玫瑰作为农作物时，其花朵主要用于食品及提炼香精玫瑰油，玫瑰油应用于化妆品、食品、精细化工等工业。

月季又称月月红，茎干较玫瑰低矮，茎干常具有钩刺。小叶一般为3-5片，叶片平展光滑。花重瓣或半重瓣，有红色、粉红或白色，常见复色花，微有香气，倒卵形下端有凹缺。花期5-9月。可四季开花（北方冬季在暖地或温室内）。其分布在我国华北、湖南、湖北、云南、贵州、四川等省。在南方园林中常见，北方主要是盆栽观赏。

玫瑰叶面脉纹下陷的形态特性是与月季的明显区别。

所谓现代月季就是蔷薇属内不同种间经过园艺家杂交选育的栽培品种的总称，它们花色艳丽，有红色、粉色、黄色、白色单色或复色等，花期长，是园林布置的好材料。宜作花坛、花境及基础栽植用，在草坪、庭院、假山等处配植也很合适，又可作盆栽及切花用。目前社会上常用“玫瑰”来称呼现代月季是不对的。

不过在英语中它们均可以统称为Rose。

由此看来，玫瑰、月季（月月红）和现代月季都是同属植物，从用途上说，玫瑰主要用于生产玫瑰花，用于提取玫瑰精油，不能用作切花。切花月季是现代月季中的重要部分，在世界四大鲜切花（月季、菊花、康乃馨、唐菖蒲）中排在首位，占世界切花市场份额约为33%。我们通常在花篮、花束中看到的就是现代月季，当然情人节“玫瑰”也不例外。

开封树状月季-3公分树状月季批发-朋祥月季(推荐商家)由南阳市朋祥月季种植有限公司提供。开封树状月季-3公分树状月季批发-朋祥月季(推荐商家)是南阳市朋祥月季种植有限公司（www.pxyueji.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。