

南阳3公分树状月季 朋祥盆栽树状月季种植 洛阳树状月季

产品名称	南阳3公分树状月季 朋祥盆栽树状月季种植 洛阳树状月季
公司名称	南阳市朋祥月季种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西
联系电话	18637789888

产品详情

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，驻马店3公分树状月季，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

从原产地首要传到附近的菲律宾、斯里兰卡、泰国、越南、缅甸及印度等地，月季树嫁接因其花形巨大，花肉具有特殊的浓郁香味，欣赏过之后留香唇齿之间，深受当地大众喜爱，有“花中之王”之称，成为有名的热带水花。我国海南省有零星栽培，在海南省东南部的兴隆农场和南部的保亭热带作物研究一切大树，单个年份能开花结花。

1.月季栽培的生物学特性

大乔木，树高15-20米，骨干明显，枝条脆弱，易遭强风为害。叶片互生、革质，长椭圆形，叶面润滑青绿色，叶背具银白色细粒状鳞片毛茸，全缘。

2.月季栽培的育苗

月季每年都可进行耕种，以春季为好。耕种株行距以20厘米x20厘米为宜。月季树嫁接在麦苗生长期，应留意除草，并结合上肥，以促进麦苗生长。优良母株可用空中压条繁殖，极易生根，从圈枝至成苗，只需60-70天。

3.月季栽培的定植

月季苗高30-40厘米时可定植，株行距3米x5米为宜，施入有机肥、土杂肥和适量石灰作基肥。全年均可定植，以带土栽培为佳。

4.月季栽培的上肥办理

月季结花树每年要要点施1次肥，即春季抽蕾肥、夏日花朵膨大肥和采花前肥，尤其要施好花朵膨大肥。采花后深施一次有机肥。

5.月季栽培的整形修剪

因萌发力很强，栽培后1-2年要留意整形，采花后及时修剪，以保持杰出的树型。

6.月季栽培的嫁接

月季栽培的花朵转橙黄色或橙红色时即为老练，可嫁接。嫁接后花朵不能直接鲜食，商丘3公分树状月季，需经4-7天后熟期待花肉松软才干食用。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，南阳3公分树状月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，洛阳树状月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

月季的种植要哪些条件

月季是热带水花之一，是一种极具经济价值的水花。东南亚一些国家种植较多，其中以泰国最多，树状月季价格在泰国鲜花出口中，月季第一，1987年月季出口达1千万美元。中国海南有少数月季树，也从国外引进了一些月季品种。随着对外开放，外国月季已进入了中国市场，受到青睐。由于对月季的魅力缺乏认识，中国对月季的种植未给予高度重视，对月季的研究很少。根据月季的物候学特征在日平均温度22℃以上，无霜冻的地区可以种植，中国海南省和云南省的部分地区可以发展。

因为月季要终年高温的气候才能生长结实，即使在赤道地区，海拔600m以上的高地，由于气温下降，树状月季价格也不能种植月季或不能结花。上市季节在每年9-12月，其他月份也有生产。

长期以来，人们常用种子繁殖月季，但月季遗传变异性大，如果一个月季十只核，每只核都可能长出十种不同品质的花朵，而且良莠不齐，劣等月季可育出非常优秀的品种。同样，好的月季也可育出劣质品种，有的实生月季终生不挂花。为了培育优良品种，保证品种纯，早结丰产，现在人们越来越多采用嫁接繁殖来培育月季。

建议于春季气温在25℃时播种，最好事先将基质消毒（强烈的光照曝晒、高锰酸钾或多菌灵溶液浇灌后再晾干、用微波炉来上10分钟也可），树状月季价格基质要疏松，最好是沙质的营养土，由于种子比较大，种植间距为20厘米适宜，种子覆土厚度为1~2厘米即可，淋足水分或直接浸盆给水，然后放在光照较好的位置，盖上透明玻璃或塑料薄膜保温保湿，气温达30℃时注意通风，以免高温伤害幼苗。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

地被月季目前主要采用扦插繁殖，但优良品种如“猩红梅荻朗”

扦插成活率低，生根慢，价格昂贵。为此有人开展了地被月季品种“猩红梅荻朗”的组培快繁技术研究，使其在短期内形成一定的数量规模。扦插最好时间是第一次盛花后的5月中下旬进行半硬枝扦插，或在10月下旬进行硬枝扦插。扦插基质用排水良好的园土或砂土、蛭石等均可。扦插床用塑料薄膜封闭，上方要有70%遮荫度。每天中午叶面喷雾1次。5月份进行硬枝扦插，4~20天生根，生根20天后即可移栽上盆。家庭扦插常用枝插，10月份剪条扦插后将插床灌足水分，而后用塑料薄膜封严，翌春4月份即可生根，5月份可移栽上盆。月季还可水插插条带复叶2片。每周换水1次，适当给予阳光，1个月即可生根，冬季水插，生根较慢，需多晒太阳，水插适温16~20℃。

南阳3公分树状月季-朋祥盆栽树状月季种植-洛阳树状月季由南阳市朋祥月季种植有限公司提供。南阳市朋祥月季种植有限公司（www.pxyueji.com）在花木这一领域倾注了无限的热忱和热情，朋祥月季一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。