

# 泰安泰丰源农场 吉塞拉樱桃种植基地 潍坊吉塞拉樱桃

产品名称	泰安泰丰源农场 吉塞拉樱桃种植基地 潍坊吉塞拉樱桃
公司名称	泰安市岱岳区夏张镇泰丰源家庭农场
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区夏张镇
联系电话	13953800688

## 产品详情

### 摘叶着色始期吉塞拉樱桃

喷丰收王多元复合微肥等，可显著叶片质量、叶绿素含量，叶片厚度，光合速率，促进果实和着色。

5. 摘叶着色始期，摘去影响果实光照的几片叶子，但要防止摘叶，也可将遮挡果实的叶片，用绳子一簇簇地绑起来，待果实采收后，再将绳子松开。这样既可以促进果实着色，又可避免摘叶带来的弊病。

6. 铺反光膜于果实着色期在树冠下铺反光膜，吉塞拉樱桃种植基地，可促进树冠中下部果实着色，果实含糖量。果实采收后，撤去反光膜，收藏起来来年再用。

7. 促花措施花后30天左右（约5月下旬），对侧芽发出的枝及徒长枝摘心，可促进花芽形成。果实采收后，对幼旺树喷1~2次15%多效唑可湿性300倍液，可控制旺长，促进花芽形成。

8. 应用抽枝素，吉塞拉樱桃苗价格，为解决大樱桃幼旺树成枝力弱的问题。在新梢生长季节，可对旺长的新梢，在需要长分枝的部位的芽子上涂抹抽枝素，促进分枝形成。加速成形。

### 吉塞拉生长发育中嫁接

在樱桃的发展品种中，有样品种很受大家的欢迎和喜爱，那就是吉塞拉，他虽然是在德国引进的，但是引进的吉塞拉小苗经过砧木的助力，能够很好的在我们国土中生存发展，创造出更多的效益。

重要的是吉塞拉的适应能力极强，能够很好的发挥其作用，将能够创造高产、高质量产品的能力发挥到极致，创造出更多的效益。

吉塞拉樱桃我们需要注意哪些？

温度愈伤组织生长的最适温度为20-25℃。接口湿度保持较高的湿度有利于愈伤组织的生长。一般用塑料袋和蜡封的方法保持接穗和砧木的湿度。光照光线对愈伤组织有明显的抑制作用，潍坊吉塞拉樱桃，在黑暗条件下愈伤组织才会生长良好，因此嫁接后要遮光。一般用栽培土或不透光的材料包裹，创造黑暗条件。砧穗质量一般选择木质化好的枝条作砧木，不选择成长枝，因成长枝容易失水。砧穗的生活习性砧木和接穗的生活习性要相宜，一般砧木发芽的成活率高，接穗先发芽的成活率低，因接穗先发芽时容易失水死亡。嫁接时期嫁接与气温、土温、砧穗的活跃状态有密切关系。砧穗都处于旺盛生长期时，嫁接成活率高。因此要根据花种特性，吉塞拉樱桃哪家好，选于适宜的嫁接时期。接口质量要求切削速度快而熟练，接口切削平滑。

想必大家应该都很熟悉在吉塞拉秋收以后需要注意的哪些事项：采后及时追肥：樱桃采摘完以后应马上追肥，这样可以及时补充树体生长结果所消耗的大量养分，满足花芽形成和后期各生长阶段对养分的需求，常用的方法是沟施人粪尿，撒施复合肥与叶面喷肥相结合。对盛果期大树，树盘内开放射沟株施约30-50千克的人粪尿，用土覆盖，在树盘内再均匀撒施尿素和过磷酸钙各0.5-1千克，浅锄树盘后立即浇水。

叶面喷肥可以使养分更快达到所需各部。整个生长季要多次喷肥以满足树体的生长需求。樱桃采收后应结合病虫害防治，首先喷施1次0.3%的尿素，20天左右可视树势再喷1次，后期叶面喷肥应以P、K肥为主，可在7、8、9月各喷1次0.3%的磷酸二氢钾，以延长叶片寿命，增加树体养分。

泰安泰丰源农场(图)-吉塞拉樱桃种植基地-潍坊吉塞拉樱桃由泰安市岱岳区夏张镇泰丰源家庭农场提供。泰安市岱岳区夏张镇泰丰源家庭农场 ([www.fszmjd.com/](http://www.fszmjd.com/)) 实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的花木等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领泰安泰丰源农场和您携手步入辉煌，共创美好未来！