

# 重庆收购玉米 汉川沔汉湖四叉水产 大量收购玉米地方

产品名称	重庆收购玉米 汉川沔汉湖四叉水产 大量收购玉米地方
公司名称	汉川市沔汉湖四叉水产养殖专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市分水镇经济开发区
联系电话	15797209532

## 产品详情

### 菜用玉米药害的防治方法

症状：使用农药或除草剂，超过一定浓度，能形成颜色不正常的叶斑，如白斑或褐斑，幼芽及根卷曲或变粗，植株生长受抑，苞叶缩短或穗粒外露;播种时化肥使用过量或杀虫剂施用过多，会一直种子发芽或出土后死亡，残存苗矮化，叶片变黄或枯死。

病因：敌敌畏、敌百虫、辛硫磷、2.4—D及化肥等施用过量，均有可能产生上述症状，过多的可溶性氮、钾等肥料接近种子时，会抑制种子发芽或致幼苗出土后死亡;施用或漂移过来的2.4—D。可使叶片卷曲成洋葱叶，下部茎叶丛生在一起，气生根上卷不与土壤接触;施用辛硫磷过量可使叶片局部或大部变白，致叶片干枯似冻害状。辛硫磷等有机磷农药产生变色等药害的机制是疏水性强的有机磷农药被绿叶体或周围组织吸附，致叶绿体的机能发生紊乱，从而阻碍电子传导反应，即希尔反应，抑制光合成，出现变色，药害越严重，其体内的碳水化合物含量减少，全氮量相对增加。生产上因玉米品种、发育阶段、环境因子等条件不同。药害程度不同，会造成叶部枯死、变色、畸形等。

防治方法：(1)采用配方施肥技术，适时适量施用，不宜过量。(2)使用除草剂时严格选择品种和掌握用量，大量收购玉米地方，避免浓度过高，不宜在喇叭口期直接喷洒。(3)在玉米田不要用敌百虫、敌畏等敏感杀虫剂，施用辛硫磷防治地下害虫时严格掌握用量。(4)发现浓度过高应马上浇水。(5)发生药害后，要加强管理。(6)必要时喷洒促丰宝I型活性液肥400~500倍。

### 玉米倒伏后的管理措施

#### (一)大喇叭口期以前倒伏

由于玉米植株自身具有恢复直立的能力，大喇叭口期以前发生倒伏的玉米植株，可以恢复直立，不影响玉米生育后期的正常授粉，因此不需要人工扶起。

## (二)玉米抽雄授粉前后的倒伏

玉米抽雄授粉前后植株已经很高大，如果发生倒伏，植株间相互叠压，很难恢复直立，既直接影响正常授粉，还影响到光合作用的进行。这一时期发生倒伏的玉米田，要根据玉米植株倒伏的具体情况，采取相应的补救措施。一是发生根倒的地块，在倒伏后要尽早、尽快进行人工扶起玉米植株，扶起时要早、慢、轻，并且要进行培土，固牢玉米根系;二是发生茎折的地块，要将倒折植株割除用作青饲料。

## (三)注意病虫害发生

由于植株重叠，田间湿度增大，有利于穗腐病的发生。要根据天气情况和病害发生蔓延状况，在果穗可以在采收后，尽快采收和脱皮晾晒，避免加重穗腐病及虫、鼠害，造成更大的损失。

## 春季玉米综合栽培技术

规范糯栽，合理种植。玉米种植制度有净种，套种间作。净种玉米厢宽120cm，厢中间糯栽两行玉米，行距40cm，株距25cm，每亩4400株;与小麦油菜套种，厢宽170cm，重庆收购玉米，在预留行中间条播(栽)两行玉米，行距40cm，株距20-23cm，每亩3500株;与棉花间作，在厢边种植一行，长期收购玉米，每亩种植1200株左右。平原丘陵地区，3月中旬播种育苗，4月初移栽;地膜覆盖3月下旬播种，哪里收购玉米，山区4月中旬覆膜;科学种田水平高的地区，推广营养钵育苗，3叶期移栽大田，再覆盖地膜。

重庆收购玉米-汉川沔汉湖四叉水产-大量收购玉米地方由汉川市沔汉湖四叉水产养殖专业合作社提供。重庆收购玉米-汉川沔汉湖四叉水产-大量收购玉米地方是汉川市沔汉湖四叉水产养殖专业合作社（[dchyz123.tz1288.com](http://dchyz123.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。