

幼鸽批发价格 湖北幼鸽 静海区冠鸿肉鸽养殖场

产品名称	幼鸽批发价格 湖北幼鸽 静海区冠鸿肉鸽养殖场
公司名称	天津市静海区冠鸿肉鸽养殖场
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇大郝庄村口南200米
联系电话	15620202278

产品详情

天津冠鸿肉鸽养殖基地创建于2015年，位于天津市静海县，注册资金200万元，现存栏6千对。通过持续的技术创新，自主选育了“冠鸿肉鸽”系列高产品系，幼鸽养殖场，实现了喂养自动化和管理程序规范化。优良品种加先进技术，掌合肉鸽赢得了养鸽户由衷信赖，每年繁育推广高产肉鸽良种15万多羽，引种客户遍及全国。是国内肉鸽良种繁育推广大型企业。

鸽子的羽毛有保护机体、保温和飞翔等生理功能，特别是信鸽飞翔离不开羽毛的作用。羽毛是鸽子飞翔所必须具备，具有飞翔时产生动力，调节飞翔方向的作用。有人把信鸽形象的比喻成一架飞机，鸽子翅膀就是提供动力的发动机，翅膀上的羽毛相当于发动机的螺旋桨，通过翅膀带动羽毛产生动力。同时通过尾部、翅膀的羽毛调节飞行方向。有的鸽友发现鸽子有不明原因的脱羽现象发生，特别是每年的5-6月特别多见。本文通过对发生脱羽的各种原因加以阐述，进一步提出具体防治方法。一、病因

1. 真菌性本病是由多种皮肤真菌引发，也称为“皮肤霉菌病”。引起鸽子发生脱毛的真菌病原是鸡小孢子菌即鸡毛癣菌，也是一种霉菌。本病主要发生于鸡，也可引起金丝雀、鸭、鸽和火鸡冠癣。发病初期在野鸟、鸽和火鸡的冠部、肉髯、翅下等没有毛处产生小的针尖大小的灰白色小结节，以后逐渐扩大至小米粒大，以致在冠部、肉髯、翅下、形成石棉状白膜。使羽毛脱落，皮肤增厚产生痂癣。有时可见皮肤有很少的缺毛处，皮肤成灰白色。霉菌孢子通过损伤的皮肤，在皮肤角质层内发芽，长出菌丝，蔓延深入毛囊。由于霉菌能够溶解和消化角蛋白，进入毛根后，随毛发向外生长，受害毛发长出毛囊后容易（受力过大、啄啄）折断，使毛发大量脱落形成没有毛斑。由于炎症反应，导致皮肤有痒感，鸽子时常啄羽，可引起羽毛大片脱落。脱落的皮屑及羽毛污染用具可引起进一步传播。本菌可以依附于动植物体上，也可存在于环境土壤中，主要通过损伤的皮肤。一般在高温、高湿季节利于传播。

2. 螨病（脱羽螨）本病是由螨虫寄生于鸽子皮肤内引起的慢性的病，传播途径以接触方式为主，可以引起鸽子发生剧烈的痒感并且产生皮肤红为特征。螨虫钻进鸽子表皮挖掘隧道，虫体在隧道内进行发育与繁殖。在隧道中有小孔与外界相通，可以通风换气也是幼虫进出的孔道。雌虫在隧道内产卵孵化成幼虫。幼虫爬到皮肤表面蜕化为若虫，若虫再钻入皮肤变为成虫。引起鸽子发生脱羽的病原是脱羽螨。脱羽螨可以在鸽子皮肤表皮层的羽毛基部掘洞，刺激皮肤发痒，引起发红现象；皮肤发红，羽毛变脆容易脱落。由于强烈的刺激迫使鸽子啄羽，有时可见皮肤有一块缺毛。由于强烈刺激，导致鸽子不能安心饮

水、采食量减少，表现消瘦。诊断方法：刮取皮肤皮屑置于载玻片上，显微镜下观察有螨虫虫体或虫卵存在。应选择患病皮肤与健康皮肤交界处，此处螨虫较多。刮取皮肤时，应刮到轻微出血。可以将检验样品放在黑色背景面上观察，也可再稍微加温 40-50 摄氏度条件下观察。防治方法：加强饲养管理，加强环境消毒。皮肤发现伤口后，脱毛处可以涂抹硫磺软膏，鸽子可以口服或注射伊维菌素或阿维菌素。必须经过多次用药，并且每次需间隔 7-10 天。

3. 羽虱（鸽长羽虱）本病是由昆虫纲、虱目、食毛亚目的羽虱寄生于鸽子引起的疾病，传播途径以接触方式为主，它可寄生在鸽子的羽毛上，故又称为羽虱。但羽虱是不吸血，羽虱是吃鸽子身上的羽毛，羽粉，浮皮，皮屑，皮肤之细胞碎片等为生。羽虱会在鸽子羽毛间乱动，使鸽子不能睡觉，心情不好、食欲下降、羽毛快速掉落、羽毛成长不良。由于羽虱刺激皮肤产生痒感，幼鸽批发价格，鸽子常常啄羽，同时由于羽虱啮食羽毛、皮屑；羽毛常常被咬断。皮肤无羽处常常有断根。羽毛数量减少、稀薄。鸽子的皮肤、羽毛上常常可以发现淡褐色的虱子；虱卵成堆附在羽毛上。诊断方法：肉眼或借助显微镜、放大镜即可发现虫卵或虱子成虫。防治方法：可以用硫磺药浴。鸽子可以口服或注射伊维菌素或阿维菌素。必须经过多次用药，并且每次需间隔 7-10 天。同时加强鸽舍等环境消毒。有条件的可以采用火焰消毒。真菌病、螨病、羽虱三种疾病的鉴别诊断方法：真菌引起的脱羽，病灶处皮肤有霉菌生长往往可以观察到白膜；螨病鸽子表现出特别不安，痒感强烈，羽毛往往整根拔下。羽虱的鸽子皮肤无羽处常常有断根。确诊可以用显微镜或放大镜寻找病原或虫

天津冠鸿肉鸽养殖基地创建于 2015 年，湖北幼鸽，位于天津市静海县，注册资金 200 万元，现存栏 6 千对。通过持续的技术创新，自主选育了“冠鸿肉鸽”系列高产品系，实现了喂养自动化和管理程序规范化。优良品种加先进技术，掌合肉鸽赢得了养鸽户由衷信赖，每年繁育推广高产肉鸽良种 15 万多羽，引种客户遍及全国。是国内肉鸽良种繁育推广大型企业。

将同一个生长阶段的肉鸽集中在一起，采用“统一饲养”的方法，不仅方便管理、降低成本，而且育肥也快速，现将肉鸽统一饲养育肥方法介绍如下：

（1）同步配对。将适龄的公、母鸽同时配对后（8 天后一同产蛋），统一喂养。这样既有利于饲养管理，又可提高饲养效益和乳鸽的产出率。

（2）统一孵化、饲养。将同期产下的鸽蛋编号入册，然后放入孵化器孵化，鸽蛋放在蛋盘内钝端朝上，温度维持在 35 ~ 38 左右，相对湿度为 61%。每天翻蛋 5 ~ 6 次，入孵 4 ~ 5 天时照蛋，将弱精蛋剔去。17 ~ 28 天即可孵出乳鸽，然后将乳鸽放到育雏室人工哺育。育雏室要注意清洁、消毒，并安装育雏架，架上放育雏盘，盘内垫铺 2 ~ 3 厘米的麦草，每盘育两只乳鸽。

（3）乳鸽的喂饲。1 ~ 5 日龄的乳鸽用脱脂奶粉 40% ~ 45%、雏鸡饲料 55% ~ 60%，再加入禽用矿物质添加剂、维生素添加剂药，加 5 倍水调成乳浆状，然后用投饲器注入鸽的嗉囊内，每天 4 ~ 5 次，每日饲喂量为 5 ~ 7 毫升，2 日龄后逐日增加喂量；6 ~ 9 日龄，用脱脂奶粉 25%、雏鸽饲料 75%，其它添加物按比例添加，拌匀后加 6 倍水调成乳浆状即可；10 日龄开始，饲粮组成中脱脂奶粉减到 3% ~ 5%，每天饲喂 3 次。

（4）注意调节饲养温度。育雏室的温度，1 日龄为 35，以后每天降低 0.5，直到降到 25 为止。经 18 ~ 21 天的哺育即可出售。

天津冠鸿肉鸽养殖基地创建于2015年，位于天津市静海县，注册资金200万元，现存栏6千对。通过持续的技术创新，自主选育了“冠鸿肉鸽”系列高产品系，实现了喂养自动化和管理程序规范化。优良品种加先进技术，掌合肉鸽赢得了养鸽户由衷信赖，每年繁育推广高产肉鸽良种15万多羽，引种客户遍及全国。是国内肉鸽良种繁育推广大型企业。

（1）公斤鸽

公斤鸽是我国著名养鸽专家陈文广培育的。该品种产于昆明，含有贺姆等鸽血缘，体重1千克左右，故称公斤鸽，适应性强，抗逆性强，飞行能力强。幼鸽前期生长快，早熟、易肥、省饲料。体型偏长，瓦灰色居多，亦有其他毛色。

（2）石岐鸽

产于我国广东省中山石岐镇。由王鸽、仑替、蒙丹等品种与本地杂交种。体型特征：体长、翼长、尾长，体呈芭蕉蕾，大小与王鸽相似。平头先胫、鼻长喙尖、眼睛细小。繁殖力强，年产乳鸽7~8对，但其蛋壳较薄，孵化时易破。成年公鸽体重750~800克，母鸽650~700克，四周龄乳鸽可达600克。石岐鸽毛色较多，以白色为佳品。

（3）姚安肉鸽

产于云南姚宁，为中小型肉鸽，早熟，适应性强，体重600~750克，饲料报酬高，耐粗饲。

2.国外肉鸽优良品种

（1）王鸽

王鸽原产美国，常见有白王鸽、银王鸽。上海有关科研单位选育出的高产品系--白羽王鸽，是我国生产性很好的肉用种鸽之一。成年公鸽体重750~900克，母鸽体重650~750克。全身羽毛纯白，头部较圆，前额突出，喙细鼻瘤小，胸宽而圆，尾中长微翘。年产卵9~10对，幼鸽批发，育成乳鸽6~8对，4周龄乳鸽平均体重620克。

（2）王鸽K种（美国落地王鸽）

王鸽K种是王鸽的杂交改良品种，羽色众多，生产性能强，周期短，耐粗饲。成年鸽体重500~750克。乳鸽体型小，4周龄体重500克左右。

（3）法国地鸽（蒙丹鸽）

产于法国和意大利，体型大，不善飞，喜行走。年成鸽体重1000克左右，年产乳鸽6~8对，4周龄乳鸽体重可达750克。该鸽大致分为三种：冠型、平头型、爪胫型。

（4）贺姆鸽

原产比利时、英国。美国1920年育成的大贺姆为很好。成年鸽体重可达1000克，4周龄乳鸽体重600克。缺点是产卵窝数少，每年5~6对。纯贺姆鸽体重小于大贺姆，800~900克，年产乳鸽7~8对。

(5) 卡奴鸽(赤鸽)

产于比利时、法国。其特征：胸宽、颈粗、尾翼短、眼小而深陷。体重在700~900克，外观雄伟，站立挺直。繁殖力强，年产乳鸽10对左右。喜集群，适应性差、抗病力差。羽毛以纯红为名贵，纯白、纯黄均为上品。就巢性强，受精孵化率高。

(6) 仑替鸽(鸾鸽)

原产意大利，是肉鸽品种中很大一种，体重可达1200~1500克，4周龄乳鸽可达800克。繁殖力较强，年产卵8~10对，但由于体型大，受精率、孵化率低，作为商品乳鸽生产效益不大，但供育成其他新品种较好。

幼鸽批发价格-湖北幼鸽-静海区冠鸿肉鸽养殖场(查看)由天津市静海区冠鸿肉鸽养殖场提供。幼鸽批发价格-湖北幼鸽-静海区冠鸿肉鸽养殖场(查看)是天津市静海区冠鸿肉鸽养殖场(www.tjghrg.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈经理。