

# 天津白条乳鸽 天津白条乳鸽配送 冠鸿肉鸽

产品名称	天津白条乳鸽 天津白条乳鸽配送 冠鸿肉鸽
公司名称	天津市静海区冠鸿肉鸽养殖场
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇大郝庄村口南200米
联系电话	15620202278

## 产品详情

天津冠鸿肉鸽养殖基地创建于2015年，位于天津市静海县，注册资金200万元，现存栏6千对。通过持续的技术创新，自主选育了“冠鸿肉鸽”系列高产品系，实现了喂养自动化和管理程序规范化。优良品种加先进技术，掌合肉鸽赢得了养鸽户由衷信赖，每年繁育推广高产肉鸽良种15万多羽，引种客户遍及全国。是国内肉鸽良种繁育推广大型企业。

鸽子的羽毛有保护机体、保温和飞翔等生理功能，特别是信鸽飞翔离不开羽毛的作用。羽毛是鸽子飞翔所必须具备，具有飞翔时产生动力，调节飞翔方向的作用。有人把信鸽形象的比喻成一架飞机，鸽子翅膀就是提供动力的发动机，翅膀上的羽毛相当于发动机的螺旋桨，通过翅膀带动羽毛产生动力。同时通过尾部、翅膀的羽毛调节飞行方向。有的鸽友发现鸽子有不明原因的脱羽现象发生，特别是每年的5-6月特别多见。本文通过对发生脱羽的各种原因加以阐述，进一步提出具体防治方法。一、病因

1. 真菌性本病是由多种皮肤真菌引发，也称为“皮肤霉菌病”。引起鸽子发生脱毛的真菌病原是鸡小孢子菌即鸡毛癣菌，也是一种霉菌。本病主要发生于鸡，天津白条乳鸽批发厂家，也可引起金丝雀、鸭、鸽和火鸡冠癣。发病初期在野鸟、鸽和火鸡的冠部、肉髯、翅下等没有毛处产生小的针尖大小的灰白色小结节，天津白条乳鸽厂家，以后逐渐扩大至小米粒大，以致在冠部、肉髯、翅下、形成石棉状白膜。使羽毛脱落，皮肤增厚产生痂癣。有时可见皮肤有很少的缺毛处，皮肤成灰白色。霉菌孢子通过损伤的皮肤，在皮肤角质层内发芽，长出菌丝，蔓延深入毛囊。由于霉菌能够溶解和消化角蛋白，进入毛根后，随毛发向外生长，受害毛发长出毛囊后容易（受力过大、啄啄）折断，使毛发大量脱落形成没有毛斑。由于炎症反应，导致皮肤有痒感，鸽子时常啄羽，可引起羽毛大片脱落。脱落的皮屑及羽毛污染用具可引起进一步传播。本菌可以依附于动植物体上，也可存在于环境土壤中，天津白条乳鸽配送，主要通过损伤的皮肤。一般在高温、高湿季节利于传播。

2. 螨病（脱羽螨）本病是由螨虫寄生于鸽子皮肤内引起的慢性的病，传播途径以接触方式为主，可以引起鸽子发生剧烈的痒感并且产生皮肤红为特征。螨虫钻进鸽子表皮挖掘隧道，虫体在隧道内进行发育与繁殖。在隧道中有小孔与外界相通，可以通风换气也是幼虫进出的孔道。雌虫在隧道内产卵孵化成幼虫。幼虫爬到皮肤表面蜕化为若虫，若虫再钻入皮肤变为成虫。引起鸽子发生脱羽的病原是脱羽螨。脱

羽螨可以在鸽子皮肤表皮层的羽毛基部掘洞，刺激皮肤发痒，引起发红现象；皮肤发红，羽毛变脆容易脱落。由于强烈的刺激迫使鸽子啄羽，有时可见皮肤有一块缺毛。由于强烈刺激，导致鸽子不能安心饮水、采食量减少，表现消瘦。诊断方法：刮取皮肤皮屑置于载玻片上，显微镜下观察有螨虫虫体或虫卵存在。应选择患病皮肤与健康皮肤交界处，此处螨虫较多。刮取皮肤时，应刮到轻微出血。可以将检验样品放在黑色背景面上观察，也可再稍微加温 40 -50 摄氏度条件下观察。防治方法：加强饲养管理，加强环境消毒。皮肤发现伤口后，脱毛处可以涂抹硫磺软膏，鸽子可以口服或注射伊维菌素或阿维菌素。必须经过多次用药，并且每次需间隔 7-10 天。

3 . 羽虱（鸽长羽虱）本病是由昆虫纲、虱目、食毛亚目的羽虱寄生于鸽子引起的疾病，传播途径以接触方式为主，它可寄生在鸽子的羽毛上，故又称为羽虱。但羽虱是不吸血，羽虱是吃鸽子身上的羽毛，羽粉，浮皮，皮屑，皮肤之细胞碎片等为生。羽虱会在鸽子羽毛间乱动，使鸽子不能睡觉，心情不好、食欲下降、羽毛快速掉落、羽毛成长不良。由于羽虱刺激皮肤产生痒感，天津白条乳鸽，鸽子常常啄羽，同时由于羽虱啮食羽毛、皮屑；羽毛常常被咬断。皮肤无羽处常常有断根。羽毛数量减少、稀薄。鸽子的皮肤、羽毛上常常可以发现淡褐色的虱子；虱卵成堆附在羽毛上。诊断方法：肉眼或借助显微镜、放大镜即可发现虫卵或虱子成虫。防治方法：可以用硫磺药浴。鸽子可以口服或注射伊维菌素或阿维菌素。必须经过多次用药，并且每次需间隔 7-10 天。同时加强鸽舍等环境消毒。有条件的可以采用火焰消毒。真菌病、螨病、羽虱三种疾病的鉴别诊断方法：真菌引起的脱羽，病灶处皮肤有霉菌生长往往可以观察到白膜；螨病鸽子表现出特别不安，痒感强烈，羽毛往往整根拔下。羽虱的鸽子皮肤无羽处常常有断根。确诊可以用显微镜或放大镜寻找病原或虫

天津冠鸿肉鸽养殖基地创建于2015年，位于天津市静海县，注册资金200万元，现存栏6千对。通过持续的技术创新，自主选育了“冠鸿肉鸽”系列高产品系，实现了喂养自动化和管理程序规范化。优良品种加先进技术，掌合肉鸽赢得了养鸽户由衷信赖，每年繁育推广高产肉鸽良种15万多羽，引种客户遍及全国。是国内肉鸽良种繁育推广大型企业。

立秋以后，雨水较多，空气潮湿，细菌和昆虫记忆繁殖，对于鸽群生长繁育影响极大。在肉鸽养殖中，秋季阴雨天气时，要特别注意鸽舍环境的卫生情况，稍有不慎就会造成鸽群疾病爆发，严重还将导致死去。天成鸽业公司技术专家分享秋季阴雨天气肉鸽管理措施，希望对广大肉鸽养殖朋友有所帮助。

阴雨天要及时清理肉鸽粪、勤换垫料。保持鸽舍干燥，肉鸽的习性喜干燥，怕潮湿，因此应重视防潮湿。舍内地面撒一层石灰，运动场垫一层干净干燥砂子。常开鸽舍门窗，通风换气，降低舍内湿度。

坚持每天扫栏二次，每周大扫一次，每月用5%的来苏水或10%~20%的石灰乳彻底消毒一次。做到鸽舍内外、饲料、饮水、食槽、饮水器和工具清洁卫生。

强鸽舍通风透气，多雨天气，通过排气扇，将肉鸽舍内的饱和水汽及时排出，鸽舍内要空气清新，加强通风。否则，鸽舍容易滋生细菌或霉菌，鸽子极易染病。

在阴雨天气里要控制肉鸽的饮水量，雨季接连不断的阴雨，肉鸽舍内湿度过大，容易抑制机体的水的代谢。如果湿度过大，会使肉鸽的羽毛污秽，特别是高温时，使肉鸽的蒸发散热受阻，体内积热，产生热射病。低温时空气中水汽容热量及导热性增大，肉鸽失热过多，易受凉甚至冻坏。

天津冠鸿肉鸽养殖基地创建于2015年，位于天津市静海县，注册资金200万元，现存栏6千对。通过持续

的技术创新，自主选育了“冠鸿肉鸽”系列高产品系，实现了喂养自动化和管理程序规范化。优良品种加先进技术，掌合肉鸽赢得了养鸽户由衷信赖，每年繁育推广高产肉鸽良种15万多羽，引种客户遍及全国。是国内肉鸽良种繁育推广大型企业。

有时在肉鸽的养殖中，我们会发现有些鸽子本来长得挺好的，但短短几天就快速地消瘦下去，而引起鸽子消瘦病的原因与养殖环境的卫生差、饲料与饮水受到污染有一定的关系，现将鸽子消瘦病的防治措施介绍如下：

### 一、症状

发病初期，病鸽一般食欲减退，并迅速消瘦。当病情进一步加重时，病鸽呼吸急促、发喘、直至死去。

二、预防 平时要搞好鸽舍的卫生和饲养管理，棚舍要勤打扫，做到定期消毒，保持通风，做好防潮、防寒、防挤等各项工作。同时，还应防止鸽子外出淋雨而可能引起的感冒。另外，在供给鸽子食用的营养土中，应尽量添加一定量的盐以及氟哌酸等药，并保证供给鸽子充足的营养，以利于增强鸽子自身的抗病能力。

三、病因 当鸽子发病时，应立即给病鸽喂服维生素B61片或四环素0.5~1片，一日两次，直至康复为止。此外，采取拔除病鸽尾羽最边缘带白边羽毛的方法，也有较好，左右各拔一根，此法对于初次发生消瘦病的鸽子效果较好。

天津白条乳鸽-天津白条乳鸽配送-冠鸿肉鸽(优质商家)由天津市静海区冠鸿肉鸽养殖场提供。天津市静海区冠鸿肉鸽养殖场(www.tjghrg.com)是从事“肉鸽,乳鸽,速冻乳鸽”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈经理。