优势供应甘蔗地除草剂三氟啶磺隆原料含量高三氟啶磺隆原料批发

产品名称	优势供应甘蔗地除草剂三氟啶磺隆原料含量高三氟啶磺隆原料批发
公司名称	徐州弗莱德化工科技有限公司
价格	2000.00/公斤
规格参数	
公司地址	泉山区迎宾大道世纪服务中心
联系电话	15312683444

产品详情

中文名称: 三氟啶磺隆 中文同义词: 三氟啶磺隆;1-(4,6-二甲氧基嘧啶-2-基)-3-[3-(2,2,2-三氟乙氧基)-2-吡啶磺酰]脲;砜嘧磺隆(玉嘧磺隆);三氟啶磺隆 批发;三氟啶磺隆1 英文名称: 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylsulfonyl]urea 英文同义词: Trifloxysulfuron [iso];n-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinesulfonamide;Trifloxysulfuron;1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylsulfonyl]urea;-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylsulfonyl]urea CAS号: 145099-21-4 分子式: C14H14F3N5O6S 分子量: 437.3510696 EINECS号: 相关类别: 农药;农药原药;农药原料-;农用化学品;- Mol文件: 145099-21-4.mol三氟啶磺隆 性质

熔点 195 ° C

概述 三氟啶磺隆(trifloxysulfuron)是汽巴嘉基公司(现属先正达公司)于2001年开发的新型磺酰脲类除草剂，该药用于防除棉花田和甘蔗田大多数阔叶杂草和部分乔木科杂草，对莎草科杂草和香附子有特效。施药后可被杂草的根、茎、叶吸收，可在植物体内向下和向上传导，植物受害后表现为生长点坏死、叶脉失绿，植物生长受到严重抑制、矮化，最终全株枯死。该药与其他磺酰脲类除草剂具有相同的作用机制，通过抑制植物乙酰乳酸合成酶(ALS)的活性，从而影响支链氨基酸的生物合成而发挥除草效果。三氟啶磺隆2001年进入巴西农药市场，2002年在拉丁美洲、哥伦比亚、澳大利亚登记，2003年在美国、日本登记，2012年先正达公司在美国扩展到草坪上获得登记。2011年销售额达到0.7亿美元。 目前我国棉田使用的防除阔叶类杂草的除草剂主要为二甲戊灵、氟乐灵、扑草净等土壤处理剂。 性质 本品外观为白色结晶。比重(20°C，纯品)1.63g/cm3，熔点：195°C。纯品在熔化后立即开始热分解，蒸气压：(25°C，纯品)<1.3×10-6Pa，溶解度(25°C)水中25.7g/L、丙酮17g/L、甲醇50g/L、甲苯>500g/L、正己烷<1mg/L、辛醇4.4g/L。 安全性 合理使用三氟啶磺隆可以有效解决棉田部分阔叶杂草及莎草科杂草如香附子难以防除的问题，推荐剂量下施用，对棉花相对安全。 注意事项 1.每季作物只能使用1次。2.主要用于甘蔗和棉花除草，如果用于其它作物，请先进行安全性试验。3.在棉花田喷药时，应尽量避开棉花心叶。4.对个别品种的棉花叶片有轻微灼伤，1周后可以迅速恢复，不影响产量。 用途 玉米田内吸性除草剂 用途 棉花和甘蔗田除草剂

图片价格为参考具体以实际为准需电话咨询，最低10公斤起订