

# 河南潢川金边黄杨苗

产品名称	河南潢川金边黄杨苗
公司名称	河南开元园林生态实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南潢川卜塔集镇
联系电话	187-90169666 13723108866

## 产品详情

河南潢川金边黄杨金边黄杨，又名：金边冬青卫矛、正木、大叶黄杨。卫矛科卫矛属植物，冬青卫矛的变种之一。属常绿灌木或小乔木，小枝略为四棱形，枝叶密生，树冠球——单叶对生，倒卵形或椭圆形，边缘具钝齿，表面深绿色，叶缘金黄色，有光泽。聚伞花序腋生，具长梗，花绿白色。蒴果球形，淡红色，假种皮桔红色。金边黄杨是常绿灌木，大叶黄杨的变种之一，特点是叶子边缘为黄色或白色，中间黄绿色带有黄色条纹，新叶黄色，老叶绿色带白边。金边黄杨高达4米以上，冠幅3米。生长速度极快，容易繁殖，适应性也非常强，它是的园林绿化观叶彩色灌木。金边黄杨属常绿灌木或小乔木，老干褐色，略有纵条纹，小枝略为四棱形，枝叶密生，侧枝对生，光滑无毛。树冠球形。单叶对生，倒卵形或椭圆形，长3—5cm，厚革质，边缘具钝齿，羽状网脉明显，表面深绿色，有光泽。小型聚伞花序生于枝梢的叶腋间，具长梗，花绿白色。蒴果球形，内含淡红色种子，花期5—6月，果期9—10月。叶嫩绿洁净，叶有黄、白斑纹，清丽幽雅，是理想的绿篱和盆景材料，适用于门庭和中心花坛布置，也可盆栽观赏。人工栽培时多将株高控制在1m左右，假种皮桔红色。金边黄杨喜欢温暖湿润的环境，对土壤的要求不严，能耐干旱，耐寒性强，栽培简单。金边黄杨的抗污染性也非常好，对二氧化硫有非常强的抗性，是污染严重的工矿区的常绿植物。景观用途主要以观叶为主，养护成本很低，移栽成活率非常高，一般养护得当可达97%的成活率。金边黄杨多为扦插繁殖，扦插后30天即可生根。

河南潢川金边黄杨形态特征：金边黄杨是常绿灌木，大叶黄杨的变种之一，特点是叶子边缘为黄色或白色，中间黄绿色带有黄色条纹，新叶黄色，老叶绿色带白边。金边黄杨高达4米以上，冠幅3米。生长速度极快，容易繁殖，适应性也非常强，它是的园林绿化观叶彩色灌木。灌木，高可达3米；小枝四棱，具细微皱突。叶革质，有光泽，倒卵形或椭圆形，长3-5厘米，宽2-3厘米，先端圆阔或急尖，基部楔形，边缘具有浅细钝齿；叶柄长约1厘米。聚伞花序5-12花，花序梗长2-5厘米，2-3次分枝，分枝及花序梗均扁壮，第三次分枝常与小花梗等长或较短；小花梗长3-5毫米；花白绿色，直径5-7毫米；花瓣近卵圆形，长宽各约2毫米，雄蕊花药长圆状，内向；花丝长2-4毫米；子房每室2胚珠，着生中轴顶部。蒴果近球状，直径约8毫米，淡红色；种子每室1，顶生，椭圆状，长约6毫米，直径约4毫米，假种皮桔红色，全包种子。花期6-7月，果熟期9-10月。金边黄杨属常绿灌木或小乔木，老干褐色，略有纵条纹，小枝略为四棱形，枝叶密生，侧枝对生，光滑无毛。树冠球形。单叶对生，倒卵形或椭圆形，长3—5cm，厚革质，边缘具钝齿，羽状网脉明显，表面深绿色，有光泽。小型聚伞花序生于枝梢的叶腋间，具长梗，花绿白色。蒴果球形，内含淡红色种子，花期5—6月，果期9—10月。叶嫩绿洁净，叶有黄、白斑纹，清丽

幽雅，是理想的绿篱和盆景材料，适用于门庭和中心花坛布置，也可盆栽观赏。人工栽培时多将株高控制在1m左右，假种皮桔红色。

河南潢川金边黄杨分布范围：北亚热带落叶、常绿阔叶混交林区（主要城市：南京、扬州、镇江、南通、常州、无锡、苏州、合肥、芜湖、江阴、蚌埠、安庆、淮南、襄阳、十堰）。中亚热带常绿、落叶阔叶林区（主要城市：武汉、沙市、黄石、宜昌、南昌、景德镇、九江、吉安、井冈山、赣州、上海、长沙、株洲、岳阳、怀化、吉首、常德、湘潭、衡阳、邵阳、桂林、温州、金华、宁波、重庆、成都、都江堰、绵阳、内江、乐山、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、六盘水、安顺、昆明、丽江、大理）。北方部分暖温带城市也有少量种植。河南潢川金边黄杨的园林应用：园林建设中离不开色彩的运用，园林建设中常用红、黄、绿三色灌木来构成色块，以丰富园林的色彩构图。由于红、黄色的植物较少，当前红色小灌木多用红花檵木，紫叶小檠，黄色小灌木多用金叶女贞，绿色小灌木品种则比较丰富，有瓜子黄杨、龟甲冬青等。河南潢川金边黄杨景观应用：观叶植物，叶色光泽，嫩叶鲜绿，其斑叶，尤为美观。而且极耐修剪，为庭院中常见的绿篱树种，可经整形环植门道边或作花坛中心栽植。

河南潢川金边黄杨的栽培技术：常见用扦插进行繁殖：1.

铺好渗水性能好的沙床，提前两天用高锰酸钾或多菌灵消毒沙床。2.

备好酒精，植物生根粉，按说明配好溶液。3.

剪取插穗时不要选太嫩的枝梢，木质化程度高的容易生根出芽。4.

剪枝时留主干剪侧枝，剪后要留出至少一个芽的"根"，以利下次剪用。5.

去掉插条下部叶片，上部留3至4个叶片，插条修好后放入生根水中浸泡。6.

在沙床上用小铲划一条沟，按5至10厘米放入插穗，放好后覆土压紧，行距10至20厘米。7.扦插过程需要保持适当的温湿度，浇水要以温度、湿度为依据，始终保持叶片湿润。不要过量浇水，延长生根时间，苗木生根后可适量减少浇水。8.扦插后一般30天左右会生根，也可适时装钵。装钵营养土可用沙子、土壤和草炭土各占三分之一配制，以利透气，不要装钵太满。