

欧洲红栎形态特征 吉林欧洲红栎 舜枫农林

产品名称	欧洲红栎形态特征 吉林欧洲红栎 舜枫农林
公司名称	日照舜枫农林科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东日照市济南路238号
联系电话	18606330388

产品详情

简单介绍沼生栎的种植方法

沼生栎种子有休眠期，如果不进行层化处理很难发芽。种子进来以后，先消毒30分钟，然后冲洗干净，再用清水浸泡24小时，沥干水分拌沙。沙子的含水量在60%左右，以手攥成团，撒手即散为宜。沙子用量是种子体积的2-3倍，混合均匀后放至0-5 °C 的房间或其他地方层化60天。要注意透气，上面覆盖草帘保湿。同时注意防鼠害。种子要定期检查翻拌，以利种子上下湿度均匀。

种子要及时检查，发现有露白的种子要挑出进行种植。基本上每周挑选一次。种植采用条沟种植，先在沟内浇水（如果土地较湿也可以不用浇底水），欧洲红栎应用，水落下后，种子要横放、顺序一致，上面覆土3-5厘米。株行距15×40厘米，吉林欧洲红栎，每亩播种量在50公斤左右。一般播种后15-20天即可出苗。在出苗前要注意鸟啄食种子。如果外界温度比较低，应对种植的种子进行加盖地膜或用小拱棚提高温度，以利出苗。

五、欧洲红栎秋季变色区别：彩色树种，在秋季的变色效果，直接影响着该树种的未来市场。通过对比试验，欧洲红栎比北美红栎秋季变色更均匀、鲜艳。

六、欧洲红栎树皮颜色区别：成年树欧洲红栎的为墨绿色，上面分布白色小点，欧洲红栎是什么颜色，树皮光滑;美国的北美红栎为淡绿色，上面不满皮屑，较粗糙。

七、欧洲红栎叶片区别：欧洲红栎的比美国红栎的叶片大，欧洲红栎秋季变色鲜艳。

八、欧洲红栎春季发芽时间区别：欧洲红栎比北美红栎在相同地域，发芽要早10-15天。

欧洲红栎与美国红枫的区别

1、土壤要求

美国红枫喜欢排水良好的酸性土壤，而欧洲红栎属于深根性树种对土壤要求不严；

2、生长速度

成年美国红枫生长速度快于欧洲红栎；

近几年，园林绿化需要大量的树木，推动着绿化苗木产业的发展，我们从国外引进很多好的品种的苗木，例如速生红栎，速生红栎与其他红栎品种也有很多明显区别，比如与沼生栎相比其耐寒性、叶片形状、树干直立性等都比沼生栎有优势。那么速生红栎和欧洲红栎，这两种红栎有什么区别呢？

1、速生红栎是欧洲园艺师选育的非常新的红栎品种，该品种在欧美国家已开始替代欧洲红栎与北美红栎、沼生栎等红栎品种。

2、速生红栎的叶片与欧洲红栎相比要小于欧洲红栎叶片，速生红栎的叶片分裂均匀，叶片浓密，冠型自然，十分优雅。欧洲红栎小苗时叶片较大而随着树龄增大，叶片也慢慢变小。

欧洲红栎形态特征-吉林欧洲红栎-舜枫农林由日照舜枫农林科技有限公司提供。欧洲红栎形态特征-吉林欧洲红栎-舜枫农林是日照舜枫农林科技有限公司（www.sfyyc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱守亮。