

吉华月季量大从优 3公分树状月季 洛阳树状月季

产品名称	吉华月季量大从优 3公分树状月季 洛阳树状月季
公司名称	南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市石桥镇
联系电话	15737753500 15737753500

产品详情

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，洛阳树状月季，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种。欢迎您的来电咨询！

月季树的常见疾病

月季

- 1、定植。宜在春季挖穴栽植，特别在未萌生前培养，成活率较高。一般月季较低矮，可用2×3米的株行距。
- 2、温度办理。在北方温室里，冬天应采纳加温办法，添加棚内的温度，使夜间的最低温度保持在10以上，确保花朵和植株的正常成长。
- 3、水肥办理。月季根系浅生，一次灌水水量不能太大或太少，以湿透首要根系分布层的土壤为适合。

上肥量:1~2年生每年施氮100，磷60，钾50克/株；3~4年生每年施氮300，磷200，钾150克/株；5~6年生每年施氮500，磷350，钾30克/株。

上肥时期:

最后一批花采后重施；

首次见花花时施；

能成花的末次花开时施用。

4、花花办理。月季北方温室培养坐花率不高，但人工授粉效花杰出。授粉应在花瓣半打开时进行，欧月月季这样授粉效花好，坐花率高。最简略常用的办法是用毛笔把收集的花粉传到柱头上。为进步花质量，要将变形花、病虫花或过多过密的小花疏除，一般每条结花枝留花1~2个。

5、整形和修剪。每年在永久枝上修剪，促进萌生多数侧枝或供结花用的新梢，添加坐花面及部位，欧月月季但尽量不使相近的主枝彼此堆叠，避免隔绝日照。

6、病虫害防治。北方温室培养可发作根腐病，一旦发病可用敌克松灌根进行防治。

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种。欢迎您的来电咨询！

嫁接月季的一些方法

油梨3个系的实生树开始结花的时间一般较迟，差异也很大，其中墨西哥系最早。华南农业大学园艺系在广州1986年5月种植的实生苗，管理一般，1989年便开始结花，也不算太迟，不失为油梨苗木繁殖的一个方法。但因为实生后代变异大，花朵小，质量较差。若进行经济栽培，以用嫁接苗为妥，实生苗多用作砧木。

欧月月季可用芽接、切接，腹接及核接。

芽接

芽接多在苗圃应用，也有用于大树。除雨季外，全年均可进行，但以晚秋和早春为最适期。欧月月季秋季芽接，当年成活，树状月季花苗基地，芽萌发生长，但需注意冬季防寒。在温度较低的地区，以早春芽接为好。树液畅流、树皮易剥时最适宜芽接。一般用“T”形盾状芽接法，削取的盾状芽片长3厘米左右。砧木粗1~1.5厘米，芽接位离地面约20厘米。用聚乙烯薄膜带露芽绑扎。接后2~3周若成活应松绑，并剪去部分砧尾，再过4~5周剪去接口以上部分砧木，并把接芽萌发的枝条用小绳系住靠近砧木；当苗高约60厘米时，在嫁接口上方约1厘米处截除砧木，切口平滑地斜向接合部对方。一般芽接成活率约50%。

切接

切接一般用于大树高接换种，盆栽树状月季，也用于幼苗嫁接。以春季进行为好。接穗用1年生枝，上部留两个芽。一般成活率可达80%以上。

核接

油梨种子大，胚芽粗，故可在种核的胚芽尚处于幼嫩状态时进行嫁接。当胚芽萌发、生长到20~30厘米时，留约6厘米剪去胚芽中上部，余留的下部作砧木，在其中央纵切深约2厘米的切口；接穗下端

削成楔形，插入砧木使二者紧密贴合，用聚乙烯薄膜绑扎。成活率可达100%，比常规芽接提早成苗，提早结花。

油梨尚可以用圈枝、扦插育苗。圈枝或扦插具有技术简单、易掌握的优点，能在短期内育成苗，在已有一定栽培面积而需苗量不多时，也可应用此两法。从保证砧木遗传性的一致着眼，用营养苗作砧木比实生苗作砧木更好。

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种。欢迎您的来电咨询！

月季育苗技能

1. 时间。每年十至十二月，将已老练的种子采下，然后混沙维护，三月初即可催芽耕种。
2. 整地。在冬初进行第1次耕耘，耕种前进行第二次耕耘，并施足基肥，基肥一般用腐熟厩肥，南阳月季每亩1500~2000公斤或碳胺50公斤，磷肥50公斤、菜饼150公斤，然后筑成高床，一般床高35~50厘米，床宽1.2米。
3. 催芽。三月初樟树播前需催芽，3公分树状月季，可用50℃的温水浸种，当温水冷却后再换50℃水重复浸种3~4次，可使种子提前发芽10~15天。
4. 耕种。条播行距20厘米左右，每亩耕种量10~15公斤，播后覆土盖稻草或地膜，坚持苗床表土湿润，以利种子发芽。
5. 抚育办理。麦苗出土后应及时揭去稻草或地膜，待麦苗长出数片真叶就可以开始间苗，苗高10厘米左右可进行定苗。樟树每亩留苗2万株左右。7月份以后，要加强肥水办理，经常松土除草。秋末停止追肥、灌溉。追肥一般2~3次，前二次可用尿素7~10斤，最终一次可用尿素10公斤、磷肥7.5公斤。樟树1年生苗可达50厘米以上，地径达0.7厘米以上。

吉华月季量大从优(图)-3公分树状月季-洛阳树状月季由南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园提供。行路致远，砥砺前行。南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园（www.hnyuejipifa.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为花木、果木种苗较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!