

郑州大花月季 大花月季多少钱一棵 吉华月季成活率高

产品名称	郑州大花月季 大花月季多少钱一棵 吉华月季成活率高
公司名称	南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市石桥镇
联系电话	15737753500 15737753500

产品详情

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种。欢迎您的来电咨询！

月季种植技术土肥水管理是怎样的？

月季种植技术中的土、肥、水管理技术。种植月季的过程中一定不要忽略了对于土壤、施肥以及浇水过程中的技术、技巧等关键因素。下面就请跟随本文学习了解一下月季种植技术之土肥水管理技术吧！

一、土壤管理

连片种植的月季园，第一、二年可间种豆类、蔬菜或短期生水花，以增加初期收益，欧月月季优化生态环境和增强山坡地水土保持能力。

未行间作的，大花月季多少钱一棵，要及时清除树盘及其附近的杂草并松土，覆盖树盘。山地花园每年可结合施肥进行开沟改土，压入绿肥、有机肥等改良土壤结构。

月季种植

二、肥料管理

1、幼树施肥

基肥。山地花园定植前2~3个月每定植穴施入绿肥25公斤，欧月季腐熟有机肥10公斤~20公斤，磷肥1公斤，石灰0.5公斤；水田花园种植墩挖穴，施腐熟有机肥10公斤~20公斤，磷肥1公斤。拌匀，起100厘米×30厘米的种植墩。

追肥。以勤施薄施为原则，一般每培养一次新梢施肥2次，于新梢萌芽及新梢基本停止生长时各施一次肥，以速效氮为主，每株施2.5公斤~5公斤稀薄腐熟的粪水或麸水加0.3%尿素的液肥，或施尿素25克加钾肥25克。

月季种植

2、结花树施肥

基肥。以有机肥为主，于每年二月施，十月正造花收花后可再施一次，欧月季按每产100斤花施腐熟鸡粪10公斤、豆麸1.5公斤、复合肥1.5公斤，穴施或沟施。

促梢壮花肥。2月中旬至3月上旬，每株施氮 磷 钾=15 15 15的复合肥0.75公斤、硫酸镁25克、硼砂5克、石灰粉1.5公斤。

保花肥。5月中旬每株施氮 磷 钾=15 15 15的复合肥0.5公斤。

壮花肥。7月份每株施氮 磷 钾=15 15 15的复合肥0.5公斤，硫酸钾0.4公斤。8月份根据植株营养状况追施粪水肥，株施25~50公斤。

采花期肥。9月下旬每株施腐熟的禽畜粪肥，农家肥5~10公斤或花生麸1~2公斤。

过冬肥。11月中下旬每株施腐熟厩肥10公斤、豆饼1公斤、三元复合肥0.25公斤、火烧土15公斤。

根外追肥。在新梢转绿期、花蕾期、幼花发育期，各喷2次~3次叶面肥，每次间隔7~10天。

月季种植

三、水分管理

月季较耐干旱、怕积水，花花期要保持土壤湿润，雨季要注意排水，防止积水烂根；旱季除进行土壤覆盖，有条件的应配置喷灌设施，旱时及时灌水或喷水。

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性强，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，长期供应月季小苗！

致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种。欢迎您的来电咨询！

月季的培养环境条件

光线：光线是培养强健欣赏月季所必需的条件。大部分欣赏月季所需求的光线强度为2万lx左右，大花月季批发如将光线强度进步至3~4万lx并合作高湿度和杰出的通风条件，则会成长更快更好，大花月季基地，株型会呈现出矮胖壮硕，叶片宽短刚硬，花样愈加美丽美丽。假如在室内培养，光照条件达不到要求时，可采用人工照明，最好选用日光灯。照明灯最好悬吊在植株上方约30cm处，不要太高，避免下降光照强度。

温度：欣赏月季生命力很强，耐热耐旱，但夏日应不高于37℃，冬天应不低于5℃，气温偏低易受寒害，如叶与花会变色，乃至糜烂。短时的低温或极高温，尽管会对成长形成必定损害，但当温度康复正常后，植株仍可成长杰出。最适合月季成长的温度为22~25℃，夜温15~18℃，日温22~28℃，日夜温差最好相差6℃以上，以10℃为佳。

南阳吉华月季基地，位于月季之乡——南阳，土地肥沃，气候适宜，所繁育的月季种苗长势强健，抗性強，适合我国南北不同气候的地区！

吉华月季基地品种有：大花月季、树状（高杆）月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本（爬藤）月季、微型月季、盆花月季等，郑州大花月季，长期供应月季小苗！

致力于现代月季的引种、繁育、发展，开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种。欢迎您的来电咨询！

嫁接月季的一些方法

油梨3个系的实生树开始结花的时间一般较迟，差异也很大，其中墨西哥系最早。华南农业大学园艺系在广州1986年5月种植的实生苗，管理一般，1989年便开始结花，也不算太迟，不失为油梨苗木繁殖的一个方法。但因为实生后代变异大，花朵小，质量较差。若进行经济栽培，以用嫁接苗为妥，实生苗多用作砧木。

欧月季可用芽接、切接，腹接及核接。

芽接

芽接多在苗圃应用，也有用于大树。除雨季外，全年均可进行，但以晚秋和早春为最适期。欧月季秋季芽接，当年成活，芽萌发生长，但需注意冬季防寒。在温度较低的地区，以早春芽接为好。树液畅流、树皮易剥时最适宜芽接。一般用“T”形盾状芽接法，削取的盾状芽片长3厘米左右。砧木粗1~1.5厘米，芽接位离地面约20厘米。用聚乙烯薄膜带露芽绑扎。接后2~3周若成活应松绑，并剪去部分砧尾，再过4~5周剪去接口以上部分砧木，并把接芽萌发的枝条用小绳系住靠近砧木；当苗高约60厘米时，在嫁接口上方约1厘米处截除砧木，切口平滑地斜向接合部对方。一般芽接成活率约50%。

切接

切接一般用于大树高接换种，也用于幼苗嫁接。以春季进行为好。接穗用1年生枝，上部留两个芽。一般成活率可达80%以上。

核接

油梨种子大，胚芽粗，故可在种核的胚芽尚处于幼嫩状态时进行嫁接。当胚芽萌发、生长到20~30厘米时，留约6厘米剪去胚芽中上部，余留的下部作砧木，在其中央纵切深约2厘米的切口；接穗下端削成楔形，插入砧木使二者紧密贴合，用聚乙烯薄膜绑扎。成活率可达100%，比常规芽接提早成苗，提早结花。

油梨尚可以用圈枝、扦插育苗。圈枝或扦插具有技术简单、易掌握的优点，大花月季批发，能在短期内育成苗，在已有一定栽培面积而需苗量不多时，也可应用此两法。从保证砧木遗传性的一致着眼，用营养苗作砧木比实生苗作砧木更好。

郑州大花月季-大花月季多少钱一棵-吉华月季成活率高由南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园提供。南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园（www.hnyuejipifa.com）是从事“月季,月季苗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。