

## 50公分冬青苗=山西冬青苗=绛县冬青苗=50公分冬青苗

产品名称	50公分冬青苗=山西冬青苗=绛县冬青苗=50公分冬青苗
公司名称	绛县晋航苗木种植专业合作社
价格	.00/个
规格参数	50公分冬青:50公分冬青苗 冬青苗:冬青苗 山西冬青:山西冬青苗
公司地址	山西运城绛县柴家坡村
联系电话	13223596889

## 产品详情

50公分冬青苗=山西冬青苗=绛县冬青苗=50公分冬青苗咨询13834107921柴先生 微信同号

冬青苗在绿化苗木中属小乔木类，其叶色常年不落叶的观叶品种，可种植在道路、广场、公园、小区等园林绿化中具有很好的观赏价值，因冬青苗在生长过程中易发病虫害现象且传播速度极快。

大叶黄杨分栽苗

多分枝的冬青苗

生长旺盛的大叶黄杨

冬青苗起苗现场

高度40公分大叶黄杨

当年生冬青苗

大叶黄杨床苗

平时需增加对其的维护力度，大叶黄杨球虽然自身抗病虫能力较强，但也需要人们的精心呵护才可正常生长，尽量减少或避免病虫害现象的发生。

虫害主要有：黄杨绢叶螟、大叶黄杨尺蠖、日本龟蜡介，其中黄杨绢叶螟危害大于其它二者，一旦发生，虫害会迅速蔓延，导致叶子发黄，人们都会以为是高温缺水造成的，很不容易被人们所发现。

平时要对大叶黄杨的虫害预防，及时修剪病害的枝叶。

病虫害主要有：白粉病、叶斑病、茎腐病，对这些病害的防治方法可以使用药物治疗，严重时需要减掉染发严重的枝条并进行烧毁处理。

下面为大家详细介绍冬青苗主要容易染发的病虫害及防治方法：

## 1、黄杨尺蠖：

症状：幼虫群集叶片取食，将叶片吃光后啃食嫩枝皮层，导致整株死亡。

发生规律：一年发生2-3代，以蛹越冬。成虫白天栖息枝叶隐蔽处，夜出活动、交尾、产卵，卵产于叶背，呈双行或块状排列。卵块数十至百余粒。卵孵化多在早晨5：00-8：00，群集叶背危害，咀嚼叶片、嫩枝皮层，老熟幼虫吐丝飘落入土化蛹。成虫飞翔力不强，具较强的趋光性。

防治方法：

成虫羽化期，利用灯光诱杀。

利用成虫飞翔力不强，早、晚集中在寄生植物上、下部的特性，以简单器具捕杀。

在成虫产卵的高峰期，铲除根际周围杂草上的卵块及初孵幼虫，冬季翻耕根际土壤，可杀死越冬虫蛹。

幼虫危害期，喷施50%亚胺硫磷乳剂200倍液、50%杀螟松乳油500倍液、25%西维因可湿性粉剂300-500倍液，防治效果较好。

## 2、白纹羽病：

症状：病根腐烂，表面布满白色至灰白色网状菌丝，病皮易剥离，病皮与木质部之间有时产生黑色球形小颗粒，为病菌的菌核。得病小叶黄杨叶片发黄，枝条枯萎，

加强栽培管理，增施农家肥和磷、钾肥，提高抗病能力。

发现得病小叶黄杨，扒开根部土壤，剪掉病根，在伤口处涂1:1:100倍波尔多液，然后用40%五氯硝基苯药土(药、土比例:80)施于根部，进行土壤消毒。

### 3、根结线虫病

症状：根部生有许多与根颜色相似的小瘤子。

#### 防治方法

用3%氯唑磷颗粒剂，或用10%克线丹颗粒剂，每亩用5至7kg，进行撒施或沟穴埋施，可防治各种线虫。

。

用10%克线磷颗粒剂，每亩用3至5kg，在生长期均可进行沟施，穴施，撒施，也可把药直接溶入水中，再添加尿素少量一同浇灌，其效果更佳。

### 4、炭疽病

症状：是由真菌引起，叶片或枝上出现斑点病斑上常有轮状排列、突破病部表皮的小黑点。

防治方法：每隔7至10天喷施1次80%的炭疽福美可湿性粉剂800倍，50%的福美双可湿性粉剂600倍液，或75%的百菌清可湿性粉剂800倍液，连续喷2至3次。

另外还有介壳虫可用人工刷洗杀之，或用80%敌敌畏1500倍液喷杀。叶斑病可用65%甲基托布津可湿性粉剂600倍液喷洒。而黄杨斑蛾则可用90%敌百虫原药1500倍液喷杀。